

คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการปักเจกันของดอกหน้าวัวเชิงการค้าในภาคใต้ Postharvest Quality and Vase Life of Anthurium Commercially Grown in Southern Thailand

ศรีสุดา นวลมุสิก¹ สาตันนันท์ สุจิตโต¹ วิกันดา คงสวัสดิ์² และ สมัคร แก้วสุกแสลง¹
Srisuda Naulmusik¹, Satanan Sujitto¹, Wigunda Kongsawat² and Samak Kaewsuksaeng¹

Abstract

Postharvest quality and vase life of six anthurium (*Anthurium andraeanum* L.) cultivars commercially grown in southern of Thailand, namely Pistache, Angle, Marshall, Rosa, Sunglow and Tropical, were investigated. Cut flowers were held at 25 °C and 90% RH. The results showed that Pistache had the longest vase life of 25.80 days, while Angel, Marshall, Rosa, Sunglow and Tropical had a vase life of 22.6, 17.6, 17.0, 16.2 and 15.4 days, respectively. Pistache had unchanged fresh weight and hue angle with the highest water uptake compared to the others. Spathe gloss loss and spadix senescence occurred most slowly in Pistache. Moreover, chilling injury was investigated in Rosa, Marshall and Sunglow anthuriums stored at 4 °C. It was found that Rosa had the most was most susceptible to chilling injury and showed brown spathe and spadix when stored for 5 days. Its spathe and spadix completely turned brown on day 20. Marshall and Sunglow started to show chilling injury symptoms on day 10 and their spathes and spadices completely turned brown with chilling injury scores of 5 and 3 on day 20.

Keywords: vase life, chilling injury, anthurium

บทคัดย่อ

การศึกษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการปักเจกันของดอกหน้าวัว (*Anthurium andraeanum* L.) ทางการค้า ภาคใต้ พันธุ์ Pistache, Angle, Marshall, Rosa, Sunglow และ Tropical โดยปักเจกันที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบร่วมกับดอกหน้าวัวพันธุ์ Pistache มีอายุการปักเจกันนานที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสดและ hue angle คงที่ อัตราการดูดซึมที่สูดและมีการสูญเสียความมันวาวและการเสื่อมของปลีดออกซ้ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์อื่น รองลงมาคือ Angle, Marshall, Rosa, Sunglow และ Tropical โดยมีอายุการปักเจกันเท่ากับ 25.8, 22.6, 17.6, 17.0, 16.2 และ 15.4 วัน ตามลำดับ การเกิดอาการสะท้านหน้าวของดอกหน้าวัว 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Rosa, Marshall และ Sunglow เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พบร่วมกับดอกหน้าวัวพันธุ์ Rosa มีความอ่อนแอต่ออาการสะท้านหน้าวมากที่สุด รองลงมาคือพันธุ์ Marshall และ Sunglow โดยปรากฏการเกิดสีน้ำตาลบนปลีและจานรองดอกหลังจากเก็บรักษาเป็นเวลา 5, 10 และ 10 วันตามลำดับ ตามที่คะแนนการเกิดอาการสะท้านหน้าวเท่ากับ 5, 5 และ 3 คะแนน ในวันที่ 20

คุณ: อายุการบก Jenkins การสังทานหน้า ดอกหน้าวัว

คำนำ

ดอกหน้าวัว (*Anthurium andraeanum*) เป็นไม้ตัดดอกที่มีลักษณะที่เปลกและสวยงาม แหล่งผลิตดอกหน้าวัวที่สำคัญในการค้าของภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร และกระบี่ โดยจำหน่ายในประเทศไทย เช่น กรุงเทพ ชลบุรี และภูเก็ต เช่น เมอร์แลนด์ อเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น การสูญเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของดอกหน้าวัวเป็นปัญหาที่มีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนสีงานrongดอก (spathe) และปลิดอก (spadix) (Paull and Chatrachit, 2001) การสูญเสียน้ำหนักของงานrongดอก การห่อน้ำใน่องจาก การสูญเสียน้ำและการหลุดร่วงของงานrongดอกและปลิดอก (Paull and 1982) โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาคือ 12.5-20 องศาเซลเซียส (Reid, 2004) นอกจากนี้การเกิดอาการหืนภายในดอกหน้าวัว (Promyou et al., 2012) เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายและความผิดปกติทางจากอุณหภูมิตามที่ได้ระบุไว้ เช่น ส่งผลให้อายุการปักเจกันสั้นลง เพราะเกิดการตายของเซลล์ การวิจัยนี้จึง

วิชาเอกร้อนในภาคใต้ สาขาวิชาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภารพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93110

Tropical Plants Research Unit, Department of Plant Science, Faculty of Technology and Community Development, Thaksin University, Phatthalung
Phatthalung 93110

บ้านพิบูลย์ร้อยล้อราเวอร์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

Flower Company Ronpiboon NakhonSritamarat 80130

ศึกษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการปักเจาะของดอกหน้าวัวในแต่ละสายพันธุ์ที่ปลูกในภาครัฐเป็นที่นิยมของตลาดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในเชิงพาณิชย์

อุปกรณ์และวิธีการ

1 คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการปักเจาะของดอกหน้าวัวทางการค้า

นำดอกหน้าวัวพันธุ์ Tropical, Pistache, Rosa, Angle, Marshall และ Sunglow มาปักในน้ำกลัน ณ ห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธิ์อยู่ที่ 80-90 โดยนำหน้าวัวตัดดอกมาปักเจกันในระบบอุ่นขนาด 15 มิลลิลิตร บรรจุน้ำกลัน 10 มิลลิลิตร จนกว่าดอกหน้าวัวจะเสื่อมคุณภาพ บันทึกผลการทดลองทุกๆ 2 วัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสด อัตราการดูดน้ำ การเปลี่ยนสีของงานรองดอก การสูญเสียความมันวาวบนงานดอกของดอก การเสื่อมสภาพของปลีดอก และอายุการปักเจกัน

2 อาการสะท้านหนาของดอกหน้าวัวทางการค้าและอายุการเจกันของดอกหน้าวัวหลังการเก็บเกี่ยว

นำดอกหน้าวัวที่สำคัญทางการค้า 3 พันธุ์ คือ Sunglow, Rosa และ Marshall มาปักในน้ำกลัน ที่ความชื้นสัมพัทธิ์ร้อยละ 90-95 โดยนำหน้าวัวตัดดอกมาปักเจกันในระบบอุ่นขนาด 15 มิลลิลิตร บรรจุน้ำกลัน 10 มิลลิลิตร เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส บันทึกข้อมูลจนกระทั่งดอกหน้าวัวหมดสภาพการยอมรับ ทุกๆ 2 วัน ได้แก่ การเกิดอาการสะท้านหนา ประเมินโดยการเกิดสีน้ำตาลของงานรองดอกและปลีดอก

ผลและวิจารณ์

1 คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการปักเจาะของดอกหน้าวัวทางการค้า

ดอกหน้าวัวพันธุ์ Pistache มีอายุการปักเจกันนานที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสดคงที่ (Figure 1) พันธุ์ Rosa และ Tropical มีการสูญเสียความมันวาวบนงานรองดอกเร็วกว่าดอกหน้าวัวสายพันธุ์อื่น ในขณะที่ Pitache สูญเสียน้ำอย่างสุด (Figures 2,4) โดยมีอายุการปักเจกันสั้นเท่ากับ 17.0 และ 15.4 วัน ตามลำดับ และดอกหน้าวัวพันธุ์ Tropical เกิดการเสื่อมสภาพของปลีมากกว่าดอกหน้าวัวสายพันธุ์อื่น (Figures 3,5) สงผลทำให้งานรองดอกและปลีดอกร่วงซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าดอกหน้าวัวกำลังเข้าสู่การเสื่อมสภาพ (Paull and Goo, 1982)




Figure 1 Fresh weight of six anthurium cultivars held at 25 °C.




Figure 2 Spathe gloss loss of six anthurium cultivars held at 25 °C.

*Score: 1= no gloss loss, 2= mild gloss loss, 3=moderate gloss loss , 4= severe gloss loss and 5= very severe gloss loss




Figure 3 Spadix senescence of six anthurium cultivars held at 25 °C.

*Score: 1= no senescence, 2= mild senescence, 3=moderate senescence, 4= severe senescence and 5= very severe senescence




Figure 4 Spathe gloss changes of Pistache and Tropical anthuriums held at 25 °C.




Figure 5 Spadix senescence of Pistache and Tropical anthuriums held at 25 °C

2. อาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัวทางการค้าและอายุการเจกันของดอกหน้าวัวหลังการเก็บเกี่ยว

ดอกหน้าวัวพันธุ์ Rosa เป็นสายพันธุ์ที่อ่อนแอต่ออุณหภูมิต่ำมากที่สุด มีการพัฒนาอาการสะท้านหนาวเกิดขึ้นเร็ว รองลงมาคือ Marshall และ Sunglow (Figures 6 a,b) และบางสายพันธุ์ปลีดอกมีความอ่อนแอต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวได้แก่พันธุ์ Rosa เกิดอาการสีน้ำตาลบริเวณปลีดอก ขณะที่ Marshall และ Sunglow ไม่แสดงอาการสีน้ำตาลบริเวณปลีดอก (Figures 6c,d) ทั้งนี้ความรุนแรงของการเกิดอาการสะท้านหนาวขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ชนิดและพันธุ์พืช Promyou et al. (2012) รายงานว่า ดอกหน้าวัวพันธุ์ Cheer อ่อนแอต่ออาการสะท้านหนาวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส







Figure 6 Chilling injury on spathe (a,b) and spadix (c,d) of three anthurium cultivars held at 4 °C.

*Score: 1= no chilling injury, 2=1-25% of spathe affected, 3=26-50% of spathe affected, 4=51-75% of spathe affected and 5=76-100% of spathe affected

คำขอบคุณ

ขอขอบคุณน่วยริจย์พีชเขตร้อนในภาคใต้ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สนับสนุนทุน อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการทำงานวิจัย

เอกสารอ้างอิง

- Paul, R.E. and T. Goo. 1982. Pulse treatment with silver nitrate extends vase life of anthuriums. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 107: 842-844.
- Paul, R.E. and T. Chantrachit. 2001. Benzyladenine and the vase life of tropical ornamentals. Postharv. Biol. Technol. 21: 303-310.
- Promyou, S., S. Ketsa and W. van Doorn. 2012. Salicylic acid alleviates chilling injury in anthurium (*Anthurium andraeanum* L.) flowers. Postharv. Biol. Technol. 64: 104-110.
- Reid, M.S. 2004. Anthurium, flamingo flower. (Online). Available: <http://postharvest.ucdavis.edu/Produce/ProduceFacts/orn/anthurium.pdf>.