



# การผลิต ลำไย ในฤดูและนอกฤดู

2558

พิชัย สมบูรณ์วงศ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ


สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ลำไยเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถชักนำการออกดอกได้ง่าย มีสารเคมีหลายชนิดที่สามารถกระตุ้นให้ลำไยออกดอกได้ ลำไยเป็นไม้ผลที่ไม่จำเป็นต้องห่อผล เพียงแต่ต้องมีการตัดข้อผลบ้างเมื่อลำไยติดผลต่อข้อมาก ลำไยนอกจากจำหน่ายในรูปผลสดแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นลำไยกระป๋อง ลำไยอบแห้งทั้งเปลือกและเฉพาะเนื้อสีทอง ในปี 2558 ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกษตรกรผู้ปลูกลำไยและผู้ประกอบการจะต้องผลิตลำไยให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ เกษตรกรจะต้องผลิตลำไยให้ได้คุณภาพ คือ ผลโตสม่ำเสมอ สีสวย ต้นทุนการผลิตต่ำ และไม่มีสารเคมีตกค้าง เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้ทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสมในการผลิต จึงจะสามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีต่อไป การปฏิบัติดูแลรักษาลำไยในรอบปีทั้งในฤดูและนอกฤดูที่ได้สรุปมานี้ ก็เพื่อที่จะนำเอาทั้งความรู้จากหนังสือการผลิตลำไย ประสบการณ์ และผู้ประสบความสำเร็จในการผลิตลำไย นำมาสรุปให้ได้เนื้อหาสาระที่กระชับและง่ายต่อการนำไปเป็นแนวทางการผลิตลำไยให้ได้คุณภาพต่อไป

| เดือน     | การปฏิบัติดูแลในฤดู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สิงหาคม   | <p><b>ตัดแต่งกิ่ง</b></p> <p>เอากิ่งใบทำพิน เผ่าถ่าน เอาใบคลุมในทรงพุ่ม (ให้เสร็จไม่เกิน 30 วัน)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| กันยายน   | <p><b>แตกใบอ่อนครั้งที่ 1</b></p> <p>เอาปุ๋ยคอกหว่านบนใบใต้ทรงพุ่ม ตามด้วยปุ๋ยเคมีตามตาราง 1 แสดงปริมาณ ปุ๋ยที่ควรให้แก่ลำไยแต่ละครั้งของการแตกใบอ่อน (ในคู่มือการผลิตลำไย คุณภาพ) หรือสูตรปุ๋ยตัวหน้าสูง เช่น 46 - 0 - 0 หรือ 25 - 7 - 7 (อัตราตาม ตารางแนบท้าย)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระวังหนอนและแมลงกัดกินใบอ่อน เช่น หนอนคืบกินใบ หนอนมั่งกร หนอนหนาม ตัวงกินใบ ตัวงกุหลาบ แมลงค่อมทอง การป้องกันกำจัด ให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้ม ควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50 % + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| ตุลาคม    | <p><b>แตกใบอ่อนครั้งที่ 2</b></p> <p>ให้ปุ๋ยเคมี สูตร 46 - 0 - 0 หรือ 25 - 7 - 7 (อัตราตามตารางแนบท้าย) ให้น้ำตาม</p> <p>ระวังหนอนและแมลงกัดกินใบอ่อน เช่น หนอนคืบกินใบ หนอนมั่งกร หนอนหนาม ตัวงกินใบ ตัวงกุหลาบ แมลงค่อมทอง การป้องกันกำจัด ให้ ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้ม ควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50% + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| พฤศจิกายน | <p><b>แตกใบอ่อนครั้งที่ 3</b></p> <p>ให้ปุ๋ยเคมี สูตร 46 - 0 - 0 หรือ 25 - 7 - 7 (อัตราตามตารางแนบท้าย) ให้น้ำตาม</p> <p>ระวังหนอนและแมลงกัดกินใบอ่อน เช่น หนอนคืบกินใบ หนอนมั่งกร หนอน หนาม ตัวงกินใบ ตัวงกุหลาบ แมลงค่อมทอง การป้องกันกำจัด ให้ฉีดพ่น น้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50% + ไซเปอร์เมท ริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ธันวาคม   | <p><b>ชักนำการออกดอก</b></p> <p>กระตุ้นการออกดอกโดยใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต บังจายที่มีผลกระทบ ต่อการออกดอกของลำไย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การแตกใบอ่อน 3 ครั้งดีกว่าการแตกใบอ่อน 2 ครั้ง</li> <li>• อายุของใบ ฤดูหนาวอายุใบ 45 วัน ใบต้องแก่เต็มที่ สีเขียวเข้ม ฤดูอื่น อายุใบ 20 - 25 วันใบโตเต็มที่ มีสีเขียวอ่อน</li> <li>• วิธีการให้สาร ทำความสะอาดภายใต้ทรงพุ่ม ให้ทางดินโดยผสมน้ำราด จากปลายทรงพุ่มเข้ามา 1 เมตร รอบทรงพุ่ม(ให้สารในตอนเช้า) ) หลังจากให้สาร 7 - 10 วัน ให้ฉีดพ่นทางใบ สาร 3 ชีด ผสมกับปุ๋ยสูตร 0 - 52 - 34 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร (ให้ฉีดพ่นตอนเย็น)</li> <li>• แสง วันที่ให้สารควรมีแสงแดดจัด</li> <li>• ความบริสุทธิ์ของสาร 99.7 เปอร์เซนต์ (วิเคราะห์สารที่ภาควิชาทรัพยากร ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้)</li> <li>• อัตราการให้สาร (ตามตารางแนบท้าย)</li> </ul> |



| เดือน             | การปฏิบัติดูแลภายในฤดู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มกราคม            | <p><b>ออกดอก</b></p> <p>ดูแลน้ำให้สม่ำเสมอ ไม่ต้องมาก</p> <p>ดูแลโรคและแมลง ให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมี คลอไพริฟอส 50% + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หลังจากแทงช่อดอก (ดอกยังไม่บาน)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| กุมภาพันธ์        | <p><b>ติดผล</b></p> <p>ผลขนาดเท่าหัวไม้ขีดไฟ ให้อยู่เต็มที่ตามการคาดคะเนปริมาณผลผลิต ตามตาราง 2 แสดงปริมาณปุ๋ยที่ควรให้แก่ลำไยในระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว (อัตราตามตารางแนบท้าย) หรือให้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงเช่น 46 - 0 - 0 หรือ 25 - 7 - 7 แบ่งใส่เดือนละครั้ง (2 ครั้ง) ให้น้ำตามทุกครั้งและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ดูแลโรคและแมลง ให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมี คลอไพริฟอส 50% + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารเคมีป้องกันเชื้อรา คาร์เบนดาซิม</p>     |
| มีนาคม            | <p><b>สร้างเมล็ดและเปลือก ตัดช่อผล</b></p> <p>โดยตัดปลายช่อผลเหลือไว้ไม่เกิน 60 ผลต่อช่อ ระยะเวลาผลเท่าเมล็ด ถั่วเขียว ให้อยู่เต็มที่สูตรเสมอเช่น 15 - 15 - 15 หรือ 16 - 16 - 16 แบ่งใส่เดือนละครั้ง แล้วให้น้ำตามทุกครั้งและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ดูแลโรคและแมลง ให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมี คลอไพริฟอส 50 % + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารเคมีป้องกันเชื้อรา</p>                                                                             |
| เมษายน<br>พฤษภาคม | <p>เมล็ดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ระยะสร้างเนื้อ ให้อยู่เต็มที่ตามการคาดคะเน ปริมาณผลผลิต ตามตาราง 2 แสดงปริมาณปุ๋ยที่ควรให้แก่ลำไยในระยะ ติดผลถึงเก็บเกี่ยว (อัตราตามตารางแนบท้าย) หรือให้ปุ๋ยสูตรตัวท้ายสูง เช่น 13 - 13 - 21 หรือ 8 - 24 - 24 ให้น้ำตามและให้น้ำสม่ำเสมอ ดูแลโรค และแมลง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| มิถุนายน          | <p>สร้างเนื้อและขยายผลเร็วให้อยู่เต็มที่ตามการคาดคะเนปริมาณผลผลิต ตาม ตาราง 2 แสดงปริมาณปุ๋ยที่ควรให้แก่ลำไยในระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว (อัตราตามตารางแนบท้าย) หรือให้ปุ๋ยสูตรตัวท้ายสูงเช่น 13 - 13 - 21 หรือ 8 - 24 - 24 ให้น้ำสม่ำเสมอ</p> <p>ดูแลโรคและแมลง เช่น เพลี้ยหอยหลังเต่า มวนลำไย ฝีเสื้อมวนหวาน โรคผลลาย ผลแตก ผลร่วง ให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่น สารเคมีคลอไพริฟอส 50 % + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารเคมีป้องกันเชื้อรา ทีบูโคนาโซล 25%EW</p> |
| กรกฎาคม           | <b>เก็บเกี่ยวผลผลิต</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





| เดือน                                                  | การปฏิบัติดูแลภายในฤดู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต</p> <p>แตกใบอ่อนครั้งที่ 1</p> | <p>ตัดแต่งกิ่ง</p> <p>เอากิ่งไปทำฟืน เผาถ่าน เอาใบคลุมในทรงพุ่ม (ให้เสร็จไม่เกิน 30 วัน)</p> <p>แตกใบอ่อนครั้งที่ 1</p> <p>เอาปุ๋ยคอกหว่านบนใบใต้ทรงพุ่ม ตามด้วยปุ๋ยเคมีตามตาราง 1 แสดงปริมาณปุ๋ยที่ควรให้แก่ลำไยแต่ละครั้งของการแตกใบอ่อน (อัตราตามตารางแนบท้าย) หรือสูตรปุ๋ยตัวหน้าสูงเช่น 46 - 0 - 0 หรือ 25 - 7 - 7 (อัตราตามตารางแนบท้าย)</p> <p>ระวังหนอนและแมลงกัดกินใบอ่อน เช่น หนอนคืบกินใบ หนอนมั่งกร หนอนหนาม ตัวงกินใบ ตัวงกุหลาบ แมลงค่อมทอง การป้องกันกำจัด ให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50 % + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร</p>                                                                                           |
| แตกใบอ่อนครั้งที่ 2                                    | <p>แตกใบอ่อนครั้งที่ 2</p> <p>ให้ปุ๋ยเคมี สูตร 46 - 0 - 0 หรือ 25 - 7 - 7 (อัตราตามตารางแนบท้าย) ให้น้ำตาม</p> <p>ระวังหนอนและแมลงกัดกินใบอ่อน เช่น หนอนคืบกินใบ หนอนมั่งกร หนอนหนาม ตัวงกินใบ ตัวงกุหลาบ แมลงค่อมทอง การป้องกันกำจัด ให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50 % + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| แตกใบอ่อนครั้งที่ 3                                    | <p>แตกใบอ่อนครั้งที่ 3</p> <p>ให้ปุ๋ยเคมี สูตร 46 - 0 - 0 หรือ 25 - 7 - 7 (อัตราตามตารางแนบท้าย) ให้น้ำตาม</p> <p>ระวังหนอนและแมลงกัดกินใบอ่อน เช่น หนอนคืบกินใบ หนอนมั่งกร หนอนหนาม ตัวงกินใบ ตัวงกุหลาบ แมลงค่อมทอง การป้องกันกำจัด ให้ฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ อัตราน้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มควันไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50 % + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 - 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ชักนำการออกดอก                                         | <p>ชักนำการออกดอก</p> <p>กระตุ้นการออกดอกโดยใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อออกดอกของลำไย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การแตกใบอ่อน 3 ครั้งดีกว่าการแตกใบอ่อน 2 ครั้ง</li> <li>• อายุของใบ ฤดูหนาวอายุใบ 45 วัน ใบต้องแก่เต็มที่ สีเขียวเข้ม ฤดูอื่นอายุใบ 20 - 25 วันใบโตเต็มที่ มีสีเขียวอ่อน</li> <li>• วิธีการให้สาร ทำความสะอาดภายใต้ทรงพุ่ม ให้ทางดินโดยผสม น้ำราดจากปลายทรงพุ่มเข้ามา 1 เมตร รอบทรงพุ่มให้สารในตอนเช้า) หลังจากให้สาร 7- 10 วัน ให้ฉีดพ่นทางใบ สาร 3 ชีด ผสม กับปุ๋ยสูตร 0 - 52 - 34 อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร (ให้ฉีดพ่นตอนเย็น)</li> <li>• แสง วันที่ให้สารควรมีแสงแดดจัด</li> <li>• ความบริสุทธิ์ของสาร 99.7 เปอร์เซนต์ (วิเคราะห์สารที่ภาควิชา ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้)</li> </ul> |



| เดือน                         | การปฏิบัติดูแลภายในฤดู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราการให้สาร (อัตราตามตารางแนบท้าย)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ออกดอก                        | <p><b>ออกดอก</b></p> <p>ดูแลน้ำให้สม่ำเสมอ ไม่ต้องมาก ดูแลโรคและแมลง ให้ฉีดพ่นน้ำส้มคว้นไม้ อัตราน้ำส้มคว้นไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มคว้นไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50 % + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 – 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หลังจากแทงช่อดอก (ดอกยังไม่บาน)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ติดผล                         | <p><b>ติดผล</b></p> <p>ขนาดเท่าหัวไม้ขีดไฟให้ปุ๋ยเคมีตามการคาดคะเนปริมาณผลผลิตตามตาราง 2 แสดงปริมาณปุ๋ยที่ควรให้แก่ลำไยในระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว(อัตราตามตารางแนบท้าย) หรือให้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงเช่น 46 – 0 – 0 หรือ 25 – 7 – 7 แบ่งใส่เดือนละครั้ง (2 ครั้ง) ให้น้ำตามทุกครั้งและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ดูแลโรคและแมลง ให้ฉีดพ่นน้ำส้มคว้นไม้ อัตราน้ำส้มคว้นไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มคว้นไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50 % + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 – 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารเคมีป้องกันเชื้อรา คาร์เบนดาซิม</p>       |
| สร้างเมล็ดและเปลือก           | <p><b>สร้างเมล็ดและเปลือก ตัดช่อผล</b></p> <p>โดยตัดปลายช่อผลเหลือไว้ไม่เกิน 60 ผลต่อช่อ ระยะขนาดผลเท่าเมล็ดถั่วเขียว ให้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเช่น 15 – 15 – 15 หรือ 16 – 16 – 16 แบ่งใส่เดือนละครั้ง แล้วให้น้ำตามทุกครั้งและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ดูแลโรคและแมลง ให้ฉีดพ่นน้ำส้มคว้นไม้ อัตราน้ำส้มคว้นไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มคว้นไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50 % + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 – 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารเคมีป้องกันเชื้อรา</p>                                                                            |
| สร้างเนื้อผล<br>เท่ามะเขือพวง | <p>เมล็ดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ระยะสร้างเนื้อ ให้ปุ๋ยเคมีตามการคาดคะเนปริมาณผลผลิต ตามตาราง 2 แสดงปริมาณปุ๋ยที่ควรให้แก่ลำไยในระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว (อัตราตามตารางแนบท้าย) หรือให้ปุ๋ยสูตรตัวท้ายสูง เช่น 13 - 13 - 21 หรือ 8 - 24 - 24 ให้น้ำตามและให้น้ำสม่ำเสมอ ดูแลโรคและแมลง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ช่วงขยายผล                    | <p>สร้างเนื้อและขยายผลเร็วให้ปุ๋ยเคมีตามการคาดคะเนปริมาณผลผลิตตามตาราง 2 แสดงปริมาณปุ๋ยที่ควรให้แก่ลำไยในระยะติดผลถึงเก็บเกี่ยว (อัตราตามตารางแนบท้าย) หรือให้ปุ๋ยสูตรตัวท้ายสูงเช่น 13 - 13 - 21 หรือ 8 - 24 - 24 ให้น้ำสม่ำเสมอ</p> <p>ดูแลโรคและแมลง เช่น เพลี้ยหอยหลังเต่า มวนลำไย ผีเสื้อมวนหวาน โรคผลลาย ผลแตก ผลร่วงให้ฉีดพ่นน้ำส้มคว้นไม้ อัตราน้ำส้มคว้นไม้ 1 ส่วน ต่อน้ำ 150 ส่วน (น้ำส้มคว้นไม้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) หรือ ฉีดพ่นสารเคมีคลอไพริฟอส 50 % + ไซเปอร์เมทริน อัตรา 20 – 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารเคมีป้องกันเชื้อรา ที่บูโคนาโซล 25%EW</p> |
|                               | <b>เก็บเกี่ยวผลผลิต</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

