



# ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนใน จากเรือสำรวจประมง 2

*Fishes of Inner Gulf of Thailand caught  
by Research Vessel 2*



โอภาส ชามะสนธิ์  
Opas Chamason  
ไพรินทร์ เพ็ญประไพ  
Phairin Phenpraphai

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)  
Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan)  
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
Marine Fisheries Research and Development Division

กรมประมง  
Department of Fisheries  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
Ministry of Agriculture and Cooperatives





# ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนใน จากเรือสำรวจประมง 2

Fishes of Inner Gulf of Thailand caught  
by Research Vessel 2

โอภาส ชามะสนธิ์ และ ไพรินทร์ เพ็ญประไพ  
Opas Chamason and Phairin Phenpraphai



ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)  
Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan)  
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
Marine Fisheries Research and Development Division

กรมประมง  
Department of Fisheries  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
Ministry of Agriculture and Cooperatives

## ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2

### Fishes of Inner Gulf of Thailand caught by Research Vessel 2

ผู้เขียนและถ่ายภาพ :

โอกาส ชามะสนธิ์ และ ไพรินทร์ เพ็ญประไพ

จัดทำโดย :

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

@ลิขสิทธิ์ของกรมประมง

พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 เล่ม

พิมพ์ที่ :

หจก. วนิดาการพิมพ์ (สาขากี 1) จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ 08 1783 5869

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

โอกาส ชามะสนธิ์.

ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.-- สมุทรปราการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง  
อ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ), 2563.

130 หน้า.

1. ปลา -- การจำแนก. I. ไพรินทร์ เพ็ญประไพ, ผู้แต่งร่วม. II. ชื่อเรื่อง.

597

ISBN 978-616-358-454-0



# คำปรารภ

อ่าวไทยตอนในถือเป็นแหล่งประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งของอ่าวไทย โดยมีพื้นที่ตั้งแต่อำเภอสตูลถึงจังหวัดชลบุรี ถึงอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตรับผิดชอบในการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ซึ่งคณะผู้จัดทำได้รวบรวมตัวอย่างและภาพถ่ายชนิดพันธุ์ปลาที่พบจากการสำรวจมาเป็นเวลากว่าสิบปี จึงได้จัดทำหนังสือชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2 โดยเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยภาพสี คำบรรยายลักษณะของวงศ์ และการแพร่กระจายของปลาที่พบจากเรือสำรวจบริเวณอ่าวไทยตอนใน หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อผลิตเป็นสื่อเผยแพร่แก่นักวิชาการ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพของทะเล เพื่อเป็นรากฐานในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ต่อไป



นายณณพล สุขมาสวิน

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

# กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำเรือสำรวจประมง 2 ที่ได้ช่วยเหลือ  
ทีมทำงานอย่างเต็มความสามารถจนการออกปฏิบัติราชการทะเล  
สำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา

ขอขอบคุณกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง  
ที่สนับสนุนทุนทรัพย์ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้

สุดท้ายขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย เจนกิจการ  
แห่งภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ที่ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบและแก้ไขบทความของหนังสือเล่มนี้







# สารบัญ

• • •

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| ชนิดปลานบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2 | 1  |
| พื้นที่และวิธีการศึกษา                        | 3  |
| วิธีการศึกษา                                  | 5  |
| วงศ์ปลาฉลามทราย                               | 16 |
| วงศ์ปลาฉลามแมว                                | 17 |
| วงศ์ปลาฉลามหูดำ                               | 18 |
| วงศ์ปลากระเบนขาว ปลากระเบนปากแหลม             | 19 |
| วงศ์ปลากระเบนนก                               | 21 |
| วงศ์ปลาไหลมอเรย์                              | 22 |
| วงศ์ปลาไหลงู                                  | 23 |
| วงศ์ปลายอดจาก                                 | 24 |
| วงศ์ปลาอู๋ปุด                                 | 25 |
| วงศ์ปลาแมว ปลากระตัก ปลาไส้ตัน                | 26 |
| วงศ์ปลาตาบลาว                                 | 27 |
| วงศ์ปลาหลังเขียว                              | 28 |
| วงศ์ปลาปิ่นแก้ว ปลาตุ๊กทะเล                   | 29 |
| วงศ์ปลาปากคม                                  | 30 |
| วงศ์ปลาทุราเคระ                               | 31 |
| วงศ์ปลากระรอก ปลาข้าวเม่าน้ำลึก               | 32 |
| วงศ์ปลาคางคก                                  | 33 |
| วงศ์ปลาอมไข่                                  | 34 |
| วงศ์ปลากระจิง ปลาเขือ ปลาทองเทียว ปลาจุมพรวด  | 36 |
| วงศ์ปลานู๋                                    | 37 |
| วงศ์ปลาแป้นแก้ว                               | 39 |
| วงศ์ปลาสลิดหิน                                | 40 |
| วงศ์ปลาปากกวาง                                | 41 |
| วงศ์ปลาทุรา                                   | 42 |
| วงศ์ปลากระบอก                                 | 43 |
| วงศ์ปลากระปี่ ปลาตีนแถบ                       | 44 |
| วงศ์ปลาข้างเงิน                               | 45 |



## สารบัญ (ต่อ)

• • •

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| วงศ์ปลาช่อนทะเล ปลาไฮโหลย         | 46 |
| วงศ์ปลาเหาฉลาม                    | 47 |
| วงศ์ปลาสิ่กุน ปลาหางแข็ง          | 48 |
| วงศ์ปลาใบโพธิ์ ปลาพระจันทร์       | 52 |
| วงศ์ปลาน้ำดอกไม้ ปลาซาก           | 53 |
| วงศ์ปลาชีกเดียว                   | 54 |
| วงศ์ปลาลิ้นควาย                   | 55 |
| วงศ์ปลาลิ้นควาย                   | 56 |
| วงศ์ปลาลิ้นหมาหางอนยาว            | 57 |
| วงศ์ปลาลิ้นควาย                   | 58 |
| วงศ์ปลาลิ้นหมา                    | 59 |
| วงศ์ปลาผีเสื้อกลางคืน             | 60 |
| วงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้ และปลาม้าน้ำ | 61 |
| วงศ์ปลาปากแตร                     | 63 |
| วงศ์ปลาข้างใส                     | 64 |
| วงศ์ปลานกฮูก                      | 65 |
| วงศ์ปลามังกรน้อย                  | 66 |
| วงศ์ปลาดาบเงิน                    | 67 |
| วงศ์ปลาทุ ปลาลัง ปลาอินทรี        | 68 |
| วงศ์ปลาซากยี่                     | 69 |
| วงศ์ปลาดำแหง                      | 70 |
| วงศ์ปลานกขุนทอง                   | 71 |
| วงศ์ปลาดอกหมาก                    | 72 |
| วงศ์ปลาหนวดฤๅษี ปลาแพะ            | 73 |
| วงศ์ปลาข้างลาย ปลาข้างตะเพา       | 74 |
| วงศ์ปลากะรัง ปลาเก๋า              | 75 |
| วงศ์ปลาดาวหวาน                    | 77 |
| วงศ์ปลาแป้น ปลาแปบทะเล            | 78 |
| วงศ์ปลาผีเสื้อ                    | 80 |
| วงศ์ปลากะพงแสม ปลาครี๊ดคราด       | 81 |





## สารบัญ (ต่อ)

...

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| วงศ์ปลากะพง                                    | 82  |
| วงศ์ปลากล้วย                                   | 84  |
| วงศ์ปลาแถบ                                     | 85  |
| วงศ์ปลาตะกรับ ปลาเสือดาว                       | 86  |
| วงศ์ปลาสลิดหิน                                 | 87  |
| วงศ์ปลากะรังหัวโขน ปลาสิงโต                    | 88  |
| วงศ์ปลาหัวแบน ปลาหางควาย                       | 90  |
| วงศ์ปลาหูช้าง ปลาแมลงปอ ปลาใบโพธิ์             | 92  |
| วงศ์ปลาหูช้าง ปลาคลุด                          | 93  |
| วงศ์ปลาจวด                                     | 94  |
| วงศ์ปลาเห็ดโคน                                 | 96  |
| วงศ์ปลาทรายแดง ปลาทรายขาว ปลาสายรุ้ง ปลานกทะเล | 97  |
| วงศ์ปลาหมูสี                                   | 99  |
| วงศ์ปลากบ                                      | 100 |
| วงศ์ปลาหัว                                     | 101 |
| วงศ์ปลากล่อง                                   | 102 |
| วงศ์ปลาหัว                                     | 103 |
| วงศ์ปลาปักเป้า                                 | 105 |
| วงศ์ปลาปักเป้าหนามทุเรียน                      | 107 |
| เอกสารอ้างอิง                                  | 108 |
| ดัชนีรายชื่อ                                   | 111 |



# สารบัญตาราง

...

|            |                                          |   |
|------------|------------------------------------------|---|
| ตารางที่ 1 | ชนิดปลา สถานภาพทางเศรษฐกิจ และแหล่งอาศัย | 6 |
|------------|------------------------------------------|---|

# สารบัญรูปภาพ

...


|          |                                                                           |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| ภาพที่ 1 | พื้นที่ที่มีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพของปลาสูง (Hot Spot) ของโลก | 1 |
| ภาพที่ 2 | การเก็บข้อมูลโดยอวนลากแผ่นตะเฆ่ของเรือสำรวจประมง 2                        | 3 |
| ภาพที่ 3 | พื้นที่สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนบน                            | 4 |
| ภาพที่ 4 | แบบแปลนอวนลากปลาแบบเยอรมันมีแผ่นตะเฆ่ที่ใช้ในการสำรวจ                     | 4 |

# ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนใน จากเรือสำรวจประมง 2

Fishes of Inner Gulf of Thailand caught  
by Research Vessel 2

ปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก โดย Nelson (2016) กล่าวว่า ปลา มีจำนวนชนิดรวมมากกว่า 32,000 ชนิด จากจำนวนสัตว์มีกระดูกสันหลังกว่า 60,000 ชนิด ทั่วโลกพบทั้งหมด 85 อันดับ (Order) 536 วงศ์ (Family) มีลักษณะทางกายวิภาค การกินอาหาร การสืบพันธุ์ และมีอวัยวะพิเศษที่ใช้ในการดำรงชีวิตแตกต่างกันหลายรูปแบบ ปลาบางชนิดมีขนาดเล็กเพียง 2 เซนติเมตร ในขณะที่ปลาบางชนิดมีความยาวมากกว่า 20 เมตร มีการแพร่กระจายทั่วโลก ตั้งแต่เหวลึกในมหาสมุทรจนถึงภูเขาสูง นับจากทะเลชายฝั่งปากแม่น้ำ ป่าชายเลน แม่น้ำ ลำคลอง อ่างเก็บน้ำ ป่าดงดิบ จนถึงทะเลสาบขนาดใหญ่ ตั้งแต่ทะเลทรายที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50°C จนถึงบริเวณขั้วโลกที่มีพื้นผิวดินปกคลุมด้วยน้ำแข็งตลอดปี (Moyle and Cech Jr., 2000; Nelson, 2006, Nelson *et al.*, 2016)

ประเทศไทยตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน พื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศมีลักษณะเป็นแหลม แบ่งกันมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียออกจากกัน จึงจัดอยู่ในเขต Indo-West Pacific ซึ่งมักจะพบชนิดปลาที่มีการแพร่กระจายกว้าง มีความหลากหลายของชนิดปลาสูง และมีโอกาสที่จะพบปลาชนิดใหม่ (New species) ในระดับต้น ๆ ของโลก ดังภาพที่ 1 ในส่วนของอ่าวไทย ซึ่งอยู่ในแนวฝั่งด้านตะวันออกของแหลมอินโดจีน เป็นพื้นที่ชายขอบทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีลักษณะเป็นไหล่ทวีป (continental shelf) ที่มีความลึกสุดไม่เกิน 80 เมตร และเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับทะเลจีนใต้ และ เป็นส่วนหนึ่งของไหล่ทวีปซุนดา ที่จัดเป็นพื้นที่ไหล่ทวีปที่ใหญ่ที่สุดของโลกจากฐานข้อมูลในระบบข้อมูลปลา ([www.fishbase.org](http://www.fishbase.org))



ภาพที่ 1 พื้นที่ที่มีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพของปลาสูง (Hot spot) ของโลก  
(ดัดแปลงจาก Nelson *et al.*, 2016)



การสำรวจทรัพยากรประมงทะเลด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่น่านน้ำไทย ได้ดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี 2506 ภายหลังจากการประสบความสำเร็จในการทดลองเครื่องมืออวนลากในอ่าวไทยของกรมประมงร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญการประมงชาวเยอรมัน ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันกับรัฐบาลไทย โดยการนำเครื่องมืออวนลากชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วย อวนลากปลาผิวน้ำ อวนลากกลางน้ำ อวนลากหน้าดินแบบใช้เรือคู่ และอวนลากหน้าดินแบบใช้แผ่นตะเฆ่เข้ามาทดลองจับปลาในปี 2504 (สำราญ, 2516) โดยผลการทดลองพบว่า อวนลากแผ่นตะเฆ่มีประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำสูงสุด กรมประมงและคณะผู้เชี่ยวชาญเยอรมันจึงได้ทำการส่งเสริมด้วยการสถิติการใช้เครื่องมือเพื่อให้ชาวประมงรู้จักและนำปลาหน้าดินมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ส่งผลให้การประมงอวนลากขยายตัวเพิ่มขึ้น ทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดินถูกนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

บริเวณอ่าวไทยตอนในเป็นเขตรับผิดชอบในการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่จากอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ถึงอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศทางทะเล จากการมีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลลงมาถึง 5 สาย ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำเพชรบุรี มีระบบนิเวศป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำ มีระบบนิเวศหาดโคลน บริเวณสามสมุทร (สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม) ไปจนถึงบางส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มีระบบนิเวศหาดทรายตั้งแต่ชายฝั่งอำเภอยะอำ จังหวัดเพชรบุรี ลงไปจนถึงบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีระบบนิเวศเป็นเกาะแก่งบริเวณจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความหลากหลายของชนิด การแพร่กระจายของปลา และจัดเป็นแหล่งประมงที่สำคัญของอ่าวไทย


จากผลการศึกษาเพื่อประเมินสถานะทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยอวนลากแผ่นตะเฆ่ของเรือสำรวจประมง 2 (ภาพที่ 2) และได้รวบรวมตัวอย่างพร้อมภาพถ่ายปลาจากการสำรวจเป็นเวลากว่า 10 ปี ได้ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีหนังสือเกี่ยวกับความหลากหลายของปลาทะเลน้อยและค่อนข้างเก่า การจัดทำหนังสือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ในการแสดงศักยภาพความหลากหลายของปลาและเป็นฐานความรู้เกี่ยวกับปลาทะเลในน่านน้ำไทย เพื่อเผยแพร่สู่ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายของปลา อีกทั้งเพื่อเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการและเอกสารอ้างอิงในการศึกษาด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับ **“ปลาทะเล”** ในน่านน้ำไทย

## พื้นที่และวิธีการศึกษา


รวบรวมข้อมูลชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากการสำรวจตามแผนดำเนินงานประจำปีของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยพื้นที่อ่าวไทยตอนในมีการกำหนดสถานีสำรวจพื้นที่ 15 x 15 ไมล์ทะเล จำนวน 11 สถานี เก็บข้อมูลปีละ 4 ครั้ง ในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม และกรกฎาคม นอกจากนี้ยังมีการสำรวจในบริเวณนอกเหนือจากแผนงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การสำรวจสัตว์น้ำตามระยะห่างฝั่ง การสำรวจสัตว์น้ำตามแผนงาน การปิดอ่าวตัว ก (ภาพที่ 3) ดำเนินการโดยใช้เรือประมง 2 ซึ่งเป็นเรือไม่มีขนาดความยาวตลอดลำเรือ 24.30 เมตร ความกว้าง 5.20 เมตร เครื่องจักรใหญ่มีขนาด 500 แรงม้า ทำการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำโดยการลากอวนด้วยเครื่องมืออวนลากปลาแบบเยอร์มันมีแผ่นตะเฒ่ ขนาดความยาวคร่าว่น 39 เมตร ความยาวคร่าว่นล่าง 51 เมตร ขนาดตาอวนก้นถุง 40 มิลลิเมตร และคลุมด้วยอวนคลุมก้นถุงขนาดตาอวน 25 มิลลิเมตร (ภาพที่ 4)



ภาพที่ 2 การเก็บข้อมูลโดยอวนลากแผ่นตะเฒ่ของเรือสำรวจประมง 2



ภาพที่ 3 พื้นที่สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณอ่าวไทยตอนบน



ภาพที่ 4 แบบแปลนอวนลากปลาแบบเยอรมันมีแผ่นตะเเม่ที่ใช้ในการสำรวจ

## วิธีการศึกษา

ตัวอย่างปลาที่ได้ในการศึกษาและถ่ายภาพได้ถูกรวบรวมมาจากเรือสำรวจประมง 2 ตั้งแต่ปี 2549–2562 โดยจะจำแนกชนิดพร้อมกับถ่ายภาพในภาคสนาม ส่วนของปลาที่ไม่สามารถจำแนกชนิดได้ในภาคสนาม จะทำการดองตัวอย่างด้วยสารละลายฟอร์มาลินแล้วนำกลับมาศึกษาในห้องปฏิบัติการ การจัดลำดับทางวิวัฒนาการจะอ้างอิงตามระบบของ Nelson *et al.* (2016) และปลาในวงศ์ Polynemidae ตามเอกสารของ Wang *et al.* (2015) จำแนกชนิดปลาโดยเอกสารของ Masuda *et al.* (1984) Margaret and Heemstra (1986) Talwar and Jhingran (1991) Kottelat *et al.* (1993) Premcharoen (1993) de Bruin *et al.* (1995) Satapoomin and Poovachiranon (1997) Allen *et al.* (2000) Carpenter and Niem (1998, 1999a, 1999b, 2001a, 2001b) Tongnunui *et al.* (2002) Kuitert and Debelius (2006) Murdy (2006) Randall and Desoutter-Meniger (2007) Chakrabarty and Sparks (2008) Yoshida *et al.* (2013) และชวลิต (2528) ประภากร (2528) ศิริประภา (2536) มนฤดี (2546) อุกฤต (2550) อภินันท์ และวุฒิพจน์ (2553) ทศพล (2560) รวมทั้งเอกสารและผลงานตีพิมพ์ทาง Internet ได้แก่ [www.kahaku.go.jp/research/db/zoology/Fishes\\_of\\_Andaman\\_Sea/](http://www.kahaku.go.jp/research/db/zoology/Fishes_of_Andaman_Sea/) ชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาจะอ้างอิงตาม [www.fishbase.org](http://www.fishbase.org) ในส่วนของชื่อภาษาไทยและชื่อท้องถิ่นใช้ตามเอกสารของปริยนาฏ (2532) และจากการสอบถามชาวประมงในพื้นที่ ปลาที่ได้จากการสำรวจจะแบ่งตามคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นปลาที่มีค่าทางเศรษฐกิจ (Economic fishes; E) และปลาที่ไม่มีค่าทางเศรษฐกิจ (Non-Economic fishes; NE) และแบ่งกลุ่มตามถิ่นอาศัยเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มปลาผิวน้ำ (Pelagic fishes; PL) และกลุ่มปลาหน้าดิน (Demersal fishes; DM)

ผลการศึกษาชนิดปลาด้วยเครื่องมืออวนลากปลาแบบเยอร์มันมีแผ่นตะเฒ่จากเรือสำรวจประมง 2 ตั้งแต่ปี 2549–2562 พบปลา 30 อันดับ 76 วงศ์ 251 ชนิด แบ่งเป็นปลาที่มีค่าทางเศรษฐกิจ 14 อันดับ 38 วงศ์ 146 ชนิด และปลาที่ไม่มีค่าทางเศรษฐกิจ 16 อันดับ 39 วงศ์ 105 ชนิด เป็นกลุ่มปลาผิวน้ำ 4 อันดับ 10 วงศ์ 48 ชนิด และกลุ่มปลาหน้าดิน 26 อันดับ 65 วงศ์ 203 ชนิด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1



ตารางที่ 1 ชนิดปลา สถานภาพทางเศรษฐกิจ และแหล่งอาศัย

| No. | Order             | Family           | Scientific Name                                        | Common Name              | Thai Name                  | Economic Status | Habitat Type |
|-----|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 1   | Orectolobiformes  | Hemiscylliidae   | <i>Chiloscyllium punctatum</i> Müller & Henle, 1838    | Brownbanded bamboo shark | ฉลามกบ, ฉลามทราย           | E               | DM           |
| 2   |                   |                  | <i>Chiloscyllium hasseltii</i> Bleeker, 1852           | Hasselt's bamboo shark   | ฉลามกบ, ฉลามทราย           | E               | DM           |
| 3   | Carcharhiniformes | Scyliorhinidae   | <i>Atelomycterus marmoratus</i> (Bennett, 1830)        | Coral catshark           | ฉลามลายหินอ่อน             | E               | DM           |
| 4   |                   | Carcharhinidae   | <i>Carcharhinus sorrah</i> (Müller & Henle, 1839)      | Spot-tail shark          | ฉลามหูดำ                   | E               | DM           |
| 5   | Myliobatiformes   | Dasyatidae       | <i>Brevitrygon imbricata</i> (Bloch & Schneider, 1801) | Bengal whipray           | กระบัง, ตู๊กกา             | E               | DM           |
| 6   |                   |                  | <i>Brevitrygon heterura</i> (Bleeker, 1852)            | Dwarf whipray            | กระบัง, ตู๊กกา             | E               | DM           |
| 7   |                   |                  | <i>Hemitrygon akajei</i> (Müller & Henle, 1841)        | Whip stingray            | กระเบนหางยาว, กระเบนแดง    | E               | DM           |
| 8   |                   |                  | <i>Maculabatis gerrardi</i> (Gray, 1851)               | Sharpnose stingray       | กระเบนแมลงวันจุดขาว        | E               | DM           |
| 9   |                   |                  | <i>Neotrygon kuhlii</i> (Müller & Henle, 1841)         | Blue-spotted stingray    | กระเบนจุดฟ้า               | E               | DM           |
| 10  |                   |                  | <i>Neotrygon varidens</i> (Garman, 1885)               | Mahogany maskray         | กระเบนจุมูกิโตสีน้ำตาล     | E               | DM           |
| 11  |                   |                  | <i>Talatrygon zugei</i> (Müller & Henle, 1841)         | Pale-edged stingray      | กระเบนปากแหลม              | E               | DM           |
| 12  |                   |                  | <i>Taeniura lymma</i> (Forsskal, 1775)                 | Ribbontail stingray      | กระเบนทอง, กระเบนหิน       | E               | DM           |
| 13  |                   | Myliobatidae     | <i>Aetobatus ocellatus</i> (Kuhl, 1823)                | Ocellated eagle ray      | กระเบนนกเงือกขาว, อีชี     | E               | DM           |
| 14  | Anguilliformes    | Muraenidae       | <i>Gymnothorax pseudothyrsoides</i> (Bleeker, 1853)    | Highfin moray            | ไหลมอเรย์                  | NE              | DM           |
| 15  |                   | Ophichthidae     | <i>Pisodonophis cancrivorus</i> (Richardson, 1844)     | Burrowing snake eel      | ไหลงู                      | NE              | DM           |
| 16  |                   | Muraenesocidae   | <i>Muraenesox bagio</i> (Hamilton, 1822)               | Common pike conger       | ยอดจาก                     | E               | DM           |
| 17  | Clupeiformes      | Pristigasteridae | <i>Ilisha kampeni</i> (Weber and de Beaufort, 1913)    | Kampen's ilisha          | ชีมุดยาว, เล็กอี้อ, ตาตุ่ม | E               | PL           |
| 18  |                   |                  | <i>Ilisha melastoma</i> (Bloch & Schneider, 1801)      | Indian ilisha            | ชีมุดาโด, เล็กอี้อ, ตาตุ่ม | E               | PL           |
| 19  |                   | Engraulidae      | <i>Encrasicholina heteroloba</i> (Ruppell, 1837)       | Shorthead anchovy        | กะตึกตัวกลม                | E               | PL           |
| 20  |                   |                  | <i>Stolephorus dubiosus</i> Wongratana, 1983           | Thai anchovy             | กะตึก, กังอี้อ             | E               | PL           |
| 21  |                   |                  | <i>Stolephorus indicus</i> (van Hasselt, 1823)         | Indian anchovy           | กะตึกควาย, ไล่ตัน          | E               | PL           |
| 22  |                   |                  | <i>Stolephorus insularis</i> Hardenberg, 1933          | Hardenberg anchovy       | กะตึกหัวป้าน, กังอี้อ      | E               | PL           |
| 23  |                   |                  | <i>Thryssa hamiltonii</i> (Gray, 1835)                 | Hamilton thryssa         | แมง                        | E               | PL           |
| 24  |                   | Chirocentridae   | <i>Chirocentrus nudus</i> Swainson, 1839               | Whitefin wolf-herring    | ไต้ตอ, ตาปลาว, ฝึกพรา      | E               | PL           |
| 25  |                   | Clupeidae        | <i>Anodontostoma chacunda</i> (Hamilton, 1822)         | Chacunda gizzard shad    | โศก, ตะเพียนน้ำเค็ม        | E               | PL           |
| 26  |                   |                  | <i>Dussumieria acuta</i> Valenciennes, 1847            | Rainbow sardine          | กุแกล้วย                   | E               | PL           |

| No. | Order             | Family           | Scientific Name                                                     | Common Name                | Thai Name             | Economic Status | Habitat Type |
|-----|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 27  |                   |                  | <i>Esuolosa thoracata</i> (Valenciennes, 1847)                      | White sardine              | เกล็ดเงิน             | E               | PL           |
| 28  |                   |                  | <i>Herkotsichthys dispilonotus</i> (Bleeker, 1852)                  | Blacksaddle herring        | แซ่ตังตองจูด          | E               | PL           |
| 29  |                   |                  | <i>Sardinella albella</i> (Valenciennes, 1847)                      | White sardinella           | หลังเขียวเกล็ดขาว     | E               | PL           |
| 30  |                   |                  | <i>Sardinella gibbosa</i> (Bleeker, 1849)                           | Goldstripe sardine         | หลังเขียวแถบทอง       | E               | PL           |
| 31  | Siluriformes      | Plotosidae       | <i>Plotosus canius</i> Hamilton, 1822                               | Gray eel-catfish           | ดุกทะเล               | E               | DM           |
| 32  |                   |                  | <i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787)                           | Striped eel catfish        | ดัก, ปิ่นแก้ว, ชิวม้อ | E               | DM           |
| 33  | Aulopiformes      | Synodontidae     | <i>Saurida elongata</i> (Temminck & Schlegel, 1846)                 | Slender lizardfish         | ปากคม                 | E               | DM           |
| 34  |                   |                  | <i>Saurida isaranakurai</i> Shindo & Yamada, 1972                   | Shortjaw saury             | ปากคมอีศรางกูร        | E               | DM           |
| 35  |                   |                  | <i>Saurida undosquamis</i> (Richardson, 1848)                       | Brusetooth lizardfish      | ปากคมหางจูด           | E               | DM           |
| 36  |                   |                  | <i>Trachinocephalus myops</i> (Forster, 1801)                       | Snakefish                  | ปากคมหูดำ, นากโก      | E               | DM           |
| 37  |                   |                  | <i>Synodus variegatus</i> (Lacepède, 1803)                          | Variegated lizardfish      | ปากคมลาย              | E               | DM           |
| 38  | Gadiformes        | Bregmaceroitidae | <i>Bregmaceros pseudolanceolatus</i> Torii, Javonillo & Ozawa, 2004 | False lance codlet         | กูเราแคระ             | NE              | PL           |
| 39  | Holocentridae     | Holocentridae    | <i>Sargocentron rubrum</i> (Forsskal, 1775)                         | Squirrelfishes             | หัวกลม่าน้ำลึก, ตาโต  | NE              | DM           |
| 40  | Batrachoidiformes | Batrachoididae   | <i>Batrachomoeus trispinosus</i> (Günther, 1861)                    | Three-spined frogfish      | คางคก, กบ, อุบ        | NE              | DM           |
| 41  | Kurtiliformes     | Apogonidae       | <i>Ostorhinchus pleuron</i> Fraser, 2005                            | Rib-bar cardinalfish       | อมไข่                 | NE              | DM           |
| 42  |                   |                  | <i>Ostorhinchus endekataenia</i> (Bleeker, 1852)                    | Candy stripe cardinalfish  | อมไข่                 | NE              | DM           |
| 43  |                   |                  | <i>Ostorhinchus nigrochota</i> (Smith & Radcliffe, 1912)            | Blackbelt cardinalfish     | อมไข่                 | NE              | DM           |
| 44  |                   |                  | <i>Ostorhinchus cavitensis</i> (Jordan & Seale, 1907)               | Whiteline cardinalfish     | อมไข่                 | NE              | DM           |
| 45  |                   |                  | <i>Jaydia truncata</i> (Bleeker, 1855)                              | Flagfin cardinalfish       | อมไข่                 | NE              | DM           |
| 46  |                   |                  | <i>Jaydia poeciloptera</i> (Cuvier, 1828)                           | Pearly-finned cardinalfish | อมไข่                 | NE              | DM           |
| 47  |                   |                  | <i>Jaydia striatodes</i> (Gon, 1997)                                | Cardinalfish               | อมไข่                 | NE              | DM           |
| 48  |                   |                  | <i>Apogonichthyoides niger</i> (Döderlein, 1883)                    | Cardinalfish               | อมไข่                 | NE              | DM           |
| 49  |                   |                  | <i>Archamia bleekeri</i> (Günther, 1859)                            | Gon's cardinalfish         | อมไข่                 | NE              | DM           |
| 50  |                   |                  | <i>Cheilodipterus artus</i> Smith, 1961                             | Wolf cardinalfish          | อมไข่                 | NE              | DM           |
| 51  | Gobiiformes       | Oxudercidae      | <i>Pseudapocryptes elongatus</i> (Cuvier, 1816)                     | Slender mudskipper         | ทองเขียว              | NE              | DM           |
| 52  |                   |                  | <i>Stigmatogobius sadanundio</i> (Hamilton, 1822)                   | Spotted goby               | ปูจุด                 | NE              | DM           |



| No. | Order          | Family           | Scientific Name                                         | Common Name            | Thai Name                      | Economic Status | Habitat Type |
|-----|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| 53  |                |                  | <i>Trypauchen pelaeos</i> Murdy, 2006                   | Burrowing goby         | เตี๋ยแดง                       | E               | DM           |
| 54  |                | Gobiidae         | <i>Arogyobius baliurus</i> Valenciennes, 1837           | Isthmus goby           | ปู                             | E               | DM           |
| 55  |                |                  | <i>Amblyeleotris</i> sp.                                | Goby                   | ปูข้าง                         | NE              | DM           |
| 56  |                |                  | <i>Acentrogobius carinus</i> Valenciennes, 1837         | Dog-toothed goby       | ปูทะเล                         | NE              | DM           |
| 57  |                |                  | <i>Acentrogobius viridipunctatus</i> Valenciennes, 1837 | Spotted green goby     | ปูจุดเขียว                     | NE              | DM           |
| 58  |                |                  | <i>Myrsina filifer</i> Valenciennes, 1837               | Filamentous shrimpgoby | ปูกุ้งครีบน้ำขาว               | NE              | DM           |
| 59  |                |                  | <i>Parachaeturichthys polynema</i> (Bleeker, 1853)      | Tailed goby            | ปูหางจุด                       | NE              | DM           |
| 60  |                |                  | <i>Priolepis</i> sp.                                    | Goby                   | ปูปะการัง                      | NE              | DM           |
| 61  |                | Ambassidae       | <i>Ambassis gymnocephalus</i> (Lacepède, 1802)          | Glassy perchlet        | ข้าวเม่า                       | NE              | DM           |
| 62  |                |                  | <i>Ambassis kopsii</i> Bleeker, 1858                    | Glassy perchlet        | ข้าวเม่า                       | NE              | DM           |
| 63  |                | Pomacentridae    | <i>Negpomacentrus azyron</i> (Bleeker, 1877)            | Yellowtail demoiselle  | สลิดหินหางเหลือง               | NE              | DM           |
| 64  |                | Opisthognathidae | <i>Opistognathus macrolepis</i> Peters, 1866            | Bigscale jawfish       | ปากกว้าง                       | NE              | DM           |
| 65  | Mugiliformes   | Polynemidae      | <i>Eleutheronema tetradactylum</i> (Shaw, 1804)         | Fourfinger threadfin   | กูราหนวดดีเส้น                 | E               | PL           |
| 66  |                | Mugilidae        | <i>Orenimugil buchanani</i> (Bleeker, 1853)             | Bluetail mullet        | กระบอกหางเขียว                 | E               | PL           |
| 67  |                |                  | <i>Osteomugil cunnesius</i> Valenciennes, 1836          | Longarm mullet         | กระบอกหางกลม                   | E               | PL           |
| 68  |                |                  | <i>Planiliza subviridis</i> Valenciennes, 1836          | Greenback mullet       | กระบอกดำ                       | E               | PL           |
| 69  | Bleenniiformes | Bleeniidae       | <i>Omobranchus punctatus</i> Valenciennes, 1836         | Muzzled blenny         | ตะกแตนหินปากยื่น               | NE              | DM           |
| 70  |                |                  | <i>Xiphasia setifer</i> Swainson, 1839                  | Hairtail blenny        | กระปี่                         | NE              | DM           |
| 71  |                |                  | <i>Melacanthus cf. luteus</i> (Smith-Vaniz, 1987)       | Fangblenny             | ตะกแตนหินเขียว                 | NE              | DM           |
| 72  | Atheriniformes | Atherinidae      | <i>Atherinomorus duodecimalis</i> Valenciennes, 1835    | Tropical silverside    | หัวตะกั่ว                      | NE              | PL           |
| 73  | Carangiformes  | Rachycentridae   | <i>Rachycentron canadum</i> (Linnaeus, 1766)            | Cobia                  | ช้อนทะเล, ไยไย                 | E               | DM           |
| 74  |                | Echeneidae       | <i>Echeneis naucrates</i> Linnaeus, 1758                | Sharksucker            | เหราฉลาม                       | NE              | DM           |
| 75  |                | Carangidae       | <i>Alectis ciliaris</i> (Bloch, 1787)                   | African pompano        | โจมนงาม, จุ่ม, ผมนาง           | E               | PL           |
| 76  |                |                  | <i>Alectis indica</i> (Ruppell, 1830)                   | Indian threadfish      | โจมนงาม, จุ่ม, ผมนาง           | E               | PL           |
| 77  |                |                  | <i>Alepes djedaba</i> (Forsskål, 1775)                  | Shrimp scad            | สีกันแก้วดำ                    | E               | PL           |
| 78  |                |                  | <i>Alepes melanoptera</i> Swainson, 1839                | Blackfin scad          | สีขนทอง, หางแก้ว, หางเหลืองทอง | E               | PL           |
| 79  |                |                  | <i>Alepes kleinii</i> (Bloch, 1793)                     | Banded scad            | สีขนเขียว                      | E               | PL           |

| No. | Order             | Family          | Scientific Name                                            | Common Name                   | Thai Name                                 | Economic Status | Habitat Type |
|-----|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 80  |                   |                 | <i>Alepes vari</i> (Cuvier, 1833)                          | Herring scad                  | สีกันมากขาย                               | E               | PL           |
| 81  |                   |                 | <i>Atropus atropus</i> (Bloch and Schneider, 1801)         | Cleftbelly trevally           | อัยจีน, ตะโกกรขาว                         | E               | PL           |
| 82  |                   |                 | <i>Atule mate</i> (Cuvier, 1833)                           | Yellowtail scad               | สีขนกลม, สีกันมั่ง, หางกิว                | E               | PL           |
| 83  |                   |                 | <i>Carangoides armatus</i> (Ruppell, 1830)                 | Longfin trevally              | อัยจีน                                    | E               | PL           |
| 84  |                   |                 | <i>Carangoides coeruleopinnatus</i> (Ruppell, 1830)        | Coastal trevally              | สีกันแป้นจุดเหลือง                        | E               | PL           |
| 85  |                   |                 | <i>Carangoides hedlandensis</i> (Whitley, 1934)            | Bumpnose trevally             | สีกันครีบยาว, มงแซ่, ผมนาง                | E               | PL           |
| 86  |                   |                 | <i>Carangoides malabaricus</i> (Bloch and Schneider, 1801) | Malabar trevally              | อัยจีน, สีกัน                             | E               | PL           |
| 87  |                   |                 | <i>Carangoides praeustus</i> (Bennett, 1830)               | Brownback trevally            | สีกันครีบบดำ                              | E               | PL           |
| 88  |                   |                 | <i>Caranx sextasciatus</i> Quoy and Gaimard, 1825          | Bigeye trevally               | สีกัน, หางกิวหม้อ, แ่งม้วย, สีขน, หางแซ้ง | E               | PL           |
| 89  |                   |                 | <i>Decapterus russelli</i> (Ruppell, 1830)                 | Indian scad                   | ทูแขก                                     | E               | PL           |
| 90  |                   |                 | <i>Gnathanodon speciosus</i> (Forsskål, 1775)              | Golden trevally               | ตะดองเหลือง                               | E               | PL           |
| 91  |                   |                 | <i>Megalaspis cordyla</i> (Linnaeus, 1758)                 | Torpedo scad                  | หางแซ้ง, แซ้งไก่                          | E               | PL           |
| 92  |                   |                 | <i>Parastromateus niger</i> (Bloch, 1796)                  | Black pomfret                 | จะละเม็ดดำ                                | E               | PL           |
| 93  |                   |                 | <i>Scomberoides commersonianus</i> Lacepède, 1801          | Talang queenfish              | ตลละ                                      | E               | PL           |
| 94  |                   |                 | <i>Selar boops</i> (Cuvier, 1833)                          | Oxeye scad                    | สีกันตาวัว                                | E               | PL           |
| 95  |                   |                 | <i>Selar crumenophthalmus</i> (Bloch, 1793)                | Bigeye scad                   | สีกันตาพอง                                | E               | PL           |
| 96  |                   |                 | <i>Selaroides leptolepis</i> (Cuvier, 1833)                | Yellowstripe scad             | ข้างเหลือง, กิมซัว, สีกันข้างลวด          | E               | PL           |
| 97  |                   |                 | <i>Seriolina nigrofasciata</i> (Ruppell, 1829)             | Blackbanded trevally          | ดำลี                                      | E               | PL           |
| 98  |                   |                 | <i>Ulua mentalis</i> (Cuvier, 1833)                        | Longrakered trevally          | อัยจีน                                    | E               | PL           |
| 99  |                   |                 | <i>Uraspis uraspis</i> (Günther, 1860)                     | Whitemouth jack               | อัยจีนมั่ง                                | E               | PL           |
| 100 |                   | Menidae         | <i>Mene maculata</i> (Bloch and Schneider, 1801)           | Moonfish                      | พระจันทร์, เปโพรี                         | E               | DM           |
| 101 | Istophoriformes   | Sphyraenidae    | <i>Sphyraena jello</i> Cuvier, 1829                        | Pickhandle barracuda          | ตากดำ, ตากพวย                             | E               | DM           |
| 102 |                   |                 | <i>Sphyraena obtusata</i> Cuvier, 1829                     | Obtuse barracuda              | ตากเหลือง, น้ำดอกไม้                      | E               | DM           |
| 103 | Pleuronectiformes | Citharidae      | <i>Brachypleura novaezealandiae</i> Günther, 1862          | Widemouth largescale flatfish | ตีกเดียวครีบบจุด                          | NE              | DM           |
| 104 |                   | Paralichthyidae | <i>Pseudorhombus javanicus</i> (Bleeker, 1853)             | Javan flounder                | ใบขนุน, ลิ่นควาย                          | NE              | DM           |



| No. | Order            | Family          | Scientific Name                                               | Common Name                | Thai Name                 | Economic Status | Habitat Type |
|-----|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| 105 |                  | Bothidae        | <i>Amoglossus aspiros</i> (Bleeker, 1851)                     | Spotless lefteye flounder  | ลิ้นควาย, ใบไม้           | NE              | DM           |
| 106 |                  |                 | <i>Engypropon grandisquama</i> (Temminck and Schlegel, 1846)  | Largescale flounder        | ใบขนุน, ลิ้นควาย          | NE              | DM           |
| 107 |                  |                 | <i>Grammatobothus polyophthalmus</i> (Bleeker, 1866)          | Manyeyed flounder          | ชีกเดียว, ลิ้นหมาหงอนสั้น | NE              | DM           |
| 108 |                  | Samaridae       | <i>Samaris cristatus</i> Gray, 1831                           | Cockatoo righteye flounder | ลิ้นหมาหงอนยาว            | NE              | DM           |
| 109 |                  | Soleidae        | <i>Aseraggodes cf. dubius</i> (Weber, 1913)                   | Sole                       | ลิ้นควาย                  | NE              | DM           |
| 110 |                  |                 | <i>Pardachirus pavoninus</i> (Lacepède, 1802)                 | Peacock sole               | ลิ้นควายจุด               | NE              | DM           |
| 111 |                  |                 | <i>Solea ovata</i> Richardson, 1846                           | Ovate sole                 | ชีกเดียว                  | NE              | DM           |
| 112 |                  |                 | <i>Synaptura commersonii</i> (Lacepède, 1802)                 | Commerson's sole           | ลิ้นควาย                  | E               | DM           |
| 113 |                  |                 | <i>Zebrias quagga</i> (Kaup, 1858)                            | Fringefin zebra sole       | ลิ้นหมาลาย                | NE              | DM           |
| 114 |                  | Cynoglossidae   | <i>Cynoglossus arel</i> (Bloch & Schneider, 1801)             | Largescale tonguesole      | ยอดม่วง, ลิ้นหมา          | E               | DM           |
| 115 |                  |                 | <i>Cynoglossus bilineatus</i> (Lacepède, 1802)                | Fourlined tonguesole       | ยอดม่วง, ลิ้นหมา          | E               | DM           |
| 116 |                  |                 | <i>Cynoglossus cynoglossus</i> (Hamilton, 1822)               | Gangetic tonguesole        | ยอดม่วง, ลิ้นหมา          | E               | DM           |
| 117 |                  |                 | <i>Cynoglossus kopsii</i> (Bleeker, 1851)                     | Shortheaded tonguesole     | ยอดม่วง, ลิ้นหมา          | E               | DM           |
| 118 |                  |                 | <i>Cynoglossus puncticep</i> (Richardson, 1846)               | Mottled tonguesole         | ยอดม่วงลาย                | E               | DM           |
| 119 | Syngnathiformes  | Pegasidae       | <i>Pegasus laterarius</i> Cuvier, 1816                        | Brick seamoth              | ผีเสื้อกลางคืนสั้น        | NE              | DM           |
| 120 |                  |                 | <i>Pegasus voltans</i> Linnaeus, 1758                         | Longtail seamoth           | ผีเสื้อกลางคืนหางยาว      | NE              | DM           |
| 121 |                  | Syngnathidae    | <i>Halicampus grayi</i> Kaup, 1856                            | Gray's pipefish            | จิมฟันจระเข้              | NE              | DM           |
| 122 |                  |                 | <i>Hippichthys (Parasyngnathus) pericillus</i> (Cantor, 1849) | Beady pipefish             | จิมฟันจระเข้              | NE              | DM           |
| 123 |                  |                 | <i>Trachyrhamphus longirostris</i> Kaup, 1856                 | Straightstick pipefish     | จิมฟันจระเข้              | E               | DM           |
| 124 |                  |                 | <i>Hippocampus spinosissimus</i> Weber, 1913                  | Hedgehog seahorse          | ม้าน้ำหนาม                | E               | DM           |
| 125 |                  |                 | <i>Hippocampus trimaculatus</i> Leach, 1814                   | Longnose seahorse          | ม้าน้ำสามจุด              | E               | DM           |
| 126 |                  | Fistularidae    | <i>Fistularia petimba</i> Lacepède, 1803                      | Red cornetfish             | ปากแตร                    | NE              | DM           |
| 127 |                  | Centriscidae    | <i>Aeoliscus strigatus</i> (Günther, 1861)                    | Razorfish                  | ข้างใต้, ใบมีดโกน         | NE              | DM           |
| 128 |                  | Dactylopteridae | <i>Dactyloptena orientalis</i> (Cuvier, 1829)                 | Oriental flying gurnard    | นกชุก                     | NE              | DM           |
| 129 | Callionymiformes | Callionymidae   | <i>Callionymus meridionalis</i> Suwadij, 1965                 | Whitetail dragonet         | มังกรน้อย                 | NE              | DM           |
| 130 |                  |                 | <i>Callionymus sagitta</i> (Pallas, 1770)                     | Sand dragonet              | มังกรน้อย                 | NE              | DM           |

| No. | Order          | Family          | Scientific Name                                      | Common Name                   | Thai Name                | Economic Status | Habitat Type |
|-----|----------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| 131 |                |                 | <i>Dactylopus dactylopus</i> (Valenciennes, 1837)    | Fingered dragonet             | มังกรน้อย                | NE              | DM           |
| 132 | Scombriformes  | Trichiuridae    | <i>Trichiurus lepturus</i> Linnaeus, 1758            | Largehead hairtail            | ดาบเงิน                  | E               | DM           |
| 133 |                | Scombridae      | <i>Rastrelliger brachysoma</i> (Bleeker, 1851)       | Short mackerel                | ทู, ทุสัน                | E               | PL           |
| 134 |                |                 | <i>Rastrelliger kanagurta</i> (Cuvier, 1816)         | Indian mackerel               | ดิ่ง, ทุยาว              | E               | PL           |
| 135 |                |                 | <i>Scomberomorus commerson</i> (Lacepède, 1800)      | Narrowbarred spanish mackerel | อินทรีบัง                | E               | PL           |
| 136 | Trachiniformes | Champsodontidae | <i>Champsodon cf. capensis</i> Regan, 1908           | Gunther's gaper               | สากยี่                   | NE              | DM           |
| 137 |                | Pinguipedidae   | <i>Paraperis filamentosa</i> (Steindachner, 1878)    | Threadfin sandperch           | ตาแดงครีบยาว             | NE              | DM           |
| 138 |                |                 | <i>Paraperis millepunctata</i> Günther, 1860         | Spotted sandperch             | ตาแดงลายจุด              | NE              | DM           |
| 139 |                |                 | <i>Paraperis xanthona</i> (Bleeker, 1849)            | Yellowbar sandperch           | ตาแดงแถบเหลือง           | NE              | DM           |
| 140 | Labriformes    | Labridae        | <i>Choerodon schoenleinii</i> (Valenciennes, 1839)   | Blackspot tuskfish            | แก้วกู                   | NE              | DM           |
| 141 |                |                 | <i>Halichoeres bicolor</i> (Bloch & Schneider, 1801) | Pearly-spotted wrasse         | นกขุนทอง                 | NE              | DM           |
| 142 |                |                 | <i>Xiphochelilus typus</i> Bleeker, 1856             | Blue-banded wrasse            | นกขุนทอง                 | NE              | DM           |
| 143 | Perciformes    | Gerreidae       | <i>Gerres erythrorus</i> (Bloch, 1791)               | Deepbody silver-biddy         | ดอกหมากครีบลิ้น          | E               | DM           |
| 144 |                |                 | <i>Gerres filamentosus</i> Cuvier, 1829              | Whipfin silver-biddy          | ดอกหมากกระโดง            | E               | DM           |
| 145 |                |                 | <i>Gerres macrosoma</i> Bleeker, 1854                | Largebodied silver-biddy      | ดอกหมาก                  | E               | DM           |
| 146 |                |                 | <i>Gerres oyena</i> (Forsskal, 1775)                 | Common silver-biddy           | ดอกหมาก                  | E               | DM           |
| 147 |                |                 | <i>Gerres longirostris</i> (Lacepède, 1801)          | Strongspine silver-biddy      | ดอกหมาก                  | E               | DM           |
| 148 |                |                 | <i>Pentapirion longimanus</i> (Cantor, 1849)         | Longfin silver-biddy          | แม่แก้ว                  | NE              | DM           |
| 149 |                | Mulidae         | <i>Parupeneus heptacanthus</i> (Lacepède, 1802)      | Cinnabar goatfish             | แพะหัวโต                 | E               | DM           |
| 150 |                |                 | <i>Parupeneus indicus</i> (Shaw, 1803)               | Indian goatfish               | แพะ                      | E               | DM           |
| 151 |                |                 | <i>Upeneus sulphureus</i> Cuvier, 1829               | Sulphur goatfish              | หนวดถั่วเขียว, แพะเหลือง | E               | DM           |
| 152 |                |                 | <i>Upeneus sundaicus</i> (Bleeker, 1855)             | Ochreband goatfish            | แพะแดง                   | E               | DM           |
| 153 |                |                 | <i>Upeneus tragula</i> (Richardson, 1846)            | Freckled goatfish             | หนวดถั่วเขียว, แพะลาย    | E               | DM           |
| 154 |                | Teraponidae     | <i>Terapon jarbua</i> (Forsskal, 1775)               | Jarbua terapon                | ข้างตะเภา                | E               | DM           |
| 155 |                |                 | <i>Terapon puta</i> (Cuvier, 1829)                   | Smallscaled terapon           | ข้างลาย                  | E               | DM           |
| 156 |                |                 | <i>Terapon theraps</i> Cuvier, 1829                  | Largescaled terapon           | ข้างลาย, ฟินพาท, มโนรี   | E               | DM           |
| 157 |                | Serranidae      | <i>Cephalopholis boenak</i> (Bloch, 1790)            | Chocolate hind                | กระวังทองก้าน            | E               | DM           |

| No. | Order          | Family | Scientific Name                                      | Common Name           | Thai Name                                | Economic Status | Habitat Type |
|-----|----------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 158 |                |        | <i>Diploprion bifasciatum</i> Cuvier, 1828           | Barred soapfish       | กะพงเหลืองเล็ก                           | NE              | DM           |
| 159 |                |        | <i>Epinephelus areolatus</i> (Forsskål, 1775)        | Areolate grouper      | กะรังลายทางตัด                           | E               | DM           |
| 160 |                |        | <i>Epinephelus bleekeri</i> (Vallant, 1878)          | Duskytail grouper     | กะรังจุดเหลือง, เก้าหางซ้อน              | E               | DM           |
| 161 |                |        | <i>Epinephelus coioides</i> (Hamilton, 1822)         | Orangespotted grouper | เก้าดอกแดง                               | E               | DM           |
| 162 |                |        | <i>Epinephelus quoyanus</i> (Valenciennes, 1830)     | Longfin grouper       | กะรังคอกน้ำตาล                           | E               | DM           |
| 163 |                |        | <i>Epinephelus sexfasciatus</i> (Valenciennes, 1828) | Sixbar grouper        | กะรังหกแถบ                               | E               | DM           |
| 164 |                |        | <i>Plectropomus leopardus</i> (Lacepède, 1802)       | Leopard coral grouper | กะรังลายเสือ                             | E               | DM           |
| 165 |                |        | <i>Plectropomus maculatus</i> (Bloch, 1790)          | Spotted coral grouper | ฉุนฤทธิ์                                 | E               | DM           |
| 166 | Priacanthidae  |        | <i>Priacanthus tayenus</i> Richardson, 1846          | Purplespot bigeye     | ตาโต, ตาหวาน                             | E               | DM           |
| 167 | Leiognathidae  |        | <i>Aurigequula fasciata</i> (Lacepède, 1803)         | Toothpony             | แป้นแถบ                                  | NE              | DM           |
| 168 |                |        | <i>Eubleekeria splendens</i> (Cuvier, 1829)          | Striped ponyfish      | แป้นเล็ก                                 | NE              | DM           |
| 169 |                |        | <i>Equulites elongatus</i> (Günther, 1874)           | Splendid ponyfish     | แป้นกระสวย                               | NE              | DM           |
| 170 |                |        | <i>Equulites leuciscus</i> (Günther, 1860)           | Elongate ponyfish     | แป้นกระโดงยาว                            | NE              | DM           |
| 171 |                |        | <i>Equulites lineolatus</i> (Valenciennes, 1835)     | Whiptin ponyfish      | แป้น                                     | NE              | DM           |
| 172 |                |        | <i>Gazza minuta</i> (Bloch, 1795)                    | Ornate ponyfish       | แป้นทะเล                                 | NE              | DM           |
| 173 |                |        | <i>Leiognathus brevirostris</i> (Valenciennes, 1835) | Shorthose ponyfish    | แป้นคอด้ว                                | NE              | DM           |
| 174 |                |        | <i>Nuchequula gerreoides</i> (Bleeker, 1851)         | Yellowfined ponyfish  | แป้นจมูกสั้น                             | NE              | DM           |
| 175 |                |        | <i>Photopectoralis bindus</i> (Valenciennes, 1835)   | Orangefin ponyfish    | แป้นกระดาน                               | NE              | DM           |
| 176 |                |        | <i>Secutor indicus</i> Monkolprasit, 1973            | Deep pugnose ponyfish | แป้นปากหมู                               | NE              | DM           |
| 177 |                |        | <i>Secutor insidiator</i> (Bloch, 1787)              | Pugnose ponyfish      | แป้นปากหมู                               | NE              | DM           |
| 178 |                |        | <i>Secutor ruconius</i> (Hamilton, 1822)             | Deep pugnose ponyfish | แป้นเบี่ยง, แป้นป้อม                     | NE              | DM           |
| 179 | Chaetodontidae |        | <i>Parachaetodon ocellatus</i> (Cuvier, 1831)        | Ocellate coral fish   | ผีเสื้อเอวดำ                             | NE              | DM           |
| 180 |                |        | <i>Coradion altivelis</i> McCulloch, 1916            | Highfin coral fish    | ผีเสื้อครีบสูง                           | NE              | DM           |
| 181 | Haemulidae     |        | <i>Diagramma pictum</i> (Thunberg, 1792)             | Painted sweetlips     | สัลดยนกเขา                               | E               | DM           |
| 182 |                |        | <i>Pomadasys maculatus</i> (Bloch, 1793)             | Saddle grunt          | กะพงแถม, กะทิพูด, มังกร, สีกู๊ด, หัวขวาน | E               | DM           |
| 183 | Lutjanidae     |        | <i>Lutjanus bohar</i> (Forsskål, 1775)               | Twospot red snapper   | กะพงแดงปานขาว                            | E               | DM           |

| No. | Order           | Family          | Scientific Name                                       | Common Name                  | Thai Name              | Economic Status | Habitat Type |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 184 |                 |                 | <i>Lutjanus johnii</i> (Bloch, 1792)                  | John's snapper               | กะพงแดงข้างปาน         | E               | DM           |
| 185 |                 |                 | <i>Lutjanus lutjanus</i> (Bloch, 1790)                | Bigeye snapper               | กะพงข้างเหลือง         | E               | DM           |
| 186 |                 |                 | <i>Lutjanus malabaricus</i> (Bloch & Schneider, 1801) | Malabar blood snapper        | กะพงแดง                | E               | DM           |
| 187 |                 |                 | <i>Lutjanus vitta</i> (Quoy & Gaimard, 1824)          | Brownstripe snapper          | กะพงข้างแถบ            | E               | DM           |
| 188 |                 | Caesionidae     | <i>Caesio cuning</i> (Bloch, 1791)                    | Redbelly yellowtail fusilier | กล้วยเหลือง            | E               | DM           |
| 189 |                 |                 | <i>Dipterygionotus baiteatus</i> (Valenciennes, 1830) | Mottled fusilier             | เหยี่ยวแดง             | NE              | DM           |
| 190 |                 |                 | <i>Pterocaesio chrysozona</i> (Cuvier, 1830)          | Goldband fusilier            | กล้วยแดง               | NE              | DM           |
| 191 |                 | Cepolidae       | <i>Acanthocephala abbreviata</i> (Valenciennes, 1835) | Bandfish                     | แถบ, กระปี่แดง         | NE              | DM           |
| 192 |                 | Scatophagidae   | <i>Scatophagus argus</i> (Linnaeus, 1766)             | Spotted scat                 | ตะกั่วกับ              | E               | DM           |
| 193 |                 | Siganidae       | <i>Siganus canaliculatus</i> (Park, 1797)             | Whitespotted spinefoot       | สลิดทะเลจุดขาว         | E               | DM           |
| 194 |                 |                 | <i>Siganus javus</i> (Linnaeus, 1766)                 | Streaked spinefoot           | สลิดทะเลแถบ            | E               | DM           |
| 195 | Scorpaeniformes | Scorpaenidae    | <i>Apistus carinatus</i> (Bloch & Schneider, 1801)    | Ocellated waspfish           | กะรังหัวโขนหูดำ        | NE              | DM           |
| 196 |                 |                 | <i>Pterois russelli</i> Bennett, 1831                 | Plaintail firefish           | สิงโต, มังกร           | NE              | DM           |
| 197 |                 |                 | <i>Scorpaenopsis cf. neglecta</i> Heckel, 1837        | Yellowfin scorpionfish       | กะรังหัวโขน            | NE              | DM           |
| 198 |                 |                 | <i>Iminicus cuvieri</i> (Grey, 1835)                  | Longsnout stinger            | กะรังหัวโขนยาว         | NE              | DM           |
| 199 |                 |                 | <i>Minous monodactylus</i> (Bloch & Schneider, 1801)  | Grey goblifish               | กะรังหัวโขนหูต่าง      | NE              | DM           |
| 200 |                 | Platycephalidae | <i>Elates ransonnetii</i> (Steindachner, 1876)        | Dwarf flathead               | ข้างเหยียบหัวแบน       | NE              | DM           |
| 201 |                 |                 | <i>Platycephalus indicus</i> (Linnaeus, 1758)         | Bartail flathead             | ข้างเหยียบ, หางควาย    | E               | DM           |
| 202 |                 |                 | <i>Rogadius pristiger</i> (Cuvier, 1829)              | Thorny flathead              | ข้างเหยียบ, หางควาย    | E               | DM           |
| 203 |                 |                 | <i>Sorsogona tuberculata</i> (Cuvier, 1829)           | Tuberculated flathead        | ข้างเหยียบ, หางควาย    | E               | DM           |
| 204 |                 |                 | <i>Suggrundus macracanthus</i> (Bleeker, 1869)        | Largespined flathead         | ข้างเหยียบ, หางควาย    | E               | DM           |
| 205 | Moroniiformes   | Drepanidae      | <i>Drepane punctata</i> (Linnaeus, 1758)              | Spotted sicklefish           | ใบปัด, หูข้าง, ใบโพธิ์ | E               | DM           |
| 206 |                 | Ephippidae      | <i>Platax batavianus</i> Cuvier, 1831                 | Humpback batfish             | หูช้าง                 | E               | DM           |
| 207 |                 |                 | <i>Platax orbicularis</i> (Forsskal, 1775)            | Copper batfish               | หูช้างกลม              | E               | DM           |
| 208 | Acanthuriformes | Sciaenidae      | <i>Dendrophysa russelli</i> (Cuvier, 1829)            | Goatee croaker               | จุดคอดำ                | E               | DM           |
| 209 |                 |                 | <i>Johnius amblycephalus</i> (Bleeker, 1855)          | Bearded croaker              | จุด                    | E               | DM           |
| 210 |                 |                 | <i>Johnius belangerii</i> (Cuvier, 1830)              | Belanger's croaker           | จุด                    | E               | DM           |



| No. | Order             | Family        | Scientific Name                                       | Common Name                  | Thai Name               | Economic Status | Habitat Type |
|-----|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 211 |                   |               | <i>Johnius carouna</i> (Cuvier, 1830)                 | Caroun croaker               | จวด                     | E               | DM           |
| 212 |                   |               | <i>Johnius macropterus</i> (Bleeker, 1853)            | Largefin croaker             | จวด                     | E               | DM           |
| 213 |                   |               | <i>Johnius macrorhynchus</i> (Lal Mohan, 1976)        | Bignout croaker              | จวด                     | E               | DM           |
| 214 |                   |               | <i>Johnius trachycephalus</i> (Bleeker, 1851)         | Leaf-tail croaker            | จวด                     | E               | DM           |
| 215 |                   |               | <i>Nibea solidado</i> (Lacepède, 1802)                | Soldier croaker              | จวด                     | E               | DM           |
| 216 |                   |               | <i>Otolithes ruber</i> (Bloch & Schneider, 1801)      | Tigertooth croaker           | จวดเทียน, จวดสามเหลี่ยม | E               | DM           |
| 217 |                   |               | <i>Panna microdon</i> (Bleeker, 1849)                 | Panna croaker                | จวดยาว                  | E               | DM           |
| 218 |                   |               | <i>Pennahia pawak</i> (Lin, 1940)                     | Donkey croaker               | จวด                     | E               | DM           |
| 219 | Spariformes       | Sillaginidae  | <i>Sillago sihama</i> (Forsskal, 1775)                | Silver sillago               | เห็ดโคน, ทวาย           | E               | DM           |
| 220 |                   | Nemipteridae  | <i>Nemipterus furcosus</i> (Valenciennes, 1830)       | Forktailed threadfin bream   | ทวายแดง                 | E               | DM           |
| 221 |                   |               | <i>Nemipterus hexodon</i> (Quoy & Gaimard, 1824)      | Ornate threadfin bream       | ทวายแดง                 | E               | DM           |
| 222 |                   |               | <i>Nemipterus nemurus</i> (Bleeker, 1857)             | Redspine threadfin bream     | ทวายแดง                 | E               | DM           |
| 223 |                   |               | <i>Nemipterus marginatus</i> (Valenciennes, 1830)     | Red filament threadfin bream | ทวายแดง                 | E               | DM           |
| 224 |                   |               | <i>Nemipterus mesoprion</i> (Bleeker, 1853)           | Mauvefin threadfin bream     | ทวายแดง                 | E               | DM           |
| 225 |                   |               | <i>Nemipterus tambuloides</i> (Bleeker, 1853)         | Fivelined threadfin bream    | ทวายแดง                 | E               | DM           |
| 226 |                   |               | <i>Pentapodus setosus</i> (Valenciennes, 1830)        | Butterfly whiptail           | สายรุ้ง, นกทะเล         | NE              | DM           |
| 227 |                   |               | <i>Scolopsis affinis</i> Peters, 1877                 | Peters' monocle bream        | ทวายขาว                 | E               | DM           |
| 228 |                   |               | <i>Scolopsis margaritifer</i> (Cuvier, 1830)          | Pearly monocle bream         | ทวายขาว                 | E               | DM           |
| 229 |                   |               | <i>Scolopsis monogramma</i> (Cuvier, 1830)            | Monogrammed monocle bream    | ทวายขาว                 | E               | DM           |
| 230 |                   |               | <i>Scolopsis taeniopterus</i> (Cuvier, 1830)          | Lattice monocle bream        | ทวายขาว                 | E               | DM           |
| 231 |                   |               | <i>Scolopsis vosmeri</i> (Bloch, 1792)                | Whitecheek monocle bream     | กรัง, ข้างเปือก         | E               | DM           |
| 232 |                   | Lethrinidae   | <i>Lethrinus lenjan</i> (Lacepède, 1802)              | Pink ear emperor             | หมูสีแก้มแดง            | E               | DM           |
| 233 | Lophiiformes      | Antennariidae | <i>Antennarius hispidus</i> (Bloch & Schneider, 1801) | Shaggy angler                | กบ, ล่อเหยื่อ           | NE              | DM           |
| 234 | Tetraodontiformes | Triacanthidae | <i>Triacanthus nieuhoffi</i> Bleeker, 1852            | Silver tripodfish            | วัวสามขา                | NE              | DM           |
| 235 |                   |               | <i>Tripodichthys blochii</i> (Bleeker, 1852)          | Longtail tripodfish          | วัวสามขาหางยาว          | NE              | DM           |
| 236 |                   | Ostraciidae   | <i>Lactoria cornuta</i> (Linnaeus, 1758)              | Longhorn cowfish             | สี่เหลี่ยมเขี้ยว        | NE              | DM           |
| 237 |                   |               | <i>Ostracion cubicus</i> Linnaeus, 1758               | Yellow trunkfish             | ปักปากล่อง              | NE              | DM           |

| No. | Order | Family         | Scientific Name                                       | Common Name                 | Thai Name             | Economic Status | Habitat Type |
|-----|-------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 238 |       |                | <i>Ostracion rhinorhynchus</i> Bleeker, 1851          | Horn-nosed boxfish          | ปักเป้ากล่องงมูกยาว   | NE              | DM           |
| 239 |       | Monacanthidae  | <i>Aluterus monoceros</i> (Linnaeus, 1758)            | Unicorn leatherjacket       | วัว, กวาง, วัวหนังตัด | NE              | DM           |
| 240 |       |                | <i>Anacanthus barbatus</i> Gray, 1830                 | Barbled leatherjacket       | วัวดาบ                | NE              | DM           |
| 241 |       |                | <i>Chaetodermis penicilligerus</i> (Cuvier, 1816)     | Prickly leatherjacket       | วัวหนามคอก            | NE              | DM           |
| 242 |       |                | <i>Monacanthus chinensis</i> (Osbeck, 1765)           | Fanbelled leatherjacket     | วัวหางพัด             | NE              | DM           |
| 243 |       |                | <i>Paramonacanthus choirocephalus</i> (Bleeker, 1851) | Pig faced leatherjacket     | วัวหน้าหมู            | NE              | DM           |
| 244 |       |                | <i>Pseudomonacanthus macrurus</i> (Bleeker, 1856)     | Smallspeckled leatherjacket | วัวจุด                | NE              | DM           |
| 245 |       | Tetraodontidae | <i>Arothron stellatus</i> (Bloch and Schneider, 1801) | Stellate puffer             | ปักเป้าก้นดำ          | NE              | DM           |
| 246 |       |                | <i>Chelonodon patoca</i> (Hamilton, 1822)             | Milkspeckled puffer         | ปักเป้า               | NE              | DM           |
| 247 |       |                | <i>Lagocephalus lunaris</i> (Bloch & Schneider, 1801) | Green rough backed puffer   | ปักเป้าเขียว          | NE              | DM           |
| 248 |       |                | <i>Lagocephalus spadiceus</i> (Richardson, 1845)      | Half-smooth golden puffer   | ปักเป้าลายน้ำตาล      | NE              | DM           |
| 249 |       |                | <i>Lagocephalus suezensis</i> Clark & Gohar, 1953     | Suez puffer                 | ปักเป้าหลังต่าง       | NE              | DM           |
| 250 |       |                | <i>Torquigener hypselogeneion</i> (Bleeker, 1852)     | Orange-speckled toadfish    | ปักเป้าลาย            | NE              | DM           |
| 251 |       | Diodontidae    | <i>Diodon liturosus</i> Shaw, 1804                    | Blackblotched porcupinefish | ปักเป้าหนามทุเรียน    | NE              | DM           |

# วงศ์ปลาฉลามทราย

## Family Hemiscylliidae

### Bamboo sharks

เป็นปลาฉลามขนาดเล็ก ลำตัวเป็นรูปทรงกระบอก ส่วนหัวค่อนข้างแบนลงเล็กน้อย บางชนิดมีสันเนื้อ (dermal ridge) บนหลัง บางชนิดไม่ปรากฏมีสันเนื้อบนหลัง ส่วนหัวค่อนข้างกลมมน ตาอยู่ทางด้านบนในแนวข้างของส่วนหัว ช่อง spiracle มีขนาดใหญ่ เกือบเท่าตาอยู่ทางด้านหลังหรือต่ำกว่าขอบล่างของตาเพียงเล็กน้อย ช่องเปิดของจมูกสั้น มีร่องเชื่อมระหว่างจมูกกับปาก ปากมีขนาดเล็กตำแหน่งเปิดในแนวขวางของส่วนหัวอยู่ทางด้านหน้าของตา ฟันบนขากรรไกรมีรูปร่างหลากหลาย หนวดที่จมูกสั้น ช่องเปิดเหงือกมีขนาดเล็ก มีจำนวน 5 ช่อง โดยช่องที่ 4 เหลื่อมซ้อนอยู่กับช่องที่ 5 ครีบหลังทั้งสองตอนมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบหลังตอนแรกอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบท้อง จุดเริ่มต้นของครีบหลังตอนที่สองอยู่หน้าจุดกำเนิดของครีบกัน ครีบหูมีขนาดเล็กและกลม ครีบกันกลมมีขนาดเล็กและสั้นแยกออกจากครีบหางด้วยร่องตื้น ๆ ครีบหางยาว ในช่วงระยะวัยรุ่น ปลาในวงศ์นี้มีทั้งที่มีพื้นลำตัวสีเทาดำและมีลายขวางสีเข้มพาดผ่าน แต่เมื่อโตเป็นตัวเต็มวัย ลำตัวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเทา ไม่มีลายขวาง มักมีจุดสีดำขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วลำตัว มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาฉลามทราย ปลาฉลามกบ สามารถจับได้อย่างสม่ำเสมอและพบแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 1 สกุล 2 ชนิด



ฉลามกบ

*Chiloscyllium punctatum* Müller & Henle, 1838

Left : Adult 52.5 cm TL; Right : Juvenile 21.2 cm TL.



ฉลามกบ

*Chiloscyllium hasseltii* Bleeker, 1852 62.4 cm TL.

# วงศ์ปลาฉลามแมว

## Family Scyliorhinidae

### Catsharks

เป็นปลาฉลามขนาดเล็ก มีลำตัวเป็นทรงกระบอกเรียวยาว ส่วนหัวแบนลงเล็กน้อย ตาเป็นรูปไข่ มีหนังปิดตาขนาดเล็ก (nictitating membrane) ที่ด้านหน้าของขอบตาล่าง มี spiracle อยู่ทีบริเวณหลังตาจรูมูกแยกจากกัน หรือเชื่อมต่อกัน ปากเปิดในตำแหน่งด้านล่าง ขอบบนของปากโค้งในขณะที่ยุบลงตัดตรง มีร่องเชื่อมระหว่างจุกกับปาก มีร่อง labial furrow อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง บางชนิดพบร่องนี้เฉพาะที่มุมของขากรรไกรล่าง ในขณะที่บางชนิดร่องนี้ปกคลุมทั้งขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง ฟันมีขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งฟันที่อยู่บริเวณกลางปากมักมีส่วนปลายเป็นหยัก โดยหยักที่อยู่ตรงกลางมักมีขนาดใหญ่ที่สุดและมักมีซี่ขนาดเล็กที่ฐาน 1 ซี่ หรือมากกว่า ส่วนฟันที่อยู่ตอนท้ายของขากรรไกรที่อยู่ค่อนข้างไปทางมุมปากมีปลายแหลม แยกหลายอันคล้ายซี่หวี จุดเริ่มต้นของครีบท่อนแรกอยู่เหนือหรือค่อนข้างด้านหลังของจุดกำเนิดครีบท้อง ครีบท่อนที่สองมีจุดเริ่มต้นอยู่หลังจุดกำเนิดครีบท้อง ครีบท่อนไม่สมมาตรโดยมีแขนหางตอนล่างสั้น ปลาในวงศ์นี้จะมีสีเทาเข้มและมีลวดลายคล้ายลายหินอ่อน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาฉลามแมว ปลาฉลามตุ๊กแก เป็นปลาฉลามที่พบเห็นได้ค่อนข้างยาก โดยพบเพียงครั้งเดียวจากการสำรวจ



ฉลามลายหินอ่อน

*Atelomycterus marmoratus* (Bennett, 1830) 56.7 cm TL.



# วงศ์ปลาฉลามหูดำ

## Family Carcharhinidae

### Requiem sharks

เป็นปลาฉลามที่มีขนาดหลากหลาย พบตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ลำตัวเรียวยาวเป็นรูปกระสวย ส่วนหัวแบนลงเล็กน้อย จะงอยปากค่อนข้างยาว ตากลมด้านล่างมีหนังปิดตา (nictitating membrane) สีขาวขุ่น ไม่มีร่องเชื่อมระหว่างจมูกกับปาก ไม่มีหนวด ปากอยู่ต่ำลักษณะโค้งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ปากกว้างที่มุมปากมี labial furrow ยาว ปากมีฟันคมคล้ายใบมีดโกน ตอนหน้าของซี่ฟันที่อยู่บริเวณขากรรไกรบนมีขนาดเล็กกว่าแถวฟันที่อยู่ด้านข้าง และไม่มีแถวฟันแทรกระหว่างชุดฟันด้านหน้าและส่วนท้ายของขากรรไกรทั้งสองด้าน ฟันสามารถซ่อนอยู่ภายในปากอย่างมิดชิดในเวลาที่หุบปาก ครีบหลังมี 2 ตอน ครีบตอนแรกตั้งอยู่ระหว่างครีบทูกับครีบท้อง โดยมีจุดกำเนิดอยู่หน้าจุดกำเนิดของครีบท้อง ครีบหลังตอนที่สองมีขนาดเล็กกว่าครีบหลังตอนแรก ครีบท้องมี 2 แขน โดยแขนบนยาวกว่าแขนล่างมาก แขนล่างมีขนาดค่อนข้างใหญ่ คอดหางมีร่องขวาง (precaudal pit) ที่ฐานของแขนหางด้านบน ปลาฉลามในวงศ์นี้จะมีฟันลำตัวเป็นสีเทาอมดำและอาจพบแถบสีดำบริเวณครีบแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาฉลามหูดำ เป็นปลาฉลามที่พบเห็นได้ยากจากเรือสำรวจโดยพบเพียงชนิดเดียว



ฉลามหูดำ

*Carcharhinus sorrah* (Müller & Henle, 1839) 74.6 cm TL.

# วงศ์ปลากระเบนขาว ปลากระเบนปากแหลม

## Family Dasyatidae

### Stingrays

จัดเป็นปลาที่มีรูปร่างหลายแบบ ทั้งแบบกลมคล้ายจานรูปไข่หรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลำตัวแบนลงมาก อาจมีหรือไม่มีครีบหลัง ครีบหูแผ่ออกอยู่ทั้งสองข้างของลำตัว โดยด้านหน้าไปบรรจบกันที่บริเวณส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะทำให้เห็นส่วนของจะงอยปากชัดเจน ในขณะที่ส่วนหลังแผ่ไปทางด้านหลังจนจรดกับโคนหางทั้งสองด้าน ตำแหน่งตาอยู่ทางด้านหลัง มีช่อง spiracle ขนาดใหญ่อยู่ชิดทางด้านท้ายของหลังตา ฟันเป็นซี่เล็กเรียงอยู่ติดต่อกันเป็นแถว ๆ เป็นจำนวนมาก ส่วนหางแยกออกจากส่วนลำตัวมีลักษณะแคบเรียวยาวเป็นเส้นคล้ายแส้ มักจะมีหนามแหลมที่มีขอบเป็นหยัก (serrated spine) อยู่ถัดจากโคนหางเข้าไปเล็กน้อย ผิวหนังเรียบหรือหยาบ อาจมีเกล็ดเป็นตุ่มแข็งหรือแถวหนามแหลมบริเวณกลางตัวถึงหาง ปลาในวงศ์นี้จะมีสีน้ำตาลอมแดงและมีลวดลายแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลากระเบนขาว ปลากระเบนปากแหลม ปลากระเบน ปลาตุ๊กกา ปลากระเบนปากแหลมสามารถจับได้อย่างสม่ำเสมอและพบแพร่กระจายทั่วไปบริเวณแนวชายฝั่งของอ่าวไทยตอนใน พบ 6 สกุล 8 ชนิด



กระเบน

*Brevitrygon imbricata* (Bloch & Schneider, 1801)  
30.6 cm SL.



กระเบน

*Brevitrygon heterura* (Bleeker, 1852)  
26.2 cm SL.



กระเบนหางหวาย  
*Hemitrygon akajei* (Müller & Henle, 1841)  
48.4 cm SL.



กระเบนแมลงวันจุดขาว  
*Maculabatis gerrardi* (Gray, 1851)  
34.2 cm SL.



กระเบนจุดฟ้า  
*Neotrygon kuhlii* (Müller & Henle, 1841)  
37.4 cm SL.



กระเบนงูทโด้สีน้ำตาล  
*Neotrygon varidens* (Garman, 1885)  
32.4 cm SL.



กระเบนปากแหลม  
*Telatrygon zugei* (Müller & Henle, 1841)  
22.6 cm SL.



กระเบนทอง  
*Taeniura lymma* (Forsskål, 1775)  
29.3 cm SL.

# วงศ์ปลากระเบนนก

## Family Myliobatidae

### Eagle rays

เป็นปลากระเบนที่มีขนาดหลากหลายตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ลำตัวมีรูปร่างคล้ายกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ส่วนหัวยกสูงขึ้นทำให้เห็นตาที่อยู่ด้านข้างอย่างเด่นชัด ตาและช่อง spiracle มีขนาดใหญ่ จะงอยปากสั้นมีลักษณะเป็นแผ่นโค้ง โดยมีส่วนปลายงอนขึ้นเล็กน้อย ฟันแบบบดละเอียดมีลักษณะเป็นแผ่นแบนเรียงต่อกันเป็นแถว ครีบหูยาวมีปลายโค้งมนและไม่แผ่ไปจนถึงบริเวณสองข้างของหัว ครีบหางเรียวยาวมีลักษณะคล้ายแส้ มีครีบหลังขนาดเล็กอยู่เหนือโคนหางและมีหนามแหลมที่มีขอบเป็นหยัก (serrated spine) ที่โคนครีบหาง ผิวหนังเรียบไม่มีตุ่มหรือหนามแหลม ปลาในวงศ์นี้จะมีพื้นลำตัวสีดำและมีจุดสีขาวขนาดเล็กกระจายทั่วบริเวณส่วนหลัง มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลากระเบนนก ปลากระเบนเนื้อดำ ปลากระเบนยี่สิบ เป็นปลากระเบนที่พบเห็นได้ค่อนข้างยาก โดยพบเพียงครั้งเดียวจากการสำรวจ



กระเบนนกจุดขาว

*Aetobatus ocellatus* (Kuhl, 1823) 52.6 cm SL.

ภาพโดย มนตรี สุนันทา

# วงศ์ปลาไหลมอเรย์

## Family Muraenidae

### Moray eels

มีลำตัวยาวคล้ายงูและค่อนข้างกลม ส่วนท้ายลำตัวจะแบนข้าง แขนงลำตัวส่วนหัวที่อยู่หลังตา ยกตัวสูงขึ้น ช่องเปิดเหงือกมีลักษณะเป็นช่องขนาดเล็ก ไม่มีเส้นข้างลำตัว แต่มีรูรับความรู้สึกอยู่บนหัว ปากกว้าง ขอบของขากรรไกรสิ้นสุดเลยขอบหลังของตามีฟันเป็นแบบฟันเขี้ยวแหลมและแข็งแรงมาก เพดานปากอาจมีฟันเรียงตัวเพียงแถวเดียว สองแถว หรือรวมกันเป็นแถบ รูจมูกคู่หน้ามีลักษณะเป็นท่ออยู่ใกล้ปลายจะงอยปาก รูจมูกคู่หลังเป็นรูปกบติหรือเป็นท่อยกตัวสูงอยู่หน้าตา ครีบหลัง ครีบหาง และครีบกันเชื่อมติดกัน ไม่มีครีบหูและครีบท้อง ปลาในวงศ์นี้จะมีพื้นลำตัวสีเทาแดง สีส้มตาลอมแดง และมีลวดลายที่แตกต่างกันไปตามชนิดของปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาไหลมอเรย์ เป็นปลาไหลที่พบเห็นได้ยาก เนื่องจากมักอาศัยตามซอกหินทำให้ยากต่อการจับด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฒ่ พบเพียงชนิดเดียว



ไหลมอเรย์

*Gymnothorax pseudothyrsoides* (Bleeker, 1853) 72.0 cm TL.



# วงศ์ปลาไหลงู

## Family Ophichthidae

### Snake eels, Worm eels

ลำตัวยาวคล้ายงู รูปร่างคู้หลังเปิดออกเห็นอริมฝีปาก ลิ้นติดแน่นกับปาก กระดูกค้ำจุนกระพุ้งแก้ม (branchiostegal ray) มีจำนวนมากประมาณ 15-49 ก้าน ทำให้โพรงบริเวณช่องเหงือกมีลักษณะป่องพองคล้ายกระเปาะ เรียกว่า “jugostegalia” อยู่ทางด้านล่างของคอหอย ช่องเปิดเหงือกค่อนข้างมาทางด้านท้องของลำตัว ปลายางแหลมไม่มีครีบหาง ครีบหูมีขนาดเล็ก ปลาในวงศ์นี้จะมีพื้นลำตัวสีน้ำตาลอมแดง มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาไหลงู พบเพียงชนิดเดียว



ไหลงู

*Pisodonophis cancrivorus* (Richardson, 1844) 63.8 cm TL.

# วงศ์ปลาหลดจาก

## Family Muraenesocidae

### Pike congers

ลำตัวยาวคล้ายงู ส่วนท้ายของลำตัวแบนข้าง ส่วนหัวค่อนข้างยาว จะงอยปากแหลม ปากกว้างยาวเลยขอบหลังตา มีฟันเขี้ยวบนเพดานปาก รูจมูกคู่หน้ามีลักษณะเป็นท่อเปิดออกที่ส่วนปลายของจะงอยปาก รูจมูกคู่หลังเป็นรูเปิดออกที่ด้านหน้าของตา ช่องเปิดเหงือกกว้างอยู่ต่ำกว่าครีบหู ครีบหูมีขนาดใหญ่ ครีบหลังมีจุดเริ่มต้นตรงกับครีบหู ครีบหลัง ครีบหาง และครีบกันเชื่อมต่อกัน เส้นข้างตัวสมบูรณ์ ปลาในวงศ์นี้จะมีพื้นลำตัวสีน้ำตาลอมแดง มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาหลดจาก เป็นปลาไหลที่พบเห็นได้ยาก เนื่องจากมักอาศัยตามซอกหินทำให้ยากต่อการจับด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่พบเพียงชนิดเดียว



ยอคจาก

*Muraenesox bagio* (Hamilton, 1822) 64.0 cm TL.

# วงศ์ปลาอืด

## Family Pristigasteridae

### Ilishas

เป็นปลาขนาดกลางที่มีลำตัวยาว แบนข้าง ปากอยู่ทางด้านบนหรือทางด้านหน้า กระดูกขากรรไกรบน (maxilla) ยาวไม่ถึงขอบหลังตา มีสันหนามปรากฏที่ตลอดความยาวส่วนท้อง ครีบหลังสันมีจุดเริ่มต้นอยู่หลังจุดกึ่งกลางลำตัว ครีบกันยาวมีจำนวนก้านครีบจำนวน 30-92 ก้าน ครีบหูยาว ครีบท้องมีขนาดเล็ก มีก้านครีบ 6-7 ก้าน ปลาในวงศ์นี้จะมีพื้นลำตัวสีเทา มีแถบสีเหลืองบริเวณโคนครีบ มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาอืด สามารถจับได้อย่างสม่ำเสมอและพบแพร่กระจายทั่วไปบริเวณแนวชายฝั่งของอ่าวไทยตอนใน พบ 1 สกุล 2 ชนิด



อืดยาว

*Ilisha kampeni* (Weber and de Beaufort, 1913) 16.8 cm TL.



อืดตาโต

*Ilisha melastoma* (Bloch & Schneider, 1801) 10.8 cm TL.

# วงศ์ปลาแมว ปลากระตัก ปลาไส้ตัน

## Family Engraulidae

### Anchovies

เป็นปลาขนาดเล็กถึงปานกลาง ลำตัวยาวแบนข้าง จะงอยปากค่อนข้างสั้น ส่วนปลายแหลม ปากเปิดออกด้านล่าง มีกระดูกขากรรไกรบน (maxilla) เจริญดีมาก ยาวเลยขอบหลังของตา เกล็ดมีขนาดปานกลาง ไม่มีเส้นข้างตัว ท้องเป็นสันคมมีหนามที่ท้อง ยกเว้นในสกุล *Stolephorus* หนามแหลมลดรูปลงเหลือเพียงหนามสั้น ๆ เท่านั้น และสันท้องค่อนข้างกลม ครีบทุกครีบใสและมีขนาดเล็ก ปลาในวงศ์นี้จะมีพื้นลำตัวสีน้ำตาลอ่อน มีแถบสีขาวเหลือบเงินพาดผ่านแนวกลางลำตัวและมีสีสันบริเวณครีบแตกต่างกันไปตามชนิดปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลากระตักตัวกลม ปลากระตักตัวแบน ปลาแมว สามารถจับได้สม่ำเสมอและพบแพร่กระจายทั่วไปบริเวณแนวชายฝั่งของอ่าวไทยตอนใน พบ 3 สกุล 5 ชนิด



กะตักตัวกลม

*Encrasicholina heteroloba* (Rüppel, 1837)

9.6 cm TL.



กะตัก

*Stolephorus dubiosus* Wongratana, 1983

8.7 cm TL.



กะตักควาย

*Stolephorus indicus* (van Hasselt, 1823)

13.7 cm TL.



กะตักหัวป้าน

*Stolephorus insularis* Hardenberg, 1933

8.4 cm TL.



แมว

*Thyssa hamiltonii* (Gray, 1835) 15.8 cm TL.

# วงศ์ปลาตาบลาว

## Family *Chirocentridae*

### Wolf-herrings

เป็นปลาขนาดปานกลางถึงใหญ่ ลำตัวค่อนข้างหนาและแบนข้างมากคล้ายแผ่นริบบิ้น ปากใหญ่และกว้างเฉียงขึ้น มีฟันเขี้ยวขนาดใหญ่ (fang-like teeth) มีเกล็ดขนาดเล็ก มีก้างฝอยแทรกระหว่างมัดกล้ามเนื้อ ท้องเป็นสันคมมีหนามที่ลดรูป ครีบหลังขนาดเล็กสั้น อยู่ค่อนข้างไปทางด้านท้ายลำตัว ครีบกันมีตำแหน่งเริ่มต้นตรงกับครีบหลัง และมีฐานครีบยาวกว่า ครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบหางเว้าลึก ปลาในวงศ์นี้ลำตัวด้านบนมีสีน้ำเงินเข้ม เหลือบเงิน บริเวณส่วนท้องมีสีขาวเงิน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาตาบลาว พบแพร่กระจายทั่วไปบริเวณแนวชายฝั่งของอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียวจากเรือสำรวจ



ตาบลาว

*Chirocentrus nudus* Swainson, 1839 35.0 cm TL.



# วงศ์ปลาหลังเขียว

## Family Clupeidae

### Sardines

เป็นปลานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ส่วนใหญ่จะมีลำตัวแบนข้าง บางชนิดเป็นรูปกระสวย จัดเป็นกลุ่มปลาที่มีรูปร่างที่หลากหลาย สันท้องมีหนามปกคลุมตลอดทั้งความยาวของท้อง ปากเปิดในตำแหน่งตรงหรือด้านบนเล็กน้อย เกล็ดบางใสมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ครีบหลังมีขนาดเล็กอยู่ในตำแหน่งกลางตัว ครีบท้องมีจุดกำเนิดใต้ครีบหลัง ครีบกันขนาดเล็ก มีจุดกำเนิดอยู่หลังจุดสิ้นสุดของครีบหลัง ปลาในวงศ์นี้มีสีลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำเงินเข้ม ด้านท้องเป็นสีขาวเหลืองเงิน อาจมีจุดสีหรือแถบสีแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาโคก ปลาเกล็ดขาว และปลาหลังเขียว สามารถจับได้อย่างสม่ำเสมอ และพบแพร่กระจายทั่วไปบริเวณแนวชายฝั่งของอ่าวไทยตอนใน พบ 5 สกุล 6 ชนิด



โคก

*Anodontostoma chacunda* (Hamilton, 1822)  
17.8 cm TL.



กุแกล้วย

*Dussumieria acuta* Valenciennes, 1847  
12.4 cm TL.



เกล็ดเงิน

*Escualosa thoracata* (Valenciennes, 1847)  
7.2 cm TL.



แซ่ล้งสองจุด

*Herklotsichthys dispilonotus* (Bleeker, 1852)  
8.3 cm TL.



หลังเขียวเกล็ดขาว

*Sardinella albella* (Valenciennes, 1847)  
13.5 cm TL.



หลังเขียวแถบทอง

*Sardinella gibbosa* (Bleeker, 1849)  
12.6 cm TL.

# วงศ์ปลาปิ่นแก้ว ปลาอุกทะเล

## Family Plotosidae

### Eel tail catfishes

เป็นปลาที่มีขนาดปานกลางถึงใหญ่ ลำตัวค่อนข้างยาว ส่วนหัวกลมและแบนลง ด้านท้ายของลำตัวเรียวยาวแบนข้าง รูปร่างคู้หน้ามีลักษณะเป็นท่ออยู่ที่ขอบของริมฝีปากบน รูปร่างคู้หลังมีลักษณะเป็นช่องเล็ก ๆ มีหนวดยาว 8 เส้น ครีบหลังมีสองตอน ครีบหลังตอนแรกเป็นหนามแข็งไม่มีหยักทางด้านหลังและมีต่อมพิษอยู่ที่ฐาน ครีบหลังครีบที่สองยาวมากเชื่อมต่อกับครีบหางและครีบกันไม่มีครีบไขมัน ครีบหูมีก้านครีบแข็งที่มีต่อมพิษ ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งท้อง ครีบกันยาว ปลาในวงศ์นี้จะมีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ หรือมีแถบสีดำพาดผ่านตามยาวของลำตัว ขึ้นกับขนาด แหล่งอาศัย และชนิดของปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาอุกทะเล ปลาปิ่นแก้ว สามารถจับได้อย่างสม่ำเสมอและพบแพร่กระจายทั่วไปบริเวณแนวชายฝั่งของอ่าวไทยตอนใน พบ 1 สกุล 2 ชนิด



อุกทะเล

*Plotosus canius* Hamilton, 1822 52.4 cm TL.



ปิ่นแก้ว

*Plotosus lineatus* (Thunberg, 1787) 24.2 cm TL.

# วงศ์ปลาปากคม

## Family Synodontidae

### Lizardfishes

เป็นปลาขนาดปานกลาง มีลำตัวเรียวยาวรูปทรงกระบอกยาว ส่วนหัวกลมรียาว ส่วนหางแบนข้าง จะงอยปากแหลม ปากกว้าง มุมปากลึกเข้ามาในแนวเฉียงจึงมีลักษณะคล้ายกับหัวของกิ้งก่า มีฟันแหลมคมเรียงกันเป็นแถวซ้อนกันไม่เป็นระเบียบตามีแผ่นไขมันปิด (adipose eyelid) มีเกล็ดแบบขอบเรียบ (cycloid) เส้นข้างลำตัวสมบูรณ์ ครีบหลังสองตอน โดยตอนแรกมีก้านครี้อ่อนที่แตกแขนง 10–15 ก้าน ครีบหลังตอนที่สองเป็นครีบไขมัน ครีบท้องมีความยาวของก้านครีบด้านในที่ยาวกว่าก้านครีบด้านนอก ครีบหางเว้าลึกแบบส้อม ปลาในวงศ์นี้มีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาล และมีลวดลายแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาไ้ก้อ ปลาปากคม สามารถจับได้อย่างสม่ำเสมอและพบแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 2 สกุล 5 ชนิด



ปากคม

*Saurida elongata* (Temminck & Schlegel, 1846)  
22.8 cm TL.



ปากคมอิสรางกูร

*Saurida isarakurai* Shindo & Yamada, 1972  
12.4 cm TL.



ปากคมหางจุด

*Saurida undosquamis* (Richardson, 1848)  
17.2 cm TL.



ปากคมลาย

*Synodus variegatus* (Lacepède, 1803)  
18.7 cm TL.



ปากคมหูดำ

*Trachinocephalus myops* (Forster, 1801)  
32.4 cm TL.

## วงศ์ปลากระแจะ

### Family Bregmacerotidae

### Codlets

เป็นปลานขนาดเล็ก มีลำตัวเรียวยาว หัวกลม ตาค่อนข้างโต จงอยปากกลมมน เกล็ดค่อนข้างใหญ่ มีเกล็ดบนเส้นข้างตัว 40–89 เกล็ด อยู่ทางด้านบนของลำตัว ครีบหลังตอนแรกมีลักษณะเป็นเส้นยาวอยู่ด้านบนท้ายทอย ครีบหลังตอนที่สองและ ครีบกันยาว และบริเวณส่วนกลางครีบเว้าลง ครีบท้องอยู่ตำแหน่งคอ มีก้านครีบ 6 ก้าน ก้านครีบด้านนอก 3 ก้าน ยื่นออกเป็นเส้นและเป็นอิสระ ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัว เป็นสีน้ำตาลเทาเหลืองเงิน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลากระแจะ จับได้ค่อนข้างน้อยจาก เรือสำรวจ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณแนวชายฝั่งของอ่าวไทยตอนใน พบเพียง ชนิดเดียว



กระแจะ

*Bregmaceros pseudolanceolatus* Torii, Javonillo & Ozawa, 2004 7.3 cm TL.

# วงศ์ปลากระรอก ปลาข้าวเม่าน้ำลึก

## Family Holocentridae

### Squirrelfishes, Soldierfishes

เป็นปลาขนาดปานกลาง มีลำตัวค่อนข้างยาวและแบนข้าง มีสันกระดูกบนส่วนหัวตาโต ปากกว้างมุมปากเฉียงลงต่ำ ขากรรไกรล่างเป็นแบบยึดหดได้ มีฟันแบบซี่ละเอียดบนขากรรไกรและเพดานปาก เกิดบนลำตัวเป็นแบบขอบหนาม (ctenoid) ค่อนข้างแข็ง เมื่อสัมผัสจะรู้สึกหยาบและสากมือ ครีบหลังยาวติดกันโดยบริเวณรอยต่อระหว่างก้านครีบแข็งและก้านครีบอ่อนจะมีร่องเว้าลึกลง ครีบหลังประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 10-13 ก้าน มีก้านครีบอ่อน 11-17 ก้าน ครีบท้องมีก้านครีบเดี่ยวแข็งแรง 1 ก้าน และมีก้านครีบอ่อน 5-8 ก้าน ครีบกันมีก้านครีบแข็ง 4 ก้าน และมีก้านครีบอ่อน 7-16 ก้าน ครีบหางเว้าลึก ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลอมแดง และมีแถบสีขาวจำนวน 7 แถบ พาดตามความยาวลำตัว มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาข้าวเม่าน้ำลึก ปลากระรอก จับได้ค่อนข้างน้อยจากเรือสำรวจ และจับได้บริเวณตอนกลางของอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียว



ข้าวเม่าน้ำลึก

*Sargocentron rubrum* (Forsskal, 1775) 18.2 cm TL.



# วงศ์ปลาคางคก

## Family Batrachoididae

### Toadfishes

เป็นปลาน้ำจืดปานกลางที่มีลำตัวคล้ายทรงกระบอก ส่วนหัวและลำตัวกลม ส่วนหน้าแบนลงเล็กน้อย ด้านท้ายของลำตัวเป็นทรงกระบอกที่แบนข้าง ปากกว้าง เปิดออกในตำแหน่งตรงและเป็นแบบยืดหดได้ มีติ่งเนื้ออยู่รอบปากมีหนามที่กระดูกแผ่นปิดเหงือก (opercle) 3 อัน ช่องเปิดเหงือกมีขนาดเล็กเปิดออกทางด้านข้างของลำตัว ครีบหลังมีสองตอน ครีบท้องอยู่ตำแหน่งคอ ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลทอง สลับดำ ส่วนท้องสีขาว มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาอุก ปลาอุบ ปลาคางคก เป็นปลาที่จับได้ สมำเสมอและมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณแนวชายฝั่งของอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียว



คางคก

*Batrachomoeus trispinosus* (Günther, 1861) 15.6 cm TL.

# วงศ์ปลาอมไข่

## Family Apogonidae

### Cardinalfishes

เป็นปลาขนาดเล็กที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ลำตัวป้อมและแบนข้าง มีตาขนาดใหญ่ ปากค่อนข้างกว้างและเฉียงลง ขอบกระดูกแผ่นปิดเหงือกแยกเป็นสองขอบโดยขอบนอกอาจเป็นหยักหนามหรือเรียบก็ได้ เกิดอาจเป็นแบบขอบเรียบ (cycloid) หรือขอบเป็นหนาม (ctenoid) ก็ได้ เกิดมักมีขนาดใหญ่หลุดง่าย ครีบหลังสองตอนแยกจากกัน ครีบหางอยู่ในตำแหน่งอก ครีบหางมีรูปร่างหลายแบบ ประกอบด้วย แบบเว้า ตัดตรง หรือกลม ปลาในวงศ์นี้มีสีสันทากหลายแปรผันตามชนิด บางชนิดอาจมีแถบตามขวางหรือตามยาว เป็นพวกหากินเวลากลางคืน (nocturnal) ในปลาเพศผู้จะอมไข่ที่ผสมแล้วไว้ในช่องปาก จนกว่าไข่จะฟักเป็นตัวจึงเรียกว่า ปลาอมไข่ เป็นปลาขนาดเล็กที่จับได้สม่ำเสมอและมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 5 สกุล 10 ชนิด



อมไข่

*Ostorhinchus pleuron* Fraser, 2005  
7.6 cm TL.



อมไข่

*Ostorhinchus endekataenia* (Bleeker, 1852)  
7.5 cm TL.



อมไข่

*Ostorhinchus nigrocineta* (Smith & Radcliffe, 1912)  
6.8 cm TL.



อมไข่

*Jaydia truncata* (Bleeker, 1855)  
8.2 cm TL.



อมไข่  
*Ostorhinchus cavitensis* (Jordan & Seale, 1907)  
7.2 cm TL.



อมไข่  
*Jaydia poeciloptera* (Cuvier, 1828)  
8.5 cm TL.



อมไข่  
*Jaydia striatodes* (Gon, 1997)  
5.8 cm TL.



อมไข่  
*Apogonichthyoides niger* (Döderlein, 1883)  
6.5 cm TL.



อมไข่  
*Archamia bleekeri* (Günther, 1859)  
7.3 cm TL.



อมไข่  
*Cheilodipterus artus* Smith, 1961  
6.8 cm TL.

# วงศ์ปลากระจุย ปลาเงือก ปลาทองเที้ยว ปลาจุมพรวด

## Family Oxudercidae

### Mudskippers

เป็นปลานขนาดเล็กถึงขนาดปานกลางที่มีลำตัวกลมยาวเป็นรูปทรงกระบอกถึงแบนข้างเล็กน้อย ครีบท้องทั้งสองอันเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ส่วนของตาจะยกขึ้นอยู่เหนือระดับผิวของขอบบนส่วนหัวโดยอยู่ในกระบอกตา นอกจากนี้แล้วยังมีหนังตาซึ่งเกิดอยู่ทางขอบล่างของตา (lower eyelid) สามารถยกขึ้นมาปิดคลุมลูกตาได้ ปากค่อนข้างเล็ก พบเกล็ดที่แนวเหนือตาหรือในแนวหลังตา หรืออาจไม่พบเกล็ดในบริเวณทั้งสอง ครีบหลังตอนที่สองค่อนข้างยาว ช่องเปิดเหงือกยาวไม่ถึงทางด้านล่างของส่วนหัว ส่วนใหญ่จะอาศัยในน้ำจืดจนถึงปากแม่น้ำหรือแนวชายฝั่งทะเล ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวค่อนข้างหลากหลายตามชนิดของปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาน้ำ ปลาเงือก เป็นปลานขนาดเล็กที่จับได้สม่ำเสมอและมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 3 สกุล 3 ชนิด



ทองเที้ยว

*Pseudapocryptes elongatus* (Cuvier, 1816)  
19.8 cm TL.



บู่จุด

*Stigmatogobius sadanundio* (Hamilton, 1822)  
5.7 cm TL.



เงือกแดง

*Trypauchen pelaeos* Murdy, 2006 16.2 cm TL.

# วงศ์ปลาบู๋

## Family Gobiidae

### Gobies

เป็นปลาขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง มีรูปร่างหลายแบบทั้งป้อมเป็นทรงกระบอกหรือค่อนข้างยาวแบบ elongate บางชนิดมีรูปร่างแบบแบนข้าง ส่วนหัวกลมและแบนลง มีเกล็ดทั้งแบบที่มีขอบเรียบ (cycloid) และขอบนูนเป็นหนาม (ctenoid) มีครีบหลังสองตอนแยกจากกันโดยครีบหลังตอนที่สองจะยาวกว่าตอนแรก ครีบหลังมีก้านครีบแข็งจะมีจำนวน 4–10 ก้าน และมีลักษณะอ่อนนิบโค้งงอได้ ครีบท้องอาจไม่มีหรือมีครีบท้องแต่ไม่เชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย หรือครีบท้องทั้งสองด้านเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ครีบหางกลมหรือมีปลายแหลม มีแหล่งอาศัยกว้างมากครอบคลุมทั้งน้ำจืดจนถึงทะเล ปลาในวงศ์นี้จะมีสีสันที่หลากหลายตามชนิดของปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาบู๋ เป็นปลาที่จับได้สม่ำเสมอและมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 6 สกุล 7 ชนิด



บู๋

*Arcyogobius baliurus* (Valenciennes, 1837) 9.6 cm TL.



บู๋กึ่ง

*Amblyeleotris* sp. 14.2 cm TL.



บู๋ทะเล

*Acentrogobius caninus* (Valenciennes, 1837) 9.4 cm TL.





บู่จุดเขียว

*Acentrogobius viridipunctatus* (Valenciennes, 1837) 7.6 cm TL.



บู่กึ่งครีบยาว

*Myersina filifer* (Valenciennes, 1837) 14.3 cm TL.



บู่หางจุด

*Parachaeturichthys polynema* (Bleeker, 1853) 7.4 cm TL.



บู่ปะการัง

*Priolepis* sp. 5.2 cm TL.

## วงศ์ปลาแป้นแก้ว

### Family Ambassidae

### Glassfishes, Perchlets

เป็นปลาขนาดเล็กที่พบรวมกันเป็นฝูง ลำตัวป้อมสั้นและแบนข้าง มีเกล็ดแบบขอบนอกเรียบ (cycloid) บริเวณส่วนหัว ในขณะที่ด้านบนของลำตัวเป็นเกล็ดแบบขอบหนาม (ctenoid) เส้นข้างตัวสมบูรณ์เป็นเส้นเดียวหรืออาจแบ่งออกเป็นสองเส้น ครีบหลังมี 2 ตอน ครีบหลังตอนแรกเป็นก้านครีบแข็งที่มีลักษณะเป็นหนามขนาดเล็ก จำนวน 7-8 ก้าน ตอนที่สองประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง (branched rays) 7-14 ก้าน ครีบกันมีก้านครีบแข็ง 3 ก้าน และมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง (branched rays) 7-11 ก้าน ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีขาว เหลืองเงิน ค่อนข้างโปร่งแสง มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาแป้นแก้ว ปลาซีจีน และปลาข้าวเม่า มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน พบ 1 สกุล 2 ชนิด



ข้าวเม่า

*Ambassis gymnocephalus* (Lacepède, 1802) 6.8 cm TL.



ข้าวเม่า

*Ambassis kopsii* Bleeker, 1858 7.2 cm TL.

# วงศ์ปลาสลิิดหิน

## Family Pomacentridae

### Damselfishes

เป็นปลาขนาดเล็กที่พบรวมกันเป็นฝูง มีลำตัวป้อมสั้นจนถึงรูปไข่ แบนข้างมาก ปากมีขนาดเล็กสามารถยืดหดได้ ฟันบนขากรรไกรบนและล่างเป็นแบบกรวย มีรูจมูกเพียงคู่เดียว เกล็ดเป็นแบบขอบหนาม (ctenoid) เส้นข้างตัวแบ่งเป็นสองเส้น มีครีบหลังเป็นแบบตอนเดียว มีก้านครีบแข็ง 10-14 ก้าน ครีบกันมีก้านครีบแข็ง 2 ก้าน ครีบหูมีขนาดใหญ่ ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งอก ครีบหางเว้าลึกแบบส้อม ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวสีเทาเหลืองปน ด้านท้องสีอ่อน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาสลิิดหิน เป็นปลาขนาดเล็กที่อาศัยตามแนวปะการัง พบค่อนข้างน้อยจากเรือสำรวจ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียว



สลิิดหินหางเหลือง

*Neopomacentrus azysron* (Bleeker, 1877) 6.3 cm TL.

# วงศ์ปลาปากกว้าง

## Family Opisthognathidae

### Jawfishes

เป็นปลาขนาดเล็กที่มีลำตัวยาวเรียวและแบนข้างเล็กน้อย ส่วนหัวแบนโค้งเล็กน้อย ไม่มีเกล็ด ปากกว้างยืดหดได้ ขากรรไกรบนยาวเลยหลังตา ลำตัวมีเกล็ดขนาดเล็ก ครีบหลังและครีบก้นยาว ครีบหูแผ่กว้าง ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งอกมีลักษณะเป็นเส้นยาว ครีบหางเป็นแบบปลายแหลม เส้นข้างลำตัวไม่สมบูรณ์ขาดตามยาวลำตัวไปสิ้นสุดที่เลยกึ่งกลางลำตัวเล็กน้อย มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาปากกว้าง เป็นปลาขนาดเล็กที่พบค่อนข้างยาก เพราะมักอาศัยตามแนวปะการัง พบเพียงชนิดเดียว



ปากกว้าง

*Opisthognathus macrolepis* Peters, 1866 7.6 cm TL.

# วงศ์ปลาทุรา

## Family Polynemidae

### Threadfins

เป็นปลาน้ำจืดปานกลางที่มีลำตัวค่อนข้างยาวและแบนข้าง ตาค่อนข้างโตมีแผ่นไขมันปกคลุมอยู่ ปากเปิดออกทางด้านล่าง จะงอยปากค่อนข้างสั้นเป็นรูปกรวยและยื่นออกไป เกิดมีขนาดเล็ก เส้นข้างตัวสมบูรณ์ยาวถึงโคนครีบหาง ครีบหลังตอนแรกเป็นก้านครีบที่ไม่แข็งมาก 7-8 ก้าน ครีบกันมีก้านครีบแข็ง จำนวน 2-3 ก้าน ครีบหูแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนเป็นก้านครีบปกติ และส่วนล่างเป็นก้านครีบที่แยกออกเป็นอิสระ จำนวน 4-7 ก้าน ครีบท้องมีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 5 ก้าน ครีบหางเว้าลึกแบบส้อม ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวสีเทาอมเขียวเข้มเหลือบเงิน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาทุรา เป็นปลาเศรษฐกิจที่จับได้สม่ำเสมอและมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียว



ทุราหนวดสี่เส้น

*Eleutheronema tetradactylum* (Shaw, 1804) 27.6 cm TL.



# วงศ์ปลากระบอก

## Family Mugilidae

### Mulletts

เป็นปลาที่มีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ มีลำตัวยาวเป็นทรงกระบอก ส่วนหัวแบนลง จมอยปากสั้นทู่ ปากเล็กเปิดในตำแหน่งตรงหรือค่อนข้างมาทางด้านล่าง ไม่มีฟัน หรือในตัวอย่างบางตัวที่มีฟันก็จะมีขนาดเล็ก ไม่มีเส้นข้างตัว เกล็ดมีขนาดใหญ่เป็นแบบขอบหนาม (ctenoid) จะพบเกล็ดเสริม (axillary scale) ที่ใต้ครีบหลัง ครีบหูและครีบท้อง ครีบหลังแยกออกเป็นสองตอน ตอนแรกประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 4 ก้าน ตอนที่สองประกอบด้วยก้านครีบอก่อนที่แตกแขนง 8-10 ก้าน ครีบกันมีก้านครีบแข็ง 3 ก้าน และก้านครีบอก่อนที่แตกแขนง 8-9 ก้าน ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวสีเทาเหลือบเงินด้านท้องสีขาว มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลากระบอก ปลากระเมาะ เป็นปลาเศรษฐกิจที่จับได้น้อยจากเรือสำรวจ และมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน พบ 3 สกุล 3 ชนิด



กระบอกหางเขียว  
*Crenimugil buechanani* (Bleeker, 1853)  
16.5 cm TL.



กระบอกหางกลม  
*Osteomugil cunnesius* (Valenciennes, 1836)  
14.2 cm TL.



กระบอกดำ  
*Planiliza subviridis* (Valenciennes, 1836)  
16.3 cm TL.

# วงศ์ปลากระป๋อง ปลาตีนแถบ

## Family Blenniidae

### Blennids, Blennies

เป็นปลาขนาดเล็กถึงปานกลาง มีลำตัวเรียวยาวแบนข้างไม่มีเกล็ด ส่วนหัวกลมมน ปากเล็ก มีฟันเขี้ยวลักษณะโค้งคล้ายหิวบินขากรรไกรทั้งสอง มักมีติ่งเนื้อที่ยื่นจากผิวหนังออกมาเหนือบริเวณขอบตา ช่องเปิดรูจมูก หน้าผาก หรือบริเวณแก้มโดยตำแหน่งของติ่งเนื้อจะขึ้นกับชนิด ครีบหลัง ครีบหาง และครีบกันแยกออกจากกัน ครีบหลังเป็นแบบตอนเดียวยาวต่อเนื่องกัน มีจุดเริ่มต้นอยู่หน้าตา ครีบท้องอยู่หลังบริเวณรอยต่อระหว่างขากรรไกรล่างทั้งสอง โดยมีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน ส่วนก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 2-4 ก้าน ปลาในวงศ์นี้จะมีสีสันทันและลวดลายบนลำตัวที่หลากหลายตามชนิด มีชื่อทั่วไปว่า ปลากระป๋อง ปลาตีนแถบ เป็นปลาที่พบได้ค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นปลาที่อาศัยในรูระหว่างโขดหิน มีการแพร่กระจายบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน พบ 3 สกุล 3 ชนิด



ตึกแตกหินปากยื่น

*Omobranchus punctatus* (Valenciennes, 1836)  
8.3 cm TL.



กระป๋อง

*Xiphasia setifer* Swainson, 1839  
42.8 cm TL.



ตึกแตกหินเขี้ยว

*Meiacanthus* cf. *luteus* (Smith-Vaniz, 1987)  
11.6 cm TL.

# วงศ์ปลาข้างเงิน

## Family Atherinidae

### Silversides

เป็นปลาฝูงที่มีขนาดเล็ก มีลำตัวค่อนข้างยาวเรียวเกือบเป็นแบบทรงกระบอก ความลึกของลำตัวน้อยกว่าความยาวหัวและเป็น 4.6 ของความยาวมาตรฐาน หัวแบนลง ระยะห่างของตาค่อนข้างกว้าง ปากกว้าง ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างยาวเท่ากัน ขากรรไกรบนยาวถึงขอบด้านหน้าของตาลำ เกิดมีขนาดใหญ่ ไม่มีเส้นข้างตัวด้านข้าง แถบสีเงิน ครีบท้องมี 2 ตอน ตอนแรกเป็นก้านครีบแข็งที่ไม่แข็งมากและมีฐานชิดกัน ตอนที่สองมีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และตามด้วยก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งสูงกว่ากึ่งกลางตัว ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งท้อง ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีขาวเหลืองเงิน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาข้างเงิน ปลาหัวตะกั่ว ปลาเหล็กโคน ปลาหัวแข็ง เป็นปลาขนาดเล็กพบได้สมำเสมอ มีการแพร่กระจายบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียวจากเรือสำรวจ



หัวตะกั่ว

*Atherinomorus duodecimalis* (Valenciennes, 1835) 6.1 cm TL.

# วงศ์ปลาช่อนทะเล ปลาโหด

## Family Rachycentridae

### Black king fishes, Cobia

เป็นปลานขนาดใหญ่ที่มีลำตัวยาวมาก ค่อนข้างกลม ตอนหน้าเป็นทรงกระบอก ส่วนหัวกว้างแบนลง ปากแบบเปิดออกทางด้านหน้า (terminal) ตาขนาดเล็ก เกล็ดขนาดเล็ก มีขอบกลมหรือแหลมตอนปลาย ครีบหลังตอนแรกมีก้านแข็งที่สั้นและแยกจากกัน จำนวน 6-9 ก้าน ครีบกันยาว มีก้านครีบแข็ง 2-3 ก้าน และมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 22-28 ก้าน ครีบหางเว้าตื้น (emarginated) ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีเทาดำ ในปลาระยะวัยรุ่นจะมีแถบสีดำพาดไปตามความยาวของลำตัวไปสิ้นสุดที่โคนหาง โดยแถบสีดำนี้อาจจางลงเมื่อปลาโตขึ้น มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาช่อนทะเล เป็นปลาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่พบไม่บ่อยนักจากเรือสำรวจ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียวจากเรือสำรวจ



ช่อนทะเล

*Rachycentron canadum* (Linnaeus, 1766) 43.6 cm TL.

# วงศ์ปลาเหาฉลาม

## Family Echeneidae

### Sharksuckers

เป็นปลานขนาดเล็กถึงปานกลาง มีลำตัวป้อมจนถึงยาว ส่วนหัวแบนลง ขากรรไกรล่าง ยื่นยาวกว่าขากรรไกรบนเล็กน้อย เกือบมีขนาดเล็กขอบเรียบ (cycloid) ครีบหลังและ ครีบกันไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหลังตอนแรกเปลี่ยนไปเป็นอวัยวะช่วยยึดเกาะ (sucking disk) มีร่องตามขวางจำนวน 10–28 ร่อง ลักษณะเป็นแผ่นสำหรับเกาะติดกับปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาฉลาม ปลากะเบนราหู ปลาช่อนทะเล เต่าทะเล หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเล โดยจะเกาะติดไปทางด้านท้องเพื่อหากินอาหารและการเคลื่อนที่ ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีดำ มีชื่อเรียกทั่วไปว่า เหาฉลาม อ้ายเหา เป็นปลานขนาดเล็กพบไม่บ่อยนักจากเรือสำรวจ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทย ตอนใน พบเพียงชนิดเดียวจากเรือสำรวจ



เหาฉลาม

*Echeneis naucrates* Linnaeus, 1758 36.2 cm TL.



# วงศ์ปลาสิกุล ปลาหางแฉีก

## Family Carangidae

### Scads, Jacks, Trevallies, Pompanos

ปลาในวงศ์นี้มีรูปร่างที่หลากหลาย ประกอบด้วย ชนิดที่มีรูปร่างสั้น รูปไข่ ทรงยาว รูปกระสวย จนถึงแบนข้างมาก คอดหางเรียวมักมีเกล็ดที่เปลี่ยนรูปเป็นแผ่นหนามปกคลุม หรืออย่างน้อยยกเป็นสันเนื้อ ตามีขนาดปานกลางและมักมีเยื่อไขมันปกคลุม มีเกล็ดขนาดเล็กแบบขอบเรียบ (cycloid) เกล็ดบนเส้นข้างตัวสมบูรณ์ ส่วนหน้าโค้งงอ ส่วนท้ายเป็นแผ่นใหญ่ หนา และเป็นหนามแหลม (scute) แต่อาจลดรูปหรือไม่พบในบางสกุล ที่กรองเหงือกยาวเรียว ครีบหลังเป็นแบบสองตอนแยกจากกัน ครีบหลังตอนแรก มีก้านครีบแข็งยาวไม่แข็งแรงหรือมีก้านครีบแข็งสั้น หน้าครีบกันมีก้านครีบแข็ง 2 ก้าน แยกออกมาเป็นอิสระทางด้านหน้าเรียกว่า two detached anal spines ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งอก ครีบหูยาวเรียวโค้งแบบรูปเคียว (falcate) หรือขนาดสั้นปลายแหลม ในบางชนิด ครีบหางเว้าลึกแบบส้อม ปลาในวงศ์นี้ส่วนใหญ่จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีขาว เหลืองเงิน แต่บางชนิดมีสีดำ มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาสิกุล ปลาหางแฉีก ปลามง เป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญและพบสม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทย ตอนใน พบ 16 สกุล 25 ชนิด



โอมงาม

*Alectis ciliaris* (Bloch, 1787) 9.8 cm TL.



โอมงาม

*Alectis indica* (Rüppell, 1830) 4.2 cm TL.



โอมงาม

*Alectis indica* (Rüppell, 1830) 7.5 cm TL.



โอมงาม

*Alectis indica* (Rüppell, 1830) 32.6 cm TL.



โสมงาน  
*Alectis indica* (Rüppell, 1830) 58.7 cm TL.



สีกุนแถมดำ  
*Alepes djedaba* (Forsskål, 1775) 16.2 cm TL.



สีนทอง  
*Alepes melanoptera* Swainson, 1839 24.2 cm TL.



สีนเขียว  
*Alepes kleinii* (Bloch, 1793) 11.4 cm TL.



สีกุนรากชาย  
*Alepes vari* (Cuvier, 1833)  
38.6 cm TL.



ตะโกรงขาว  
*Atropus atropus* (Bloch and Schneider, 1801)  
18.4 cm TL.



สีกุนบัง  
*Atule mate* (Cuvier, 1833) 20.7 cm TL.



จ๋วยจีน  
*Carangoides armatus* (Rüppell, 1830) 34.8 cm TL.



สีกุนแป้นจุดเหลือง

*Carangoides coeruleopinnatus* (Rüppell, 1830)  
36.5 cm TL.



สีกุนครีบยาว

*Carangoides hedlandensis* (Whitley, 1934)  
26.4 cm TL.



จ๋วยจิน

*Carangoides malabaricus* (Bloch and Schneider, 1801)  
32.1 cm TL.



สีกุนครีบทำ

*Carangoides praeustus* (Bennett, 1830)  
16.4 cm TL.



หางก๊วหม้อ

*Caranx sexfasciatus* Quoy and Gaimard, 1825  
40.6 cm TL.



ทูแวก

*Decapterus russelli* (Rüppell, 1830)  
8.3 cm TL.



ตะกອງเหลือง

*Gnathanodon speciosus* (Forsskål, 1775) 37.5 cm TL.



หางเงิง

*Megalaspis cordyla* (Linnaeus, 1758) 36.2 cm TL.



จะละเม็ดดำ  
*Parastromateus niger* (Bloch, 1795)  
23.6 cm TL.



สละ  
*Scomberoides commersonnianus* Lacepède, 1801  
50.4 cm TL.



สีกุนตาแว  
*Selar boops* (Cuvier, 1833) 16.5 cm TL.



สีกุนตาพอง  
*Selar crumenophthalmus* (Bloch, 1793) 15.7 cm TL.



ข้างเหลือง  
*Selaroides leptolepis* (Cuvier, 1833) 10.7 cm TL.



สำลี  
*Seriolina nigrofasciata* (Rüppell, 1829) 29.6 cm TL.



จู้ยจิบ  
*Ulua mentalis* (Cuvier, 1833) 35.2 cm TL.



จู้ยจิบบั้ง  
*Uraspis uraspis* (Günther, 1860) 40.1 cm TL.




# วงศ์ปลาใบโพธิ์ ปลาพระจันทร์

## Family Menidae

### Moonfishes

เป็นปลานขนาดปานกลาง ลำตัวเป็นรูปไข่และแบนข้างมาก ส่วนท้องเป็นสันคม ปากยื่นขึ้นเล็กน้อยและเป็นแบบยึดหัดได้ มีเกล็ดขนาดเล็กและบางใส มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีครีบหลังตอนเดียวไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหูยาวเท่ากับความยาวของหัว ครีบหางเว้าลึก แพนหางทั้งสองยาวเท่ากัน ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวด้านบนเป็นสีเทาดำ ด้านท้องสีขาวและมีจุดสีดำขนาดใกล้เคียงกับลูกตากระจายบริเวณครึ่งบนของลำตัว มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาพระจันทร์ เป็นปลาที่พบไม่บ่อยนักจากเรือสำรวจ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียวจากเรือสำรวจ



พระจันทร์

*Mene maculata* (Bloch and Schneider, 1801) 17.6 cm TL.



# วงศ์ปลาน้ำดอกไม้ ปลาสาก

## Family Sphyraenidae

### Barracudas

เป็นปลาขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ มักอยู่รวมกันเป็นฝูง มีลำตัวยาวมาก และเป็นรูปทรงกระบอก หัวมีขนาดใหญ่ ตามีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านข้างของส่วนหัว จะออยปากแหลม ปากกว้าง โดยขากรรไกรบนจะยาวเลยขอบหน้าของตา ฟันเป็นซี่ยาวที่แบนข้างขนาดใหญ่ทั้งขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง เกล็ดขนาดเล็กแบบขอบเรียบ (cycloid) ครีบหลังสองตอนแยกห่างจากกันมาก ครีบหลังตอนแรกมีก้านครีบแข็ง 5 ก้าน ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งท้องและมีจุดกำเนิดตรงข้ามกับครีบหลังตอนแรก ครีบหางเว้าลึกแบบส้อม ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีขาวเทาเหลือบเงิน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาสาก ปลาน้ำดอกไม้ เป็นปลาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่พบค่อนข้างน้อยจากเรือสำรวจ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 1 สกุล 2 ชนิด



สากดำ

*Sphyraena jello* Cuvier, 1829 37.4 cm TL.



น้ำดอกไม้

*Sphyraena obtusata* Cuvier, 1829 28.7 cm TL.

# วงศ์ปลาชีกเดียว

## Family Citharidae

### Largescale flounders

เป็นปลานขนาดเล็กมีลำตัวแบนสมมาตร ลำตัวรูปไข่และแบนข้างมาก มีตาทั้งสองเคลื่อนมาอยู่ด้านขวาของหัว ปากกว้างและโค้ง เกือบมีขนาดใหญ่ มีเส้นข้างตัวทั้งด้านมีตาและด้านไม่มีตา ครีบหลังอยู่ทางด้านไม่มีตาโดยมีจุดกำเนิดอยู่บริเวณด้านหน้าขอบตา ครีบหลัง ครีบหาง และครีบกันไม่เชื่อมต่อกัน ครีบหลังและครีบกันไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบท้องสั้นอยู่ในตำแหน่งอกและมีก้านครีบแข็ง 1 อัน พบครีบหูทั้งด้านมีตาและด้านไม่มีตา ในปลาเพศผู้จะมีก้านครีบหลังก้านที่ 2-6 ยื่นเป็นเส้น ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลปนดำ มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาชีกเดียว เป็นปลานขนาดเล็ก พบได้สม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียวจากเรือสำรวจ



ชีกเดียวครีบจุด

*Brachypleura novaezeelandiae* Günther, 1862 Male 8.7 cm TL.; Female 7.2 cm TL.

# วงศ์ปลาลิ้นควาย

## Family Paralichthyidae

### Lefteyes flounders

เป็นปลาน้ำตื้นปานกลาง มีลำตัวรูปไข่ ตาทั้งสองอยู่ด้านซ้ายของลำตัว มีกระดูกด้านละ 2 รู ด้านท้ายของกระดูกคู่แรกมีลักษณะเป็นแผ่นหนังยื่นยาว มีสันกระดูกระหว่างตา พบเส้นข้างตัวทั้งสองด้านของลำตัว ครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้นไม่เชื่อมต่อกัน ครีบหางเป็นแบบ double truncate ครีบทุกครีบไม่มีก้านครีบแข็ง ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลอ่อน มีจุดสีแตกต่างกันไปตามชนิดปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาลิ้นควาย พบได้สั่มำเสมอและมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียวจากเรือสำรวจ



ลิ้นควาย


*Pseudorhombus javanicus* (Bleeker, 1853) 18.4 cm TL.

# วงศ์ปลาลิ้นควาย

## Family Bothidae

### Lefteyes flounders

เป็นปลาขนาดเล็กถึงปานกลางที่มีรูปร่างหลากหลาย คือ พบตั้งแต่ชนิดที่มีลำตัวรูปไข่จนถึงลำตัวยาว ทุกชนิดมีลำตัวแบนข้างมาก ตาเคลื่อนมาอยู่ด้านซ้ายของลำตัว บางชนิดพบตึงเนื้ออยู่เหนือตา ปากมีขนาดปานกลาง มีฟันซี่ยาวบนขากรรไกรทั้งสอง เส้นข้างตัวบริเวณเหนือครีบหูโค้งขึ้นด้านบนแล้ววกกลับลงมาในแนวกึ่งกลางลำตัว ผ่านฐานของครีบหู จุดเริ่มต้นครีบหลังอยู่เหนือตาหรือก่อนถึงขอบด้านหน้าของตา ครีบหลัง ครีบหาง และครีบกันไม่เชื่อมต่อกัน ไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหูที่อยู่ด้านไม่มีตาจะสั้นกว่าด้านที่มีตา จุดเริ่มต้นของครีบท้องด้านมีตาอยู่ด้านหน้าจุดเริ่มต้นของครีบท้องด้านไม่มีตา ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาล มีจุดสีแตกต่างกันไปตามชนิดปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาลิ้นควาย เป็นปลาที่พบได้สม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 3 สกุล 3 ชนิด



ลิ้นควาย

*Arnoglossus aspidos* (Bleeker, 1851) 6.4 cm TL.



ใบหูบู่

*Engyproson grandisquama*  
(Temminck and Schlegel, 1846) 9.2 cm TL.



ลิ้นหมาทองส้ม

*Grammatobothus polyophthalmus* (Bleeker, 1866) 16.8 cm TL.

# วงศ์ปลาลิ้นหมาหงอนยาว

## Family Samaridae

### Crested flounders

เป็นปลานขนาดกลางที่มีลำตัวป้อมแบนข้างมาก ตาทั้งสองเคลื่อนมาอยู่ด้านขวาของหัว ปากเล็กและมีฟันขนาดเล็กบนขากรรไกรทั้งสองด้าน เส้นข้างลำตัวสมบูรณ์ อยู่ในแนวกึ่งกลางลำตัวยกเว้นในส่วนหน้าที่โค้งขึ้นเล็กน้อยตามแนวของครีบทู รูปร่างอยู่ด้านที่ไม่มีตา ครีบท้อง ครีบทง และครีบกันไม่เชื่อมต่อกัน ไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบทงด้านที่มีตายาวกว่าความยาวหัวในขณะที่ด้านไม่มีตาลดรูปลงหรือไม่มี จุดเริ่มต้นของครีบท้องอยู่ถึงก่อนขอบหน้าของตา ก้านครีบท้องช่วงแรกยื่นยาวเป็นเส้น ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลเข้ม มีจุดสีแตกต่างกันไปตามชนิดปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาลิ้นหมาหงอนยาว อันเป็นลักษณะเด่นของเพศผู้ ซึ่งส่วนหน้าของครีบท้องจะมีก้านครีบ 4-5 ก้าน ยื่นยาวออกไป เป็นปลาที่พบได้สม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียวจากเรือสำรวจ



ลิ้นหมาหงอนยาว

*Samaris cristatus* Gray, 1831 Male 14.8 cm TL.; Female 11.5 cm TL.



# วงศ์ปลาลิ้นควาย

## Family Soleidae

### Soles

เป็นปลาที่มีขนาดลำตัวปานกลาง ปลาในวงศ์นี้มีรูปร่างหลากหลาย มีทั้งแบบรูปไข่ แบบป้อม และแบบเรียวยาว ทุกชนิดมีลำตัวแบนข้างมาก ตาทั้งสองเคลื่อนมาอยู่ด้านขวาของหัว ปากเล็กและไม่สมมาตร ขอบของแผ่นกระดูกปิดเหงือกมีผิวหนังคลุม เส้นข้างลำตัวมีเส้นเดียวพาดผ่านกลางตัว ครีบหลัง ครีบหาง และครีบกันมีทั้งแบบเชื่อมติดกันและแยกจากกัน ครีบทุกครีบไม่มีก้านครีบแข็ง จุดเริ่มต้นครีบหลังอยู่หน้าตา ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม และมีจุดสีแตกต่างกันไปตามชนิดปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาลิ้นควาย เป็นปลาที่พบได้สม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณแนวชายฝั่งของอ่าวไทยตอนใน พบ 5 สกุล 3 ชนิด



ลิ้นควาย

*Aseraggodes cf. dubius* (Weber, 1913)  
11.7 cm TL.



ลิ้นควายจุด

*Pardachirus pavoninus* (Lacepède, 1802)  
18.1 cm TL.



ซีกเดียว

*Solea ovata* Richardson, 1846  
7.2 cm TL.



ลิ้นควาย

*Synaptura commersonnii* (Lacepède, 1802)  
28.4 cm TL.



ลิ้นหมาลาย

*Zebrias quagga* (Kaup, 1858) 24.3 cm TL.

# วงศ์ปลาลิ้นหมา

## Family Cynoglossidae

### Tongue fishes

เป็นปลาที่มีขนาดปานกลาง ลำตัวค่อนข้างยาว แบนข้างมาก มีรูปร่างคล้ายลิ้น ตาทั้งสองอยู่ด้านซ้ายของหัว เกล็ดที่ปกคลุมลำตัวมีขอบแบบหนาม (ctenoid) ที่อาจพบได้จากทั้งด้านมีตาหรือไม่มีตา แต่ในบางชนิดเกล็ดด้านไม่มีตาจะเป็นขอบเรียบ (cycloid) เส้นข้างตัวอาจมีสองหรือสามเส้นบนด้านที่มีตา ส่วนด้านไม่มีตาอาจมีหนึ่งหรือสองเส้น หรือไม่มี จะอวบปากด้านบนมีรูปร่างโค้งงอและมีปลายแหลมคล้ายตาเบ็ด (rostral hook) ครีบหลัง ครีบหาง และครีบกันเชื่อมต่อกัน ครีบทุกครีบไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหลังมีจุดเริ่มต้นหน้าตา ไม่มีครีบหู ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งคอและมีขนาดเล็กมาก ปลาวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มอมดำ มีจุดสีแตกต่างกันไปตามชนิดปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาลิ้นหมาหรือปลายอดม่วง เป็นปลาที่พบได้สม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณแนวชายฝั่งของอ่าวไทยตอนใน พบ 1 สกุล 5 ชนิด



ลิ้นหมา

*Cynoglossus arel* (Bloch & Schneider, 1801)  
28.3 cm TL.



ลิ้นหมา

*Cynoglossus bilineatus* (Lacepède, 1802)  
27.6 cm TL.



ลิ้นหมา

*Cynoglossus cynoglossus* (Hamilton, 1822)  
15.2 cm TL.



ลิ้นหมา

*Cynoglossus kopsii* (Bleeker, 1851)  
11.7 cm TL.



ยอดม่วงลาย

*Cynoglossus puncticep* (Richardson, 1846) 13.6 cm TL.

# วงศ์ปลาผีเสื้อกลางคืน

## Family Pegasidae

### Seamoths

เป็นปลาขนาดเล็กที่มีรูปร่างแบบผสม มีลำตัวหนาแผ่ออกด้านข้างและแบนลง ลำตัวมีแผ่นกระดูกแข็งหุ้มอย่างมิดชิด จะงอยปากแบนเป็นรูปช้อน ปากเปิดออกด้านล่าง และสามารถยืดหดได้เล็กน้อย ครีบหลังและครีบกันสั้น มีก้านครีบทุกก้านไม่แตกแขนง ครีบหูมีขนาดใหญ่ มีก้านครีบที่ไม่แตกแขนง 9-19 ก้าน ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งท้องยื่นออกเป็นเส้น ประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และก้านครีบอ่อน 2-3 ก้าน ครีบหางมีก้านครีบที่ไม่แตกแขนง 8 ก้าน ภาควัดขวางของคอดหางเป็นรูปสี่เหลี่ยม ปลาในวงศ์นี้มีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาล มีแถบสีดำพาดแนวขวางลำตัว มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาผีเสื้อกลางคืน เป็นปลาที่พบค่อนข้างยาก มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 1 สกุล 2 ชนิด



ผีเสื้อกลางคืนสั้น

*Pegasus laternarius* Cuvier, 1816 6.7 cm TL.



ผีเสื้อกลางคืนหางยาว

*Pegasus volitans* Linnaeus, 1758 8.3 cm TL.

# วงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้ และปลาม้าน้ำ

## Family Syngnathidae

### Pipefishes และ Seahorses

เป็นปลานขนาดเล็ก ลำตัวเรียวยาวมาก มีแผ่นกระดูกแข็งห่อหุ้มทางด้านนอก เรียกว่า semirigid case ปากเล็กอยู่ปลายของจะงอยปากที่ยื่นยาวออกไปคล้ายกับท่อ ไม่มีฟันที่ขากรรไกร ช่องเปิดเหงือกลดรูปลงเป็นเพียงรูเปิดขนาดเล็ก ครีบหลัง ครีบท้อง และครีบกันไม่มีก้านครีบแข็ง มีครีบหลังตอนเดียว ครีบกันมีขนาดเล็ก ปกติมีก้านครีบอ่อน ที่ไม่แตกแขนงจำนวน 2-6 ก้าน ครีบหูมีก้านครีบอ่อนที่ไม่แตกแขนง 10-23 ก้าน ไม่มีครีบท้อง บางชนิดไม่มีครีบหาง หรือบางชนิดหางสามารถม้วนงอไปทางด้านหน้าได้ ในกลุ่มย่อยปลาจิ้มฟันจระเข้จะมีรูปร่างเรียวยาว ส่วนหัวและลำตัวจะอยู่แนวเดียวกัน ส่วนกลุ่มย่อยปลาม้าน้ำส่วนหัวจะโค้งลงล่างออกจากแนวกลางตัว ปลาในวงศ์นี้จะมีสีสันแปรผันตามชนิด บางชนิดมีสีสันสวยงาม เพศผู้เป็นผู้ดูแลไข่ มีถุงเก็บไข่ที่มีลักษณะคล้ายกระเป๋าท้องอยู่ด้านหน้าของรูกันหรือหลังรูกัน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า จิ้มฟันจระเข้ ม้าน้ำ เป็นปลาที่พบค่อนข้างยาก มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน กลุ่มปลาจิ้มฟันจระเข้พบ 3 สกุล 3 ชนิด กลุ่มปลาม้าน้ำพบ 1 สกุล 2 ชนิด



จิ้มฟันจระเข้

*Halicampus grayi* Kaup, 1856 13.3 cm TL.



จับพินจระเื

*Hippichthys (Parasyngnathus) penicillus* (Cantor, 1849) 11.4 cm TL.



จับพินจระเื

*Trachyrhamphus longirostris* Kaup, 1856 32.4 cm TL.



ม้าน้ำหนาม

*Hippocampus spinosissimus* Weber, 1913  
15.6 cm TL.



ม้าน้ำสามจุด

*Hippocampus trimaculatus* Leach, 1814  
12.4 cm TL.



# วงศ์ปลาปากแตร

## Family Fistulariidae

### Cornetfishes

เป็นปลาขนาดปานกลาง มีรูปร่างแบบผสม ลำตัวยาวมากและแบนข้าง ไม่มีเกล็ด แต่มีเกราะที่ลดรูปเป็นหนามแหลมขนาดเล็กบริเวณตอนหน้าของลำตัว จะงอยปากยื่นยาว มีลักษณะคล้ายกับท่อ เส้นข้างตัวพัฒนาดีมาก ส่วนหน้าโค้งและยาวไปถึงเส้นกึ่งกลาง ขอบครีบหาง คอดหางแบนลงและส่วนที่เป็นเส้นข้างลำตัวจะยกขึ้นเป็นสันเนื้อ ครีบหลัง และครีบกันอยู่ด้านท้ายของลำตัวมีจุดเริ่มต้นตรงข้ามกัน ไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบท้อง มีขนาดเล็กอยู่ส่วนกลางลำตัว ครีบหางเป็นแบบส้อมและเป็นเส้นยาวในตำแหน่งตรงกลางของครีบ ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลแดง มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาปากแตร เป็นปลาที่พบค่อนข้างยาก มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนในพบเพียงชนิดเดียว



ปากแตร

*Fistularia petimba* Lacepède, 1803 32.0 cm TL.

# วงศ์ปลาข้างไส

## Family Centriscidae

### Razorfishes

เป็นปลานขนาดเล็กที่มีลำตัวค่อนข้างยาวและแบนข้างมาก มีลักษณะคล้ายใบมีดโกน ส่วนหัวยาว จะงอยปากยื่นยาวเป็นท่อที่มีปากอยู่ตอนปลาย ปากมีขนาดเล็ก สันท้องคม ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดที่เปลี่ยนรูปไปมีลักษณะเป็นแผ่นใส เรียกว่า cuirass ไม่มีเส้นข้างตัว ครีบหลังสองตอนอยู่ด้านหลังลำตัว ตอนแรกประกอบด้วยก้านครีบที่แข็งแรง 1 ก้าน และมีก้านครีบขนาดเล็กอีก 2 ก้าน ครีบหลังตอนที่สองอยู่ชิดกับครีบหลังตอนแรก และใกล้กับตำแหน่งของครีบหางและครีบกัน ครีบท้องอยู่กึ่งกลางลำตัวมีลักษณะเป็นเส้นขนาดเล็ก ครีบกันมีขนาดเล็กและอยู่ในแนวตั้งฉากกับลำตัว ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลแดง มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาข้างไส ปลาใบมีดโกน เป็นปลาที่พบค่อนข้างยากจากเรือสำรวจ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียว



ข้างไส

*Aeoliscus strigatus* (Günther, 1861) 10.7 cm TL.

# วงศ์ปลานกฮูก

## Family Dactylopteridae

### Flying gurnards

เป็นปลาขนาดปานกลาง ลำตัวยาวเรียว ส่วนหัวหนาและมีส่วนหางแบนข้าง ส่วนหัวปกคลุมด้วยกระดูกแข็ง ขอบของกระดูก preopercle เป็นหนามยาวกว่าความยาวหัว ในขณะที่ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดที่แข็งและมีลักษณะคล้ายหนาม โดยทางส่วนล่างของลำตัวจะยกขึ้นเป็นสัน มีปากแบบอยู่ทางด้านล่างยึดหดได้เล็กน้อย มีก้านครีบที่แยกจากครีบหลังตอนแรก 1 ก้าน อยู่ในตำแหน่งท้ายทอย ครีบท้องสั้นมีก้านครีบอ่อน 5-6 ก้าน ครีบหลังมีก้านครีบแข็ง 7 หรือ 8 ก้าน โดยก้านครีบแข็งสองก้านแรกแยกออกมาจากส่วนที่เหลือของครีบ ครีบหูเจริญดียาวถึงครีบหาง ยกเว้นก้านครีบหู 5 ก้านแรก ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลอมแดงและด้านล่างเป็นสีขาวหรือขาวอมชมพู มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลานกฮูก เป็นปลาที่พบค่อนข้างยาก โดยพบเพียงครั้งเดียวจากการสำรวจ



นกฮูก

*Dactyloptena orientalis* (Cuvier, 1829) 16.8 cm TL.

# วงศ์ปลามังกรน้อย

## Family Callionymidae

### Dragonets

เป็นปลาขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มีลำตัวยาวและแบนลง ส่วนหัวมนและแบนลง ปากสามารถยืดหดได้ดี ขอบทางด้านท้ายของกระดูก preopercle ไม่มีหนาม ช่องเปิดเหงือก มีขนาดเล็กมากจนมีลักษณะคล้ายรูที่เปิดออกทางด้านล่างของลำตัว ตามีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางขอบบนของหัวจึงทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้จากทางด้านล่าง ลำตัวไม่มีเกล็ด เส้นข้างตัวเป็นรูขนาดเล็ก ครีบหลังมีสองตอนแยกจากกัน ตอนแรกมีก้านครีบแข็งที่สามารถยืดหยุ่นได้ จำนวน 4 ก้าน และมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 7-14 ก้าน ครีบหางถึงจุดเริ่มต้นของครีบกัน ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งคอ (jugular) มีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 5 ก้าน ครีบกันประกอบด้วยก้านครีบแข็งที่ยืดหยุ่นได้ 2 ก้าน และก้านครีบอ่อนที่แตกแขนงหรือไม่แตกแขนง 10-14 ก้าน ครีบหางกลม ปลาในวงศ์นี้จะมีสีพื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาล มีจุดสีแตกต่างกันไปตามชนิด มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลามังกรน้อย มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 2 สกุล 3 ชนิด



มังกรน้อย

*Callionymus meridionalis* Suwardji, 1965  
10.5 cm TL.



มังกรน้อย

*Callionymus sagitta* Pallas, 1770  
7.2 cm TL.



มังกรน้อย

*Dactylopus dactylopus* (Valenciennes, 1837) 13.6 cm TL.

# วงศ์ปลาตาบิน

## Family Trichiuridae

### Hairtails

เป็นปลาขนาดปานกลางถึงใหญ่ที่มีลำตัวยาวและแบนข้างมากจนมีรูปร่างคล้ายริบบิ้น ส่วนท้ายของลำตัวเล็กเรียวยาวจนคล้ายเส้นผม ขอบทางด้านล่างของกระดูกแผ่นปิดเหงือกเว้าเข้า ปากกว้างเปิดออกทางด้านหน้า ขากรรไกรล่างยาวกว่า ขากรรไกรบนและมีฟันคล้ายเขี้ยวสุนัข ฟันคมและแบนเพื่อใช้ในการกัดเหยื่อ ไม่มีครีบท้อง บางชนิดที่พบครีบท้องจะลดรูปมีขนาดเล็กมาก ไม่มีครีบหาง ครีบหลังตอนเดียวยาว มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ส่วนท้ายทอยไปจนสุดปลายหาง ครีบกันฝักอยู่ใต้ผิวหนัง ครีบหูค่อนข้างสั้น ปลาในวงศ์นี้มีสีพื้นลำตัวเป็นสีขาวเหลืองเงิน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาตาบิน เป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญและพบสม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียว



ตาบิน

*Trichiurus lepturus* Linnaeus, 1758 36.5 cm TL.



# วงศ์ปลาทุ ปลาฉิ่ง ปลาอินทรี

## Family Scombridae

### Mackerels

เป็นปลาขนาดปานกลางมีลำตัวเป็นแบบกระสวยจนถึงแบนข้างเล็กน้อย เกือบวง มีขนาดเล็กเป็นแบบขอบเรียบ (cycloid) ตามีแผ่นไขมัน (adipose eyelid) ปกคลุม ปากกว้างมีฟันขนาดเล็กบนขากรรไกร ซีกกรองเหงือกมีขนาดเล็ก ยาว และมีจำนวนมาก คอดหางเรียวยาว ไม่มีสันเนื้อที่คอดหางแต่มีสันเนื้อขนาดเล็กที่โคนหาง 2 เส้น มีครีบฝอย (finlet) ที่ส่วนท้ายของครีบหลังและครีบกัน ครีบหางเว้าลึกคล้ายส้อม ปลาในวงศ์นี้มีสีพื้นลำตัวด้านบนเป็นสีฟ้าเข้มหรือเขียวเหลืองเงิน ด้านท้องเป็นสีขาว ลำตัวมีแถบสีแตกต่างกันไปตามชนิดปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาทุ ปลาทุฉิ่ง ปลาฉิ่ง ปลาไม่ ปลาอินทรี เป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญและพบสม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 2 สกุล 3 ชนิด



ทุ

*Rastrelliger brachysoma* (Bleeker, 1851)  
17.5 cm TL.



ฉิ่ง

*Rastrelliger kanagurta* (Cuvier, 1816)  
18.3 cm TL.



อินทรี

*Scomberomorus commerson* (Lacepède, 1800) 42.6 cm TL.

# วงศ์ปลาสาเกยี่

## Family Champsodontidae

### Gapers

เป็นปลาขนาดเล็กที่มีลำตัวเรียวยาวแบนข้างเล็กน้อย ความลึกของลำตัวประมาณ 6.0 เท่า เมื่อเทียบกับความยาวมาตรฐาน หัวยาว 3.5 เท่า เมื่อเทียบกับความยาวมาตรฐาน ปากกว้างมากโดยขากรรไกรบนมีจุดสิ้นสุดที่ขอบตาหรือเลยไปเล็กน้อย มีฟันแบบฟันเขี้ยว แผ่นกระดูกปิดเหงือกบาง ขอบด้านล่างของกระดูก preopercle มีหนามยาวลักษณะคล้ายใบมีด 1 ก้าน ตาอยู่ค่อนข้างไปทางด้านบนของส่วนหัว มีเส้นข้างตัว 2 เส้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดที่หยาบและแข็ง มีครีบหลังสองตอน ตอนแรกประกอบด้วย ก้านครีบแข็ง 5 ก้าน ตอนที่สองมีฐานค่อนข้างยาว ประกอบด้วยก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 18-21 ก้าน ครีบกันไม่มีก้านครีบแข็ง มีความยาวฐานใกล้เคียงกับครีบหลังตอนที่สอง โดยมีก้านครีบอ่อน 16-21 ก้าน ครีบท้องขนาดใกล้เคียงกับครีบหู มีจำนวนก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 5 ก้าน ครีบหูมีขนาดใหญ่แต่ยาวไม่ถึงรูกัน มีก้านครีบ 13 ก้าน ครีบหางเว้าลึกแบบส้อม ปลาในวงศ์นี้มีสีด้านบนของลำตัวเป็นสีน้ำตาลเข้มอมดำ ด้านท้องมีสีขาวเงิน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาสาเกยี่ เป็นปลาที่พบค่อนข้างยาก มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียว



สาเกยี่

*Champsodon cf. capensis* Regan, 1908 7.5 cm TL.

# วงศ์ปลาตาแหงน

## Family Pinguipedidae

### Sandperches

เป็นปลาขนาดปานกลางที่มีลำตัวเรียวยาวและแบนข้างเล็กน้อย ส่วนหัวแบนลงเล็กน้อย จะงอยปากแหลม ริมฝีปากหนา ปากกว้างปานกลางและยืดหดได้เล็กน้อย ขากรรไกรบนสั้นกว่าขากรรไกรล่าง เส้นข้างตัวสมบูรณ์ ครีบหลังเป็นแบบสองตอน เชื่อมต่อกัน โดยตอนหน้ามีจุดเริ่มต้นตรงกับฐานของครีบหู มีก้านครีบแข็งจำนวน 4-5 ก้าน และมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 19-24 ก้าน ครีบกันมีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 16-19 ก้าน ครีบท้องมีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 5 ก้าน ครีบหลังและครีบกันมีฐานยาว ครีบหางตัดตรงหรือเว้าเล็กน้อย ปลาในวงศ์นี้มีพื้นลำตัวเป็นสีขาวหรือเทา มีจุดประสีน้ำตาลกระจายทั่วไป มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาตาแหงน เป็นปลาที่พบค่อนข้างยาก มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 1 สกุล 3 ชนิด



ตาแหงนครีบยาว

*Parapercis filamentosa* (Steindachner, 1878)  
7.3 cm TL.



ตาแหงนลายจุด

*Parapercis millepunctata* Günther, 1860  
6.4 cm TL.



ตาแหงนแถบเหลือง

*Parapercis xanthozona* (Bleeker, 1849) 16.3 cm TL.

# วงศ์ปลานกขุนทอง

## Family Labridae

### Wrasses

เป็นปลาที่มีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่และเป็นกลุ่มปลาที่มีรูปร่างหลากหลาย ปากเปิดออกด้านหน้ามักมีริมฝีปากหนา ยึดหดได้ มีฟันแบบฟันเขี้ยวแหลมบริเวณ ส่วนหน้าของขากรรไกร ในบางชนิดมีฟันที่มุมปาก เกล็ดมีขนาดใหญ่แบบขอบเรียบ (cycloid) มีครีบหลังตอนเดียวยาว ตอนหน้าเป็นก้านครีบแข็งที่ยึดหยุ่นได้ดีและมีความสูง โกล่เคียงกับก้านครีบอ่อนที่อยู่ตอนท้ายของครีบ ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งอก (thoracic) ครีบหางกลมมน เว้าตื้น หรือตัดตรง ปลาในวงศ์นี้มีสีสันทันหลากหลายตามชนิด มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลานกขุนทอง พบค่อนข้างยากจากเรือสำรวจเนื่องจากเป็นปลาที่อาศัยบริเวณ กองหินและแนวปะการัง มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 3 สกุล 3 ชนิด



นกขุนทอง

*Halichoeres bicolor* (Bloch & Schneider, 1801)  
9.2 cm TL.



นกขุนทอง

*Xiphocheilus typus* Bleeker, 1856  
15.4 cm TL.



แก้วกู๋

*Choerodon schoenleinii* (Valenciennes, 1839) Male 43.5 cm TL.; Female 63.0 cm TL.

# วงศ์ปลาดอกหมาก

## Family Gerreidae

### Silver-biddies, Majarras

เป็นปลาที่มีขนาดปานกลาง มีลำตัวป้อมและแบนข้าง เกล็ดบนหัวเป็นแบบขอบเรียบ (cycloid) หรือแบบเป็นขอบหนาม (ctenoid) ปากยึดหดได้ดี เมื่อถึงออกมาปากจะชี้ลงด้านล่าง ขากรรไกรมีฟันขนาดเล็กที่มีปลายแหลม ฐานครีบหลังและครีบก้นมีแผ่นของเกล็ดขึ้นไปปกคลุม เส้นข้างตัวโค้งและสมบูรณ์ ครีบหลังมีตอนเดียว ประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 9-10 ก้าน ครีบก้นมีก้านครีบแข็งจำนวน 3 ก้าน ครีบหางเว้าแบบส้อม ปลาในวงศ์นี้มีพื้นลำตัวเป็นสีขาวเหลืองเงิน ด้านบนจะมีสีเข้มกว่าด้านท้อง มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาดอกหมาก ปลาดอกหมากกระโดง พบสมำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 2 สกุล 6 ชนิด



ดอกหมากครีบสั้น

*Gerres erythrourus* (Bloch, 1791) 12.4 cm TL.



ดอกหมากกระโดง

*Gerres filamentosus* Cuvier, 1829 15.6 cm TL.



ดอกหมาก

*Gerres macrosoma* Bleeker, 1854 13.4 cm TL.



ดอกหมาก

*Gerres oyena* (Forsskål, 1775) 9.4 cm TL.



ดอกหมาก

*Gerres longirostris* (Lacepède, 1801) 16.8 cm TL.



แป้นแก้ว

*Pentaprin longimanus* (Cantor, 1849) 11.4 cm TL.



# วงศ์ปลาหนวดฤๅษี ปลาแพะ

## Family Mullidae

### Goatfishes

เป็นปลาน้ำเค็มขนาดเล็กที่มีลำตัวยาวและแบนข้าง ปากเล็กยืดหดได้ มีตำแหน่งเปิดค่อนลงมาทางด้านล่างของหัว ใต้คางมีหนวดยาว 2 เส้น ทำหน้าที่ค้นหาเหยื่อที่ฝังตัวอยู่ใกล้พื้นท้องน้ำ มีพื้นขนาดเล็กคล้ายแปรง บนขากรรไกรมีเกล็ดขนาดใหญ่ ครีบหลังสองตอนแยกห่างออกจากกัน ครีบหลังตอนแรกมีก้านครีบแข็ง 6-8 ก้าน ครีบหลังตอนที่สองมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 9 ก้าน โดยก้านครีบอ่อนก้านแรกเป็นก้านครีบอ่อนที่ไม่แตกแขนง ในขณะที่ก้านอื่น ๆ จะแตกแขนง ครีบหางเว้าเป็นรูปส้อม ปลาในวงศ์นี้จะมีสีที่แตกต่างกันไปตามชนิด เช่น มีแถบแนวนอน บั้งขวาง จุด หรือแต้มสีที่แตกต่างกัน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาแพะ ปลาหนวดฤๅษี เป็นปลาที่พบสม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 2 สกุล 5 ชนิด



แพะหัวโต  
*Parupeneus heptacanthus* (Lacepède, 1802)  
28.6 cm TL.



แพะ  
*Parupeneus indicus* (Shaw, 1803) 26.2 cm TL.



แพะเหลือง  
*Upeneus sulphureus* Cuvier, 1829 10.2 cm TL.



แพะแดง  
*Upeneus sundaicus* (Bleeker, 1855) 13.2 cm TL.



แพะลาย  
*Upeneus tragula* (Richardson, 1846) 17.2 cm TL.

# วงศ์ปลาข้างลาย ปลาข้างตะกาศ

## Family Teraponidae

### Croakers, Grunters

เป็นปลาขนาดเล็กจนถึงปานกลางที่มีลำตัวป้อมแบนข้าง เกิดขนาดเล็กลงถึงปานกลาง มีขอบนอกเป็นหนามแหลมคม (ciliated scales) ปากเล็กเฉียงเล็กน้อย มุมล่างของกระดูก preopercle และส่วนท้ายของกระดูก opercle มีหนามแข็ง 2 ก้าน ครีบหลังสองตอนติดกัน แบ่งจากกันได้โดยร่องบาก (notch) ประกอบด้วย ก้านครีบแข็งจำนวน 11–14 ก้าน และ ก้านครีบอ่อน 8–14 ก้าน ครีบหางเว้าเล็กน้อย (emarginate) ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งอก โดยมีจุดกำเนิดหลังฐานของครีบหู ประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 5 ก้าน ปลาในวงศ์นี้จะมีพื้นลำตัวสีขาวเหลืองเงิน มีแถบสีพาดตามแนวยาวของลำตัวแตกต่างกันไปตามชนิด มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาข้างลาย ปลาข้างตะกาศ เป็นปลาที่พบสมำเสมอบริเวณน้ำกร่อยหรือปากแม่น้ำ และมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 1 สกุล 3 ชนิด



ข้างตะกาศ

*Terapon jarbua* (Forsskål, 1775) 16.8 cm TL.



ข้างลาย

*Terapon puta* (Cuvier, 1829) 11.2 cm TL.



ข้างลาย

*Terapon theraps* Cuvier, 1829 14.6 cm TL.

# วงศ์ปลากะรัง ปลาเก๋า

## Family Serranidae

### Groupers, Rock cods

เป็นกลุ่มปลาที่มีขนาดปานกลางถึงใหญ่ และมีความหลากหลายของชนิดค่อนข้างสูง มีรูปร่างหลายแบบตั้งแต่ลำตัวรูปไข่ ป้อม ไปจนถึงลำตัวค่อนข้างยาว ลำตัวมีทั้งแบบแบนข้างมากไปจนถึงลำตัวหนา มีเกล็ดขนาดเล็กเป็นแบบขอบนอกเป็นหนาม (ctenoid) ปากกว้างเปิดในตำแหน่งด้านหน้า ขากรรไกรสั้นสุดที่ขอบหลังของตาและปลายของกระดูก premaxilla กว้างมาก มีฟันปลายแหลมเรียวคล้ายเขี้ยวสุนัขเรียงตัวบนขากรรไกรบนและล่าง ขอบหลังของแผ่นกระดูกปิดเหงือก (opercle) มีหนาม 2-3 ก้าน (ส่วนมากมี 3) กระดูก preopercle อาจมีขอบเป็นหยักคล้ายฟันเลื่อยหรืออาจมีขอบเรียบในบางชนิด ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งอก อาจอยู่ใต้ อยู่หน้า หรืออยู่หลังครีบหู ครีบหลังมีทั้งแบบยาวติดกันและแบ่งเป็นสองตอน มีก้านครีบแข็ง 9-11 ก้าน ครีบกันลำ มีก้านครีบแข็ง 3 ก้าน ครีบหางแบบปลายแหลม เว้า กลม หรือตัดตรง ปลาในวงศ์นี้จะมีสีสันทันที่แตกต่างกันไปตามชนิด เช่น มีแถบแนวนอน บั้งขวาง จุด หรือแต้มสี มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลากะรัง ปลาเก๋า เป็นปลาที่พบสม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 4 สกุล 9 ชนิด



กะรังทองกำปั่น

*Cephalopholis boenak* (Bloch, 1790) 23.8 cm TL.



กะพงเหลืองเล็ก

*Diploprion bifasciatum* Cuvier, 1828 16.7 cm TL.



กะรังลายทางตัด

*Epinephelus areolatus* (Forsskål, 1775) 32.5 cm TL.



เกำหางซ้อน

*Epinephelus bleekeri* (Vaillant, 1878) 36.7 cm TL.



เกำดอกแดง

*Epinephelus coioides* (Hamilton, 1822) 45.6 cm TL.



กะรังดอกน้ำตาล

*Epinephelus quoyanus* (Valenciennes, 1830)  
40.0 cm TL.



กะรังหกแถบ

*Epinephelus sexfasciatus* (Valenciennes, 1828)  
35.5 cm TL.



กะรังลายเสือ

*Plectropomus leopardus* (Lacepède, 1802)  
60.5 cm TL.



จุนรุต


*Plectropomus maculatus* (Bloch, 1790) 46.2 cm TL.

# วงศ์ปลาตาหวาน

## Family Priacanthidae

### Bigeyes, Bulleyes

เป็นปลาที่มีขนาดปานกลาง มีลำตัวป้อมและแบนข้าง ตามีขนาดใหญ่มาก มีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวหัว ปากกว้างเฉียงขึ้น เกล็ดขนาดเล็ก เป็นแบบขอบหนาม (ctenoid) ทำให้ผิวตัวสากเวลาสัมผัส ครีบหลังสองตอนเชื่อมต่อกัน ประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 10 ก้าน และก้านครีบอ่อน 11-15 ก้าน มีแผ่นเนื้อเชื่อมระหว่าง ก้านครีบท้องด้านในและลำตัวส่วนท้อง ครีบกันยาว ประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 3 ก้าน และก้านครีบอ่อน 10-16 ก้าน ครีบหางเว้าเล็กน้อย ปลาในวงศ์นี้มีสีลำตัวเป็นสีแดงหรือ ชมพูแดง มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาตาหวาน ปลาตาโต เป็นปลาที่พบได้น้อยจากเรือสำรวจ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียว



ตาหวาน

*Priacanthus tayenus* Richardson, 1846 24.5 cm TL.



# วงศ์ปลาแป้น ปลาแป้นทะเล

## Family Leiognathidae

### Slipmouthes, Ponyfishes

เป็นปลาที่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง มีลำตัวเป็นรูปไข่จนถึงป้อมและแบนข้างมาก มีเกล็ดขนาดปานกลางและบางใส มีขอบนอกเรียบ (cycloid) ไม่มีเกล็ดบนหัว บริเวณทรวงอกปกคลุมด้วยเกล็ดที่บางมากหรืออาจไม่มีเกล็ด ปากมีขนาดเล็กยึดหดได้ดี ขณะยึดจะดูดกลืนเป็นท่อ ในบางสกุลยึดออกแล้วชี้ตรงไปด้านหน้า บางสกุลชี้ขึ้นด้านบน บางสกุลชี้ลงด้านล่าง ครีบหลังมีสองตอนแต่รวมกันเป็นครีบเดียวยาว ประกอบด้วย ก้านครีบแข็ง 8-11 ก้าน ก้านครีบอ่อน 11-16 ก้าน ครีบกันมีก้านครีบแข็ง 3 ก้าน ก้านครีบอ่อน 14 ก้าน ครีบท้องอยู่ตำแหน่งอกและฐานของครีบท้องมีเกล็ดขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนรูปไปมีฐานใหญ่และมีปลายแหลม (axillary scale) ครีบหางเป็นแบบเว้าลึก ปลาในวงศ์นี้มีลำตัวด้านบนเป็นสีเทาเหลืองเงิน ด้านท้องมีสีจางเป็นสีขาวหรือขาวอมเงิน มีแถบและจุดสีต่าง ๆ กันไปตามชนิดของปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาแป้น เป็นปลาที่พบสม่ำเสมอจากเรือสำรวจ มักอาศัยรวมกันเป็นฝูงบริเวณปากแม่น้ำหรือชายฝั่งที่มีพื้นท้องน้ำเป็นโคลนปนทราย มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 8 สกุล 12 ชนิด



แป้นแถบ

*Aurigequula fasciata* (Lacepède, 1803) 8.6 cm TL.



แป้นเมือก

*Eubleekeria splendens* (Cuvier, 1829) 7.4 cm TL.



แป้นกระสวย

*Equulites elongatus* (Günther, 1874) 7.8 cm TL.



แป้นกระโดงยาว

*Equulites leuciscus* (Günther, 1860) 6.4 cm TL.



แป้น

*Equulites lineolatus* (Valenciennes, 1835) 7.5 cm TL.



แป้นทะเล

*Gazza minuta* (Bloch, 1795) 9.2 cm TL.



แป้นคอดำ

*Leiognathus brevirostris* (Valenciennes, 1835)  
10.2 cm TL.



แป้นจุกสั้น

*Nuchequula gerreoides* (Bleeker, 1851)  
8.2 cm TL.



แป้นกระดาน

*Photopectoralis bindus* (Valenciennes, 1835)  
5.6 cm TL.



แป้นปากหมู

*Secutor indicus* Monkolprasit, 1973  
6.5 cm TL.



แป้นปากหมู

*Secutor insidiator* (Bloch, 1787) 6.8 cm TL.



แป้นเขี้ยว

*Secutor ruconius* (Hamilton, 1822) 6.7 cm TL.

# วงศ์ปลาผีเสื้อ

## Family Chaetodontidae

### Butterfly fishes

เป็นปลาขนาดปานกลางที่อาศัยบริเวณแนวปะการังหรือกองหินใต้น้ำ ลำตัวมีรูปร่างเป็นรูปไข่ มีความลึกและแบนข้างมาก ปากมีขนาดเล็กและยืดหดได้ดี พื้นบนขากรรไกรมีขนาดเล็กเป็นแบบขนแปรงและแบบโค้ง มีเกล็ดขนาดเล็ก (ciliated scales) หรือเกล็ดขนาดปานกลางขอบนอกมีหนาม (ctenoid) ครีบหลังรวมกันเป็นครีบเดียว มีก้านครีบแข็ง 6–16 ก้าน และก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 15–31 ก้าน ครีบกันมีก้านครีบแข็ง 3–4 ก้าน ก้านครีบอ่อน 15–23 ก้าน ครีบหางเป็นแบบตัดตรง กลมมน หรือเว้าเล็กน้อย ปลาในวงศ์นี้มีสีลำตัว แดง และจุดสีต่าง ๆ กันไปตามชนิดของปลา เนื่องจากเป็นปลาที่มีสีสันสวยงาม จึงมีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาผีเสื้อ เป็นปลาที่พบน้อยจากเรือสำรวจ พบ 2 สกุล 2 ชนิด



ผีเสื้อเอดดำ

*Parachaetodon ocellatus* (Cuvier, 1831) 10.6 cm TL.



ผีเสื้อครีบสูง

*Coradion altivelis* McCulloch, 1916 17.2 cm TL.

## วงศ์ปลากะพงແສມ ปลาครีดยาค

### Family Haemulidae

#### Sweetlips, Grunts

เป็นกลุ่มปลาที่คล้ายกับปลากะพงที่มีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ มีลำตัวค่อนข้างป้อมและแบนข้าง เกล็ดแบบมีขอบเป็นหนาม (ctenoid) ขนาดเล็กถึงปานกลาง บริเวณส่วนหัวและด้านหน้าของตามีเกล็ดปกคลุมและขอบนอกของหัวจะโค้งนูนมาก ปากค่อนข้างเล็กเปิดออกทางด้านหน้า ริมฝีปากหนา ฟันสั้นและไม่มีฟันเขี้ยว ใต้คางมีรูเปิดจำนวน 2-6 คู่ ครีบหลังสองตอนเชื่อมติดกัน มีก้านครีบแข็ง 9-15 ก้าน และก้านครีบอ่อน 12-26 ก้าน ก้านครีบแข็งของครีบหลังและครีบกันใหญ่และแข็งแรง ครีบกันมีก้านครีบแข็งก้านที่สองยาวที่สุด ครีบหางเป็นแบบตัดตรงหรือเว้าเล็กน้อย ปลาในวงศ์นี้มีสีสันทแปรผันตามชนิดและเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุ มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาสร้อยนกเขา ปลาครีดยาค เป็นปลาที่พบสม้าเสมอจากเรือสำรวจ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 2 สกุล 4 ชนิด



สร้อยนกเขา

*Diagramma pictum* (Thunberg, 1792)  
10.3 cm TL.



สร้อยนกเขา

*Diagramma pictum* (Thunberg, 1792)  
14.6 cm TL.



สร้อยนกเขา

*Diagramma pictum* (Thunberg, 1792)  
38.6 cm TL.



กะพงແສມ

*Pomadasys maculatus* (Bloch, 1793)  
18.5 cm TL.

# วงศ์ปลากระพง

## Family Lutjanidae

### Snappers

เป็นปลาน้ำจืดปานกลางถึงใหญ่ มีลำตัวป้อมและแบนข้างปานกลาง มีเกล็ดปกคลุมลำตัวและแก้มเป็นแบบที่มีขอบหลังเป็นหนาม (ctenoid) ปากกว้าง ในขณะที่ปากปิดนั้น กระดูกขากรรไกรบนทั้งหมดจะวางตัวอยู่ใต้กระดูกไต้ตา (lachrymal) มีฟันที่ขากรรไกรเป็นแบบหลายแถว แถวนอกเป็นฟันเขี้ยวมีขนาดใหญ่กว่าแถวที่อยู่ถัดไปด้านใน ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีฟันเขี้ยว มีเกล็ดข้างแก้มและแผ่นปิดเหงือก ครีบหลังเชื่อมต่อกันเป็นครีบเดียวยาวหรือมีรอยหยัก (notch) ระหว่างส่วนของก้านครีบแข็งกับส่วนของก้านครีบอ่อน ประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 9-12 ก้าน และมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 10-19 ก้าน ครีบท้องอยู่ตำแหน่งอก มีจุดเริ่มต้นอยู่หลังฐานครีบหู ครีบกันมีก้านครีบแข็ง 3 ก้าน และมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 7-11 ก้าน ครีบหางตัดตรงหรือเว้าลึก ปลาในวงศ์นี้มีสีสันทันแปรผันตามชนิดและมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุ มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลากระพง ปลาอังกะเบด บางชนิดเป็นปลาที่พบทั่วไป บางชนิดพบค่อนข้างน้อย บางชนิดสามารถอพยพเข้าไปหากินในเขตน้ำจืด มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 1 สกุล 5 ชนิด



กระพงแดงปานขาว

*Lutjanus bohar* (Forsskål, 1775) 46.8 cm TL.



กระพงแดงข้างปาน

*Lutjanus johnii* (Bloch, 1792) 29.4 cm TL.





กะพงข้างเหลือง  
*Lutjanus lutjanus* (Bloch, 1790) 21.3 cm TL.



กะพงแดง  
*Lutjanus malabaricus* (Bloch & Schneider, 1801) 5.8 cm TL. (Juvenile)



กะพงข้างแถบ  
*Lutjanus vitta* (Quoy & Gaimard, 1824) 23.8 cm TL.

# วงศ์ปลากล้วย

## Family Caesionidae

### Fusiliers

เป็นปลาน้ำตื้นปานกลาง มีรูปร่างหลากหลายตั้งแต่ลำตัวป้อมแบนไปจนถึงรูปกระสวย ปากมีขนาดเล็กและยึดหดได้ดี เมื่อยึดออกปลายจะชี้ขึ้นเล็กน้อย ฟันบนขากรรไกรทั้งสองเป็นแบบฟันเขี้ยวขนาดเล็ก หรือบางชนิดอาจไม่มีฟันบนขากรรไกร เกล็ดมีขนาดเล็กถึงปานกลางเป็นแบบขอบหลังมีหนาม (ctenoid) มีเกล็ดบนเส้นข้างตัว 45–88 เกล็ด ครีบหลังเชื่อมต่อกัน ประกอบด้วยก้านครีบแข็ง 10–15 ก้าน และมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 8–22 ก้าน ครีบกันมีก้านครีบแข็ง 3 ก้าน และก้านครีบอ่อน 9–13 ก้าน ครีบหางเว้าลึกแบบส้อม ปลาในวงศ์นี้มีสีสันทันหลากหลายมากและเป็นลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิด มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลากล้วย ปลาลูกประทัด พบค่อนข้างน้อย มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 3 สกุล 3 ชนิด



กล้วยเหลือง

*Caesio cuning* (Bloch, 1791)  
28.2 cm TL.



เหยี่ยวแดง

*Dipterygonotus balteatus* (Valenciennes, 1830)  
5.4 cm TL.



กล้วยแดง

*Pterocaesio chrysozona* (Cuvier, 1830) 6.3 cm TL.

# วงศ์ปลาแถบ

## Family Cepolidae

### Bandfishes

เป็นปลาขนาดเล็กที่มีลำตัวยาวและแบนข้างมาก ส่วนหางเรียวยาว ส่วนหัวทุตัน จะงอยปากสั้นและโค้งมน ตาโต ปากกว้างเฉียงลง ขากรรไกรบนมีปลายกว้างและสิ้นสุดเลยจุดกึ่งกลางตา ฟันบนขากรรไกรเรียวยาว มีฟันเขี้ยว ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดบางใส ที่มีขนาดเล็ก เส้นข้างลำตัวอยู่ค่อนข้างสูงในแนวใกล้กับฐานของครีบหลัง ครีบหลังและครีบก้นยาว จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ที่บริเวณต้นคอ (nape) ครีบท้องอยู่ในตำแหน่งทรวงอก มีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 5 ก้าน ครีบหางมีขนาดเล็กเป็นรูปหอก มีก้านครีบ 9-10 ก้าน ปลาในวงศ์นี้มีพื้นลำตัวสีขาวอมแดง มีจุดสีแดงกระจายบริเวณลำตัว มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาแถบ ปลากระบีแดง พบค่อนข้างน้อย มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียว



กระบีแดง

*Acanthocepola abbreviata* (Valenciennes, 1835) 36.5 cm TL.

# วงศ์ปลาตะกรับ ปลาเสือดาว

## Family Scatophagidae

### Scats

เป็นปลาน้ำจืดปานกลาง มีลำตัวรูปสี่เหลี่ยมและแบนข้างมาก เกล็ดขนาดเล็กมาก เป็นแบบขอบมีหนาม (ctenoid) ติดแน่นกับลำตัว ปากเล็กเปิดทางด้านหน้า ยึดหดไม่ได้ เส้นข้างตัวโค้งและสมบูรณ์ ครีบหลังมีสองตอนเชื่อมติดกันและมีร่องบาก (notch) ที่รอยต่อของครีบหลังทั้งสองตอน มีแถวของเกล็ดขนาดเล็กขึ้นปกคลุมที่ฐานของครีบหลัง ตอนที่สอง ก้านครีบแข็ง ก้านแรกของครีบหลังสั้นและชี้ไปทางด้านหน้า มีก้านครีบแข็ง 11 ก้าน ครีบหูค่อนข้างกลมและมีเกล็ดเสริม (axillary scale) ที่มุมของตัวครีบและลำตัว ครีบกันมีก้านครีบแข็ง 4 ก้าน ครีบหางตัดตรงหรือเป็นแบบ double emarginate ปลาในวงศ์นี้มีพื้นลำตัวสีเทาอมเหลือง มีจุดสีดำกระจายบริเวณลำตัว มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาตะกรับ ปลาเสือดาว พบค่อนข้างน้อยจากเรือสำรวจ มีการแพร่กระจายบริเวณแนวชายฝั่งของอ่าวไทยตอนใน มักพบปลาวัยรุ่นอาศัยในบริเวณปากแม่น้ำและป่าชายเลน พบเพียงชนิดเดียว



ตะกรับ

*Scatophagus argus* (Linnaeus, 1766) 12.3 cm TL.

# วงศ์ปลาสิลิดิน

## Family Siganidae

### Rabbit fishes

เป็นปลาขนาดปานกลาง มีลำตัวรูปไข่และแบนข้าง จะงอยปากขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายท่อในบางชนิดและยึดหดไม่ได้ ฟันรูปร่างคล้ายฟันตัดที่ซี่ฟันแบนข้าง มีปลายตัดคล้ายกับส่วขนาดเล็กที่เรียงเป็นระเบียบบนขากรรไกร เกิดขนาดเล็กแบบขอบเรียบ (cycloid) ฝังอยู่ใต้ผิวหนัง เส้นข้างตัวสมบูรณ์ ครีบหลังมีก้านครีบแข็งที่แข็งแรงจำนวน 13 ก้าน โดยก้านครีบหลังก้านแรกมีขนาดเล็กและชี้ไปด้านหน้าของลำตัว และก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 10 ก้าน ครีบกันมีก้านครีบแข็ง 7 ก้าน และก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 9 ก้าน ครีบทุกลมม่น ครีบท้องมีก้านครีบแข็ง 2 ก้าน โดยก้านแรกจะอยู่ที่ขอบด้านหน้าแล้วคั่นด้วยก้านครีบอ่อนจำนวน 3 ก้าน มีก้านครีบแข็งที่ยาวกว่าก้านอื่น ๆ อยู่ด้านใน และมีเยื่อยึดระหว่างครีบท้องกับลำตัว ครีบหางเว้าเล็กน้อยหรือเว้าลึก มีพื้นลำตัวสีเทาอมเหลืองหรือเทาอมเขียวอ่อน มีจุดหรือแถบสีขาวกระจายบริเวณลำตัว มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาซีตัง ปลาสิลิดิน พบสมำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 1 สกุล 2 ชนิด



สลิคทะเลจุดขาว

*Siganus canaliculatus* (Park, 1797) 10.4 cm TL.



สลิคทะเลแถบ

*Siganus javus* (Linnaeus, 1766) 19.3 cm TL.



# วงศ์ปลากระรังหัวโขน ปลาสิงโต

## Family Scorpaenidae

### Scorpionfishes, Rockfishes

เป็นปลาขนาดปานกลาง มีรูปร่างที่หลากหลายตั้งแต่กลมสั้นไปจนถึงค่อนข้างยาว ลำตัวแบนข้าง หัวโตมีสันกระดูก อาจมีหรือไม่มีหนาม มีหนาม 1 หรือ 2 ก้าน ที่แผ่นกระดูก opercle และมีหนาม 3-5 ก้าน บนกระดูก preopercle แผ่นเยื่อเหงือกทั้งสองข้าง เชื่อมรวมกันแต่ไม่เชื่อมกับเนื้อบริเวณคอคอด (isthmus) ช่องเปิดเหงือกกว้าง ครีบหลังตอนเดียว บริเวณกลางครีบเป็นร่องบาก (notch) ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ก้านครีบแข็ง 11-17 ก้าน และก้านครีบอ่อน 8-17 ก้าน มักมีต่อมพิษที่โคนก้านครีบแข็ง ครีบหุมีขนาดใหญ่ มีก้านครีบอ่อน 11-25 ก้าน ในบางชนิดจะมีก้านครีบหูด้านล่างแยกออกเป็นอิสระ 1-3 ก้าน ครีบท้องมีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และก้านครีบอ่อน 2-5 ก้าน ครีบกันมีก้านครีบแข็ง 1-3 ก้าน และก้านครีบอ่อน 3-9 ก้าน ปลาในวงศ์นี้มีสีสันทึบสวยงามและหลากหลาย มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลากระรังหัวโขน ปลาแมงป่อง ปลาสิงโต เป็นปลาที่พบสม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 5 สกุล 5 ชนิด



กระรังหัวโขนหูดำ

*Apistus carinatus* (Bloch & Schneider, 1801) 7.6 cm TL.



สิงโต

*Pterois russellii* Bennett, 1831 30.5 cm TL.



กะรังหัวโขน

*Scorpaenopsis cf. neglecta* Heckel, 1837 16.4 cm TL.



กะรังหัวโขนยาว

*Inimicus cuvieri* (Grey, 1835) 19.2 cm TL.



กะรังหัวโขนหูต่าง

*Minous monodactylus* (Bloch & Schneider, 1801) 13.6 cm TL.

# วงศ์ปลาหัวแบน ปลาหางควาย

## Family Platycephalidae

### Flathead fishes

เป็นปลาที่มีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ มีลำตัวยาวและแบนลง ส่วนหัวแบนมาก มีสันแข็งที่ขอบของกระดูกส่วนหัว มีลักษณะแหลมเรียงเป็นแถว เกิดเป็นแบบขอบหนาม (ctenoid) มีเส้นข้างตัวสมบูรณ์ ครีบหลังแยกออกเป็นสองตอน ครีบหลังตอนแรก มีก้านครีบแข็ง 6-10 ก้าน ครีบหลังตอนที่สองมีความยาวกว่าตอนแรก ครีบหลังตอนที่สองมีก้านครีบอก่อนที่แตกแขนง จำนวน 10-15 ก้าน ครีบกันไม่มีก้านครีบแข็ง และมีก้านครีบอก่อนที่แตกแขนง 10-15 ก้าน ฐานของครีบก้นยาวกว่าฐานของครีบหลังตอนที่สอง ครีบท้องอยู่ตำแหน่งอก มีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และมีก้านครีบอก่อนที่แตกแขนง 5 ก้าน ปลาในวงศ์นี้มีพื้นลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำตาลเข้มจนถึงน้ำตาลดำ ด้านท้องเป็นสีอ่อน มีจุดและแถบสีแตกต่างกันตามชนิด มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาข้างเหยียบ ปลาหัวแบน ปลาหางควาย เป็นปลาที่พบสม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 5 สกุล 5 ชนิด



A (lateral view)



B (dorsal view)

#### ข้างเหยียบหัวแบน

*Elates ransonnettii* (Steindachner, 1876) 22.3 cm TL.



A (lateral view)



B (dorsal view)

#### หางควาย

*Platycephalus indicus* (Linnaeus, 1758) 32.5 cm TL.




ข้างเหยี่ยว

*Rogadius pristiger* (Cuvier, 1829) 8.7 cm TL. (dorsal view)



ข้างเหยี่ยว

*Sorsogona tuberculata* (Cuvier, 1829) 14.6 cm TL. (lateral view)



ข้างเหยี่ยว


*Suggrundus macracanthus* (Bleeker, 1869) 11.7 cm TL. (lateral view)

# วงศ์ปลาหูช้าง ปลาแมลงปอ ปลาใบโพธิ์

## Family Drepaneidae

### Sicklefishes

เป็นปลาที่มีขนาดปานกลาง มีลำตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและแบนข้างมาก เกิดขนาดเล็กเป็นแบบมีขอบนอกเป็นหนามขนาดเล็ก (ctenoid) หรือมีหนามแข็ง (ciliated scales) ปากเล็กเปิดในตำแหน่งด้านหน้า ยึดหดได้ดี เมื่อยืดออกส่วนปากจะชี้ลงด้านล่าง มีหนามขนาดเล็กที่มีปลายชี้ไปด้านหน้า (procumbent spine) บริเวณหน้าครีบหลัง ครีบหลังมีรอยเว้า แยกระหว่างครีบหลังส่วนหน้าที่เป็นก้านครีบแข็งและครีบหลังส่วนหลัง เป็นก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง ครีบอกเป็นรูปเคียว (falcate) ที่มีความยาวมาก โดยมีจุดสิ้นสุดที่คอดหาง ปลาในวงศ์นี้มีพื้นลำตัวเป็นสีเทาเหลืองเงิน มีจุดสีดำบริเวณลำตัว มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาหูช้าง ปลาแมลงปอ เป็นปลาที่พบสม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไป บริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียวจากเรือสำรวจ



ใบปอ

*Drepane punctata* (Linnaeus, 1758) 21.6 cm TL.



# วงศ์ปลาหูช้าง ปลาคลุด

## Family Ehippidae

### Batfishes

เป็นปลาขนาดปานกลาง มีลำตัวสั้นเป็นรูปไข่จนถึงกลม (orbicular) หรือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่แบนข้างมาก ส่วนหัวค่อนข้างเล็ก มีความยาวน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความลึกลำตัว ตอนหน้าของหัวไม่มีเกล็ดปกคลุม ปากขนาดเล็กยึดหดไม่ได้ ขากรรไกรยาวไม่ถึงแนวเส้นตรงที่ลากผ่านขอบหลังตา เกล็ดแบบมีขอบหนาม (ctenoid) ขนาดเล็กหรือขนาดปานกลาง ครีบหลังและครีบก้นมีก้านครีบ ก้านแรกยกสูงขึ้น ครีบหูสั้นและกลม ครีบท้องยาวปลายแหลม ครีบหางแบบ double emarginated ปลาในวงศ์นี้มีพื้นลำตัวเป็นสีเทาดำ มีแถบสีแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาหูช้าง ปลาคลุด เป็นปลาที่พบน้อยจากเรือสำรวจ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 1 สกุล 2 ชนิด



หูช้าง

*Platax batavianus* Cuvier, 1831 8.6 cm TL.



หูช้างกลม

*Platax orbicularis* (Forsskål, 1775) 10.6 cm TL.



หูช้างกลม

*Platax orbicularis* (Forsskål, 1775)  
18.2 cm TL.



หูช้างกลม

*Platax orbicularis* (Forsskål, 1775)  
41.5 cm TL.

# วงศ์ปลาจวด

## Family Sciaenidae

### Croakers

สมาชิกของปลาในวงศ์นี้เป็นปลาขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ และเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายของรูปร่างมาก โดยส่วนใหญ่จะมีรูปร่างค่อนข้างยาวและแบนข้าง ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดยกเว้นที่จะงอยปาก มีเกล็ดเป็นแบบขอบนอกเป็นหนาม (ctenoid) ที่ติดแน่นกับลำตัว หรือแบบ ciliated scales ส่วนมากปากจะเปิดในตำแหน่งด้านหน้า แต่มีบางชนิดมีปากเปิดในตำแหน่งด้านล่าง ปากกว้างยืดหดได้เล็กน้อย มีฟันซี่ยาว ส่วนหัวมีรูที่เป็นปลายเปิดของเส้นประสาทโดยจะพบบริเวณจะงอยปาก บางสกุลอาจมีหนวดได้คาง เส้นข้างตัวยาวถึงปลายครีบหาง กระเพาะลมมีรูปร่างหลายแบบ ครีบหลังมีสองตอนแยกจากกันด้วยร่องลึก ครีบหลังตอนแรกเป็นก้านครีบแข็ง ครีบหลังตอนที่สองเป็นก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง ครีบกันมีก้านครีบแข็ง 1-2 ก้าน ครีบหางกลมหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลาในวงศ์นี้มีพื้นลำตัวเป็นสีเทาดำ มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาจวด ปลาเมียน เป็นปลาที่พบสม่ำเสมอบริเวณพื้นที่ท้องน้ำที่เป็นโคลนปนทราย มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 6 สกุล 11 ชนิด



จวดคอดำ

*Dendrophysa russelli* (Cuvier, 1829) 16.4 cm TL.



จวด

*Johnius amblycephalus* (Bleeker, 1855) 18.2 cm TL.



จวด

*Johnius belangerii* (Cuvier, 1830) 8.5 cm TL.



จวด

*Johnius carouna* (Cuvier, 1830) 14.6 cm TL.



จวด

*Johnius macropterus* (Bleeker, 1853) 8.4 cm TL.



จวด

*Johnius macrorhynchus* (Lal Mohan, 1976) 18.5 cm TL.



จวด

*Johnius trachycephalus* (Bleeker, 1851) 22.6 cm TL.



จวด

*Nibea soldado* (Lacepède, 1802) 25.2 cm TL.



จวดเทียน

*Otolithes ruber* (Bloch & Schneider, 1801) 26.6 cm TL.



จวดยาว

*Panna microdon* (Bleeker, 1849) 10.2 cm TL.



จวด

*Pennahia pawak* (Lin, 1940) 8.7 cm TL.

# วงศ์ปลาเห็ดโคน

## Family Sillaginidae

### Sand whittings, Smelts

เป็นปลาที่มีขนาดปานกลาง มีลำตัวกลมเรียวยาวและค่อนข้างกลม ส่วนหัวแหลม เป็นรูปกรวยที่มีปลายแหลม ปากมีขนาดเล็กและเปิดในตำแหน่งด้านหน้า ปากยึดหดได้ ปานกลาง ฟันบนขากรรไกรมีขนาดเล็กและมีลักษณะเป็นแถบ ขอบบนของกระดูกกระพุ้งแก้ม มีหนามแข็ง ช่องเปิดเหงือกกว้าง เกิดแบบมีขอบหนาม (ctenoid) ขนาดเล็ก เส้นข้างลำตัวยาวไม่ถึงปลายหางและโค้งเล็กน้อยในตอนหน้าของแนวเกล็ด ครีบหลังสองตอนแยกจากกัน ครีบหลังอันแรกมีก้านครีบแข็ง 9-12 ก้าน ครีบหลังตอนที่สองมีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน และมีก้านครีบอก่อนที่แตกแขนง 16-27 ก้าน ครีบหูและครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบกันยาว ครีบทงตัดตรงหรือเว้าตื้น ปลาในวงศ์นี้มีพื้นลำตัวสีขาวเหลืองปนน้ำตาล มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาทราย ปลาเห็ดโคน เป็นปลาที่พบค่อนข้างน้อยจากเรือสำรวจ พบแพร่กระจายบริเวณแนวชายฝั่งของอ่าวไทยตอนใน โดยมักอาศัยอยู่ในน้ำค่อนข้างตื้นและมีพื้นเป็นทราย พบเพียงชนิดเดียวจากเรือสำรวจ



เห็ดโคน

*Sillago sihama* (Forsskal, 1775) 17.5 cm TL.

# วงศ์ปลาทรายแดง ปลาทรายขาว ปลาสายรุ้ง ปลานกทะเล

## Family Nemipteridae

### Threadfin breams

เป็นปลานานาชนิดปานกลางอยู่รวมกันเป็นฝูง มีลำตัวค่อนข้างยาวและแบนข้าง ปากเปิดออกทางด้านหน้ามีขนาดเล็กหรือขนาดปานกลาง สามารถยืดหดได้ ฟันบนขากรรไกรเป็นแบบฟันเขี้ยวโดยเฉพาะฟันที่อยู่ด้านหน้าของขากรรไกร บริเวณหน้าตาไม่มีเกล็ด มีเกล็ดขนาดปานกลางและเป็นแบบที่มีขอบนอกเป็นหนามขนาดเล็ก (ctenoid) มีครีบหลังตอนเดียวยาว ตอนหน้าเป็นก้านครีบแข็งที่มีความยืดหยุ่น จำนวน 10 ก้าน ครีบหูและครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบกันค่อนข้างยาว ประกอบด้วย ก้านครีบแข็ง 3 ก้าน และก้านครีบอ่อน 7-8 ก้าน ครีบหางเป็นแบบเว้าลึก (fork) หรือเว้าตื้น (emarginated) ปลาในวงศ์นี้มีพื้นลำตัวเป็นสีแดงอมม่วงหรือชมพูเข้ม บางชนิดมีสีเทา มีจุดและแถบสีแตกต่างไปตามชนิดปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาทรายแดง ปลาทรายขาว เป็นปลาเศรษฐกิจที่พบสม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 3 สกุล 12 ชนิด



ทรายแดง

*Nemipterus furcosus* (Valenciennes, 1830)  
22.6 cm TL.



ทรายแดง

*Nemipterus hexodon* (Quoy & Gaimard, 1824)  
18.4 cm TL.



ทรายแดง

*Nemipterus nemurus* (Bleeker, 1857)  
17.5 cm TL.



ทรายแดง

*Nemipterus marginatus* (Valenciennes, 1830)  
16.5 cm TL.





ทรายแดง

*Nemipterus mesoprion* (Bleeker, 1853)  
15.4 cm TL.



ทรายแดง

*Nemipterus tambuloides* (Bleeker, 1853)  
20.8 cm TL.



สายรุ้ง

*Pentapodus setosus* (Valenciennes, 1830)  
15.5 cm TL.



ทรายขาว

*Scolopsis affinis* Peters, 1877  
28.2 cm TL.



ทรายขาว

*Scolopsis margaritifer* (Cuvier, 1830)  
16.5 cm TL.



ทรายขาว

*Scolopsis monogramma* (Cuvier, 1830)  
24.6 cm TL.



ทรายขาว

*Scolopsis taeniopterus* (Cuvier, 1830)  
26.2 cm TL.



ข้าวเปียก

*Scolopsis vosmeri* (Bloch, 1792)  
19.4 cm TL.

# วงศ์ปลาหมูสี

## Family Lethrinidae

### Pig-face breams, Emperors

เป็นปลาขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ มีลำตัวคล้ายกลุ่มปลากะพง มีลำตัวแบนป้อมถึงค่อนข้างยาวและแบนข้างปานกลาง ส่วนหัวมีความลาดชันมาก จะงอยปากค่อนข้างแหลม มีเกล็ดขนาดปานกลางเป็นแบบที่มีขอบหลังเป็นหนาม (ctenoid) ส่วนหัวไม่มีเกล็ด ยกเว้นที่บริเวณกระดูกแผ่นปิดเหงือก (opercle) และบริเวณต้นคอ ขากรรไกรมีฟันหลายแบบ ได้แก่ ฟันเขี้ยว ฟันส่วนหน้าเป็นแบบขนแปรง (cardiform) ฟันที่บริเวณมุมปากเป็นรูปกรวยหรือเป็นฟันบด มีครีบหลังตอนเดียว ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นก้านครีบแข็ง จำนวน 10 ก้าน และมีครีบอ่อนที่แตกแขนง 8-9 ก้าน ครีบหูยาวถึงจุดกำเนิดของครีบกัน ครีบท้องสั้นอยู่ในตำแหน่งอก ครีบหางเว้าเล็กน้อย ปลาในวงศ์นี้มีฟันลำตัวเป็นสีเทาเหลืองเขียวมะกอก มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาหมูสี เป็นปลาที่พบสม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียวจากเรือสำรวจ



หมูสีแก้มแดง

*Lethrinus lentjan* (Lacepède, 1802) 42.6 cm TL.

# วงศ์ปลาบ

## Family Antennariidae

### Frogfishes

เป็นปลานขนาดเล็กที่มีลำตัวกลมคล้ายลูกบอลหรือแบนข้างเล็กน้อย ส่วนหัวและลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดที่เปลี่ยนรูปไปเป็นหนามขนาดเล็ก (asterities) หรือในบางชนิดไม่มีเกล็ด ช่องเปิดเหงือกกลมมีขนาดเล็กอยู่ทางด้านล่างหรืออยู่ทางด้านหลังของครีบทูปากเฉียงและมีขนาดใหญ่ ขากรรไกรบนติดกับจะงอยปาก ขากรรไกรล่างยึดหดได้ ฟันบนขากรรไกรคมปลายแหลมโค้ง ครีบหลังตอนแรกมีก้านครีบแยกจากกัน 3 ก้าน ก้านครีบหลังก้านแรกแยกจากครีบอื่น ๆ อยู่บริเวณด้านหน้าของตา มีลักษณะเป็นเส้นและกวัดแกว่งได้คล้ายคันเบ็ด สามารถยืดหดได้เพื่อการล่อเหยื่อ เรียกว่า illicium ส่วนปลายเป็นเนื้อเยื่อลักษณะเป็นแผ่นหรือเป็นกระจุก เรียกว่า esca ทำหน้าที่เป็นเหยื่อล่อ ก้านครีบหลังอันที่สองอยู่ตำแหน่งปลายของจะงอยปาก ส่วนก้านที่สามอยู่หลังตา ครีบทูยื่นยาวออกมีลักษณะคล้ายขาเดิน ครีบท้องมีก้านครีบแข็ง 1 ก้าน ก้านครีบท่อน 5 ก้าน ครีบทงกลม ปลาในวงศ์นี้มีวิธีสืบพันธุ์หลายแบบเพื่อการพรางตัวและล่อเหยื่อ มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาบ ปลาล่อเหยื่อ ปลานักตกเบ็ด เป็นปลาที่พบค่อนข้างยาก มีการแพร่กระจายบริเวณแนวน้ำลึกของอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียวจากเรือสำรวจ



กบ


*Antennarius hispidus* (Bloch & Schneider, 1801) 7.2 cm TL.

# วงศ์ปลาหัว

## Family Triacanthidae


### Tripodfishes

เป็นกลุ่มปลาที่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง มีลำตัวยาวเล็กน้อยและแบนข้าง ช่องเปิดเหงือกเล็กอยู่เหนือฐานของครีบหู ปากเล็กและเปิดออกทางด้านหน้าของจะงอยปากที่ยื่นยาว ฟันที่อยู่แถวบนของขากรรไกรทั้งสองเป็นแบบฟันตัด ในขณะที่แถวด้านในเป็นแบบฟันบด เกล็ดขนาดเล็ก แข็ง ครีบหลังสองตอน โดยตอนแรกเป็นก้านครีบแข็ง 5 ก้าน และก้านครีบอก่อนที่แตกแขนง 20–26 ก้าน ครีบหูขนาดเล็ก ครีบท้องมีก้านครีบแข็งเพียงก้านเดียว ครีบกันมีก้านครีบอก่อนที่แตกแขนง 13–22 ก้าน คอดหางเรียวยาว ครีบหางเว้าลึก ปลาในวงศ์นี้มีพื้นลำตัวเป็นสีขาวอมเทา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาหัว ปลาควาง เป็นปลาที่พบสมำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 2 สกุล 2 ชนิด



หัวสามขา

*Triacanthus nieuhoffi* Bleeker, 1852 5.2 cm TL.



หัวสามขาหางยาว

*Tripodichthys blochii* (Bleeker, 1852) 9.8 cm TL.

# วงศ์ปลากล่อง

## Family Ostraciidae

### Box fishes

เป็นปลาที่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง มีลำตัวกลมสั้นเป็นรูปไข่ที่ถูกปกคลุมด้วยแผ่นเกล็ดแข็ง (carapace) คล้ายกับมีเกราะหุ้ม ยกเว้นในส่วนของคอดหางและครีบหาง ตัวเกราะประกอบด้วย แผ่นเกล็ดที่เป็นรูปหกเหลี่ยม ปากเล็กมีริมฝีปากยื่นฟันไม่เชื่อมติดกัน ช่องเปิดเหงือกขนาดปกติอยู่ด้านหน้าฐานครีบหู มีครีบหลังตอนเดียวสั้นและอยู่ทางด้านท้ายของลำตัว ประกอบด้วย ก้านครีบ 8 ก้าน และไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหูขนาดเล็ก ไม่มีครีบท้อง ครีบหางตัดตรง ปลาในวงศ์นี้มีพื้นลำตัวเป็นสีขาวอมเทาหรือเทาอมเขียวอ่อน ด้านท้องสีขาวหรือเหลืองอ่อน มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลากล่อง เป็นปลาที่พบค่อนข้างน้อย มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 2 สกุล 3 ชนิด



สี่เหลี่ยมเขยั่ว

*Lactoria cornuta* (Linnaeus, 1758) 17.6 cm TL.



ปักเป้ากล่อง

*Ostracion cubicus* Linnaeus, 1758 20.5 cm TL.



ปักเป้ากล่องจมูกยาว

*Ostracion rhinorhynchos* Bleeker, 1851 26.3 cm TL.



# วงศ์ปลาวัว

## Family Monacanthidae

### File fishes

เป็นปลาที่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง มีรูปร่างหลากหลายตั้งแต่รูปไข่จนถึงรูปร่างยาว และแบนข้างมาก เกล็ดมีขนาดเล็กและมีหนามขนาดเล็กยื่นออกมา ทำให้รู้สึกสากมือ เมื่อสัมผัส ปากเล็กเปิดออกทางด้านหน้าและไม่สามารถยืดหดได้ ฟันบนขากรรไกร มีขนาดเล็กและไม่เชื่อมติดกัน ช่องเปิดเหงือกขนาดเล็กอยู่ที่ฐานครีบหู ครีบหลังสองตอน โดยตอนแรกมีก้านครีบแข็ง 2 ก้าน ก้านแรกแข็งและมีขนาดใหญ่ที่สุด ก้านที่สองมีขนาดเล็ก และติดกับก้านแรก ครีบหูขนาดเล็ก ครีบท้องมีกระดูกตอนต้นลดรูปลง ในขณะที่ก้านครีบ ตอนท้ายเชื่อมรวมกันและยื่นพ้นผิวหนังออกมา บางชนิดสามารถขยับไปมาได้ โดยจะมี แผ่นหนังที่ยึดติดกับลำตัว เรียกว่า pelvic shield ครีบกันยาว ครีบหางตัดตรง หรือ โค้งเป็นรูปพัด หรือมีปลายแหลม ปลาในวงศ์นี้มีสีพื้นลำตัวที่หลากหลายตั้งแต่สีซีด ไปจนถึงสีน้ำตาลอ่อน น้ำตาลอมแดง หรือน้ำตาลอมเขียว มีสีส้ม จุดสี และแถบสี แตกต่างกันไปตามชนิดปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาวัว ปลาใบไฟ เป็นปลาที่พบสม่ำเสมอ มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 6 สกุล 6 ชนิด



วัว

*Aluterus monoceros* (Linnaeus, 1758) 45.6 cm TL.



วัวตาบ

*Anacanthus barbatus* Gray, 1830 16.8 cm SL.



วัวหนามดอก

*Chaetodermis penicilligerus* (Cuvier, 1816) 16.2 cm TL.



วัวหางพัด

*Monacanthus chinensis* (Osbeck, 1765) 20.8 cm TL.



วัวหน้าหนู

*Paramonacanthus choirocephalus* (Bleeker, 1851) 13.4 cm TL.



วัวจุด

*Pseudomonacanthus macrurus* (Bleeker, 1856) 23.5 cm TL.

# วงศ์ปลาปักเป้า

## Family Tetraodontidae

### Puffers

เป็นปลาขนาดเล็กถึงปานกลาง มีลำตัวกลมสั้นคล้ายลูกบอล ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ และกลมมน มีฟันขนาดใหญ่แข็งแรงเชื่อมติดกัน ลักษณะคล้ายจะงอยปากนกโดยมีร่องแยก ระหว่างกลางทั้งฟันบนและฟันล่าง แบ่งเป็น 4 ซี่ ช่องเปิดเหงือกมีขนาดเล็กอยู่ด้านหน้า ครีบหู ผิวหนังมีหนามขนาดเล็กปกคลุมบางส่วน ครีบหลังไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหูขนาดเล็ก ไม่มีครีบท้อง ครีบหางแบบตัดตรงหรือเว้าเล็กน้อย หรือเป็นแบบกลม ปลาในวงศ์นี้มีสีพื้นลำตัวที่หลากหลาย ทั้งสีขาวอมเทา สีเขียวอมเหลือง มีลวดลาย จุดสี และแถบสี แตกต่างกันไปตามชนิดปลา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาปักเป้า ปลาปักเป้าน้ำหมา บางชนิดพบสม่ำเสมอ บางชนิดพบค่อนข้างน้อย มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบ 4 สกุล 6 ชนิด



ปักเป้ากันคำ

*Arothron stellatus* (Bloch and Schneider, 1801) 36.5 cm TL.



ปักเป้า

*Chelonodon patoca* (Hamilton, 1822) 12.7 cm TL.



A (lateral view)



A (lateral view)



B (dorsal view)



B (dorsal view)

ปักเป้าเขียว

*Lagocephalus lunaris* (Bloch & Schneider, 1801)  
26.5 cm TL.

ปักเป้าลายน้ำตาล

*Lagocephalus spadiceus* (Richardson, 1845)  
14.6 cm TL.



ปักเป้าหลังดำ

*Lagocephalus suezensis* Clark & Gohar, 1953 10.2 cm TL.



ปักเป้าลาย

*Torquigener hypselogeneion* (Bleeker, 1852) 11.4 cm TL.

# วงศ์ปลาปักเป้าหนามทุเรียน

## Family Diodontidae

### Porcupinefishes

เป็นปลาขนาดเล็กถึงปานกลาง มีลำตัวกลมเรียวยาวไปด้านท้าย มีหนามแหลมแข็งแรง ที่มีราก 2-3 ราก ยื่นออกมาจากผิวหนัง โดยหนามสามารถยกขึ้นลงได้ จะงอยปากสั้นทู่ ช่องเปิดเหงือกขนาดเล็กอยู่ด้านหน้าครีบหู ปากกว้าง มีฟันขนาดใหญ่แข็งแรงเชื่อมติดกัน ลักษณะคล้ายปากนก แต่ไม่มีร่องแยกระหว่างกลางทั้งฟันบนและฟันล่าง ทำให้ทั้งปากมีฟัน 2 ซี่ รูจมูกเป็นท่อ ครีบหลังและครีบก้นค่อนข้างยาวไปทางด้านท้ายของลำตัวและไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหูขนาดใหญ่ ไม่มีครีบท้อง ครีบก้นกลมมน ปลาในวงศ์นี้มีฟันลำตัวสีน้ำตาลอมแดง และมีจุดสีดำกระจายตามลำตัว มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ปลาปักเป้าหนามทุเรียน พบค่อนข้างน้อย มีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยตอนใน พบเพียงชนิดเดียวจากเรือสำรวจ



ปักเป้าหนามทุเรียน

*Diodon liturosus* Shaw, 1804 16.2 cm TL.



# เอกสารอ้างอิง

• • •

- ชวลิต วิทยานนท์. 2528. อนุกรมวิธานของปลากระบอกในน่านน้ำไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 187 หน้า.
- ทศพล กระจ่างดารา. 2560. ปลากระดุกอ่อน (ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาหู) ที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียง. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 331 หน้า.
- ประภากร ขำเชิดชูไชย. 2528. อนุกรมวิธานของปลาปักเป้าที่พบในน่านน้ำไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 163 หน้า.
- ปรียนาถ สุชะวณิช. 2532. รายชื่อปลาทะเลในน่านน้ำไทย. เอกสารเผยแพร่, กองประมงทะเล, กรมประมง. 149 หน้า.
- มนฤดี ชัยโพธิ์. 2546. อนุกรมวิธานของปลาจิ้มฟันจระเข้และม้าน้ำ (PISCES : SYNGNATHIDAE) ที่พบในน่านน้ำไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 189 หน้า.
- สำราญ ฤทธิ์รักษา. 2516. สรุปผลการศึกษาสภาพของทรัพยากรปลาน้ำดินในอ่าวไทยจากผลการสำรวจด้วยเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ตั้งแต่ปี 2506–2515 เพื่อประกอบการพิจารณาวางมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาน้ำดิน. กองสำรวจและค้นคว้า, กรมประมง. 33 หน้า.
- อนันต์ สุวรรณรักษ์ และอุดมพจน์ ศุภวิริยากร. 2553. การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อช่วยในการบ่งชี้ชนิดปลาปักเป้าทะเลที่แพร่กระจายในน่านน้ำไทย. รายงานฉบับสมบูรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 543 หน้า.
- อุกฤษฏ์ สดภูมินทร์. 2550. คู่มือปลาในแนวปะการังฝั่งอันดามันของประเทศไทย. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 231 หน้า.
- Ahmad, A., A.P.K. Lim, N.Z. Azman, Saki. M.N, and T. Krajangdara. 2018. Marine Fishes and Crustaceans of the Southeast Asian Region. SEAFDEC/MFRDMD/SP/40. 238 pp.
- Allen G., R. Swainston and J. Ruse. 2000. Marine Fishes Of South East Asia : A Field Guide For Anglers And Divers. Periplus Editions (HK) Ltd. 292 pp.
- Carpenter, K.E. and V.H. Niem. (eds.). 1999a. FAO Species Identification Guide for Fishery Purpose. The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 3. Batoid fishes, chimaeroids and bony fishes part 1 (Elopidae to Linophrynidae). FAO. Rome, Italy. p. 1397–2068.
- Carpenter, K.E. and V.H. Niem. (eds.). 1999b. FAO Species Identification Guide for Fishery Purpose. The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 4. bony fishes part 2 (Mugilidae to Carangidae). FAO. Rome, Italy. p. 2069–2790.
- Carpenter, K.E. and V.H. Niem. (eds.). 2001a. FAO Species Identification Guide for Fishery Purpose. The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 5. bony fishes part 3 (Menidae to Pomacentridae). FAO. Rome, Italy. p. 2791–3380.
- Carpenter, K.E. and V.H. Niem. (eds.). 2001b. FAO Species Identification Guide for Fishery Purpose. The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 6. bony fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae), estuarine crocodiles, sea turtles, sea snakes and marine mammals. FAO. Rome, Italy. p. 3381–4218.



- Chakrabarty, P., and Sparks, J.S. 2008. Diagnoses for *Leiognathus* Lacepède 1802, *Equula* Cuvier 1815, *Equulites* Fowler 1904, *Eubleekeria* Fowler 1904, and a New Ponyfish Genus (Teleostei : Leiognathidae). American Museum Novitates 3623 : 1–11.
- De Bruin, G.H.P., B.C. Russell and A. Bogusch. 1995. FAO species identification field guide for fishery purposes. The marine fishery resources of Sri Lanka. Rome, FAO. 400 pp.
- Kottelat, M., A.J. Whitten, S.N. Kartikasari, and S. Wirjoatmodjo, 1993. Freshwater fishes of Western Indonesia and Sulawesi. Ikan air tawar Indonesia Bagian Barat dan Sulawesi. Periplus Editions, Hong Kong. 293 pp.
- Kuiter, R. H and H. Debelius. 2006. World Atlas of Marine Fishes. IKAN-Unterwasserarchiv D-65933 Frankfurt. 720 pp.
- Margaret, M.S. and P.C. Heemstra. 1986. Smiths Sea Fishes. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown. 1047 pp.
- Masuda, H., K. Amaoka, C. Araga, T. Uyeno, and T. Yochino. 1984. The Fishes of Japanese Archipelago. Tokai University press, Shinjuku Tokai Building. Tokyo, Japan. 437 pp.
- Monkolprasit, S., S. Suebsin., V. Suri, and T. Songsirikul. 1997. Checklist of Fishes in Thailand. Office of Environmental Policy and Planning, Thailand. 353 pp.
- Moyle, P.B. and Cech, J.J. 2000. Fishes : An Introduction to Ichthyology 4<sup>th</sup>. Prentice Hall. 612 pp.
- Murdy, E.O. 2006. A revision of the gobiid fish genus *Trypauchen* (Gobiidae : Amblyopinae). Zootaxa Volume : 1343. p. 55–68.
- Nelson, J.S. 2006. Fishes of the world 4<sup>th</sup>. John Wiley & Sons, Inc;. 601 pp.
- Nelson, J.S., T.C. Grande. and M.V.H. Wilson. 2016. Fishes of the world 5<sup>th</sup>. John Wiley & Sons, Inc;. 707 pp.
- Premcharoen, S. 1993. Taxonomy of Ponyfishes and Silver-Biddles (Pisces : Leiognathidae and Gerreidae) in Thai waters. Master Thesis Department of Marine Sciences, Chulalongkorn University. 176 pp
- Randall, J.E. and M. Desoutter-Meniger. 2007. Review of the soles of the genus *Aseraggodes* (Pleuronectiformes : Soleidae) from the Indo–Malayan region, with descriptions of nine new species. Cybium 31 : 301–331.
- Satapoomin, U. and S. Poovachiranon. 1997. Fish Fauna of Mangroves and Seagrass Beds in the West coast of Thailand, the Andaman Sea. Phuket Marine Biological Center Technical Paper No. 2/1997. 63 pp.
- Talwar, P.K. and A.G. Jhingran, 1991. Inland fishes of India and adjacent countries. Volume 2. A.A. Balkema, Rotterdam. p 543–1158.
- Talwar, P.K. and A.G. Jhingran. 1991. Inland fishes of India and adjacent countries. Volume 1. A.A. Balkema, Rotterdam. 541 pp.



- Tongnunui, P., S. Tanyaros., T. Medej., H. Kurokura., M. Horinouchi., K. Ikejima., K. Kanou., M. Sano. and T. Yamane. 2002. Illustrated Fish fauna of a mangrove estuary at Sikao, southwestern Thailand. Trang Project for Biodiversity and Ecological Significance of Mangrove Estuaries in Southeast Asia. 59 pp.
- Wang, G.H., R.C. Hao., G.Z. Yang. and L.S. Zan. 2015. The complete mitochondrial genome sequence of *Eleutheronema tetradactylum* (Mugiliformes : Polynemidae) and phylogenetic studies of Mugiliformes. Journal Mitochondrial DNA Part A DNA Mapping, Sequencing, and Analysis Volume 27, 2016 – Issue 6.
- Yoshida, T., H. Motomura, P. Musikasinthorn and K. Matsuura. 2013. Fishes of northern Gulf of Thailand. National Museum of Nature and Science, Research Institute for Humanity and Nature, and Kagoshima University Museum, Japan. 239 pp.
- <https://www.fishbase.se/search.php>
- [https://www.kahaku.go.jp/research/db/zoology/Fishes\\_of\\_Andaman\\_Sea/](https://www.kahaku.go.jp/research/db/zoology/Fishes_of_Andaman_Sea/)

## ดัชนีรายชื่อวงศ์

### A

|               |         |
|---------------|---------|
| Ambassidae    | 8, 39   |
| Antennariidae | 14, 100 |
| Apogonidae    | 7, 34   |
| Atherinidae   | 8, 45   |

### B

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Batrachoididae  | 7, 33  |
| Blenniidae      | 8, 44  |
| Bothidae        | 10, 56 |
| Bregmacerotidae | 7, 31  |

### C

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Caesionidae     | 13, 84 |
| Callionymidae   | 10, 66 |
| Carangidae      | 8, 48  |
| Carcharhinidae  | 6, 18  |
| Centriscidae    | 10, 64 |
| Cepolidae       | 13, 85 |
| Chaetodontidae  | 12, 80 |
| Champsodontidae | 11, 69 |
| Chirocentridae  | 6, 27  |
| Citharidae      | 9, 54  |
| Clupeidae       | 6, 28  |
| Cynoglossidae   | 10, 59 |

### D

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Dactylopteridae | 10, 65  |
| Dasyatidae      | 6, 19   |
| Diodontidae     | 15, 107 |
| Drepaneidae     | 13, 92  |

### E

|             |        |
|-------------|--------|
| Echeneidae  | 8, 47  |
| Engraulidae | 6, 26  |
| Ephippidae  | 13, 93 |

### F

|               |        |
|---------------|--------|
| Fistulariidae | 10, 63 |
|---------------|--------|

### G

|           |        |
|-----------|--------|
| Gerreidae | 11, 72 |
| Gobiidae  | 8, 37  |

### H

|               |        |
|---------------|--------|
| Haemulidae    | 12, 81 |
| Hemiscyllidae | 6, 16  |
| Holocentridae | 7, 32  |

### L

|               |        |
|---------------|--------|
| Labridae      | 11, 71 |
| Leiognathidae | 12, 78 |
| Lethrinidae   | 14, 99 |
| Lutjanidae    | 12, 82 |

### M

|                |         |
|----------------|---------|
| Menidae        | 9, 52   |
| Monacanthidae  | 15, 103 |
| Mugilidae      | 8, 43   |
| Mullidae       | 11, 73  |
| Muraenesocidae | 6, 24   |
| Muraenidae     | 6, 22   |
| Myliobatidae   | 6, 21   |

### N

|              |        |
|--------------|--------|
| Nemipteridae | 14, 97 |
|--------------|--------|

### O

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ophichthidae     | 6, 23   |
| Opisthognathidae | 8, 41   |
| Ostraciidae      | 14, 102 |
| Oxudercidae      | 7, 36   |

### P

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Paralichthyidae | 9, 55    |
| Pegasidae       | 10, 60   |
| Pinguipedidae   | 11, 70   |
| Platycephalidae | 13, 90   |
| Plotosidae      | 7, 29    |
| Polynemidae     | 5, 8, 42 |
| Pomacentridae   | 8, 40    |

|                  |        |                |         |
|------------------|--------|----------------|---------|
| Priacanthidae    | 12, 77 | Serranidae     | 11, 75  |
| Pristigasteridae | 6, 25  | Siganidae      | 13, 87  |
| <b>R</b>         |        | Sillaginidae   | 14, 96  |
| Rachycentridae   | 8, 46  | Soleidae       | 10, 58  |
| <b>S</b>         |        | Sphyrnaeidae   | 9, 53   |
| Samaridae        | 10, 57 | Syngnathidae   | 10, 61  |
| Scatophagidae    | 13, 86 | Synodontidae   | 7, 30   |
| Sciaenidae       | 13, 94 | <b>T</b>       |         |
| Scombridae       | 11, 68 | Teraponidae    | 11, 74  |
| Scorpaenidae     | 13, 88 | Tetraodontidae | 15, 105 |
| Scyliorhinidae   | 6, 17  | Triacanthidae  | 14, 101 |
|                  |        | Trichiuridae   | 11, 67  |

## ดัชนีรายชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญ

|                                      |           |                                   |         |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
| <b>A</b>                             |           | <i>Arnoglossus aspidos</i>        | 10, 56  |
| <i>Acanthocephala abbreviata</i>     | 13, 85    | <i>Arothron stellatus</i>         | 15, 105 |
| <i>Acentrogobius caninus</i>         | 8, 37     | <i>Aseraggodes cf. dubius</i>     | 10, 58  |
| <i>Acentrogobius viridipunctatus</i> | 8, 38     | <i>Atelomycterus marmoratus</i>   | 6, 17   |
| <i>Aeoliscus strigatus</i>           | 10, 64    | <i>Atherinomorus duodecimalis</i> | 8, 45   |
| <i>Aetobatus ocellatus</i>           | 6, 21     | <i>Atropus atropos</i>            | 9, 49   |
| African pompano                      | 8         | <i>Atule mate</i>                 | 9, 49   |
| <i>Alectis ciliaris</i>              | 8, 48     | <i>Aurigequula fasciata</i>       | 12, 78  |
| <i>Alectis indica</i>                | 8, 48, 49 | <b>B</b>                          |         |
| <i>Alepes djedaba</i>                | 8, 49     | Banded scad                       | 8       |
| <i>Alepes kleinii</i>                | 8, 49     | Bandfish                          | 13      |
| <i>Alepes melanoptera</i>            | 8, 49     | Barbled leatherjacket             | 15      |
| <i>Alepes vari</i>                   | 9, 49     | Barred soapfish                   | 12      |
| <i>Aluterus monoceros</i>            | 15, 103   | Bartail flathead                  | 13      |
| <i>Ambassis gymnocephalus</i>        | 8, 39     | <i>Batrachomoeus trispinosus</i>  | 7, 33   |
| <i>Ambassis kopsii</i>               | 8, 39     | Beady pipefish                    | 10      |
| <i>Amblyeleotris</i> sp.             | 8, 37     | Bearded croaker                   | 13      |
| <i>Anacanthus barbatus</i>           | 15, 103   | Belanger's croaker                | 13      |
| <i>Anodontostoma chacunda</i>        | 6, 28     | Bengal whipray                    | 6       |
| <i>Antennarius hispidus</i>          | 14, 100   | Bigeye scad                       | 9       |
| <i>Apistus carinatus</i>             | 13, 88    | Bigeye snapper                    | 13      |
| <i>Apogonichthyoides niger</i>       | 7, 35     | Bigeye trevally                   | 9       |
| <i>Archamia bleekeri</i>             | 7, 35     | Bigscale jawfish                  | 8       |
| <i>Arcyogobius baliurus</i>          | 8, 37     | Bignoun croaker                   | 14      |
| Areolate grouper                     | 12        |                                   |         |



|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Black pomfret                        | 9     |
| Blackbanded trevally                 | 9     |
| Blackbelt cardinalfish               | 7     |
| Blackblotched porcupinefish          | 15    |
| Blackfin scad                        | 8     |
| Blacksaddle herring                  | 7     |
| Blackspot tuskfish                   | 11    |
| Blue-banded wrasse                   | 11    |
| Blue-spotted stingray                | 6     |
| Bluetail mullet                      | 8     |
| <i>Brachypleura novaezeelandiae</i>  | 9, 54 |
| <i>Bregmaceros pseudolanceolatus</i> | 7, 31 |
| <i>Brevitrygon heterura</i>          | 6, 19 |
| <i>Brevitrygon imbricata</i>         | 6, 19 |
| Brick seamoth                        | 10    |
| Brownback trevally                   | 9     |
| Brownbanded bamboo shark             | 6     |
| Brownstripe snapper                  | 13    |
| Brushtooth lizardfish                | 7     |
| Bumpnose trevally                    | 9     |
| Burrowing goby                       | 8     |
| Burrowing snake eel                  | 6     |
| Butterfly whiptail                   | 14    |

## C

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <i>Caesio cuning</i>                | 13, 84  |
| <i>Callionymus meridionalis</i>     | 10, 66  |
| <i>Callionymus sagittal</i>         | 10, 66  |
| Candystripe cardinalfish            | 7       |
| <i>Carangoides armatus</i>          | 9, 49   |
| <i>Carangoides coeruleopinnatus</i> | 9, 50   |
| <i>Carangoides hedlandensis</i>     | 9, 50   |
| <i>Carangoides malabaricus</i>      | 9, 50   |
| <i>Carangoides praeustus</i>        | 9, 50   |
| <i>Caranx sexfasciatus</i>          | 9, 50   |
| <i>Carcharhinus sorrah</i>          | 6, 18   |
| Cardinalfish                        | 7       |
| Caroun croaker                      | 14      |
| <i>Cephalopholis boenak</i>         | 11, 75  |
| Chacunda gizzard shad               | 6       |
| <i>Chaetodermis penicilligerus</i>  | 15, 104 |
| <i>Champsodon cf. capensis</i>      | 11, 69  |
| <i>Cheilodipterus artus</i>         | 7, 35   |
| <i>Chelonodon patoca</i>            | 15, 105 |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <i>Chiloscyllium hasseltii</i> | 6, 16  |
| <i>Chiloscyllium punctatum</i> | 6, 16  |
| <i>Chirocentrus nudus</i>      | 6, 27  |
| Chocolate hind                 | 11     |
| <i>Choerodon schoenleinii</i>  | 11, 71 |
| Cinnabar goatfish              | 11     |
| Cleftbelly trevally            | 9      |
| Coastal trevally               | 9      |
| Cobia                          | 8      |
| Cockatoo righteye flounder     | 10     |
| Commerson's sole               | 10     |
| Common pike conger             | 6      |
| Common silver-biddy            | 11     |
| Copper batfish                 | 13     |
| <i>Coradion altivelis</i>      | 12, 80 |
| Coral catshark                 | 6      |
| <i>Crenimugil buehneri</i>     | 8, 43  |
| <i>Cynoglossus arel</i>        | 10, 59 |
| <i>Cynoglossus bilineatus</i>  | 10, 59 |
| <i>Cynoglossus cynoglossus</i> | 10, 59 |
| <i>Cynoglossus kopsii</i>      | 10, 59 |
| <i>Cynoglossus puncticeps</i>  | 10, 59 |

## D

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <i>Dactyloptena orientalis</i>  | 10, 65  |
| <i>Dactylopus dactylopus</i>    | 11, 66  |
| <i>Decapterus russelli</i>      | 9, 50   |
| Deep pugnose ponyfish           | 12      |
| Deepbody silver-biddy           | 11      |
| <i>Dendrophysa russelli</i>     | 13, 94  |
| <i>Diagramma pictum</i>         | 12, 81  |
| <i>Diodon liturosus</i>         | 15, 107 |
| <i>Diploprion bifasciatum</i>   | 12, 75  |
| <i>Dipterygonotus balteatus</i> | 13, 84  |
| Dog-toothed goby                | 8       |
| Donkey croaker                  | 14      |
| <i>Drepane punctata</i>         | 13, 92  |
| Duskytail grouper               | 12      |
| <i>Dussumieria acuta</i>        | 6, 28   |
| Dwarf flathead                  | 13      |
| Dwarf whiptail                  | 6       |

**E**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| <i>Echeneis naucrates</i>          | 8, 47  |
| <i>Elates ransonnetii</i>          | 13, 90 |
| <i>Eleutheronema tetradactylum</i> | 8, 42  |
| Elongate ponyfish                  | 12     |
| <i>Encrasicholina heteroloba</i>   | 6, 26  |
| <i>Engyprosonon grandisquama</i>   | 10, 56 |
| <i>Epinephelus areolatus</i>       | 12, 75 |
| <i>Epinephelus bleekeri</i>        | 12, 76 |
| <i>Epinephelus coioides</i>        | 12, 76 |
| <i>Epinephelus quoyanus</i>        | 12, 76 |
| <i>Epinephelus sexfasciatus</i>    | 12, 76 |
| <i>Equulites elongatus</i>         | 12, 78 |
| <i>Equulites leuciscus</i>         | 12, 78 |
| <i>Equulites lineolatus</i>        | 12, 79 |
| <i>Escualosa thoracata</i>         | 7, 28  |
| <i>Eubleekeria splendens</i>       | 12, 78 |

**F**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| False lance codlet         | 7      |
| Fanbellied leatherjacket   | 15     |
| Fangblenny                 | 8      |
| Filamentous shrimp goby    | 8      |
| Fingered dragonet          | 11     |
| <i>Fistularia petimba</i>  | 10, 63 |
| Fivelined threadfin bream  | 14     |
| Flagfin cardinalfish       | 7      |
| Forktailed threadfin bream | 14     |
| Fourfinger threadfin       | 8      |
| Fourlined tonguesole       | 10     |
| Freckled goatfish          | 11     |
| Fringe fin zebra sole      | 10     |

**G**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Gangetic tonguesole          | 10     |
| <i>Gazza minuta</i>          | 12, 79 |
| <i>Gerres erythrouros</i>    | 11, 72 |
| <i>Gerres filamentosus</i>   | 11, 72 |
| <i>Gerres longirostris</i>   | 11, 72 |
| <i>Gerres macrosoma</i>      | 11, 72 |
| <i>Gerres oyena</i>          | 11, 72 |
| Glassy perchlet              | 8      |
| <i>Gnathanodon speciosus</i> | 9, 50  |
| Goatee croaker               | 13     |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Goby                                 | 8      |
| Goldband fusilier                    | 13     |
| Golden trevally                      | 9      |
| Goldstripe sardine                   | 7      |
| Gon's cardinalfish                   | 7      |
| <i>Grammatobothus polyophthalmus</i> | 10, 56 |
| Gray eel-catfish                     | 7      |
| Gray's pipefish                      | 10     |
| Green rough backed puffer            | 15     |
| Greenback mullet                     | 8      |
| Grey goblinfish                      | 13     |
| Gunther's gaper                      | 11     |
| <i>Gymnothorax pseudothyrsoides</i>  | 6, 22  |

**H**

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Hairtail blenny                                | 8      |
| Half-smooth golden puffer                      | 15     |
| <i>Halicampus grayi</i>                        | 10, 61 |
| <i>Halichoeres bicolor</i>                     | 11, 71 |
| Hamilton thryssa                               | 6      |
| Hardenberg anchovy                             | 6      |
| Hasselt's bamboo shark                         | 6      |
| Hedgehog seahorse                              | 10     |
| <i>Hemirygion akajei</i>                       | 6, 20  |
| <i>Herklotsichthys dispilonotus</i>            | 7, 28  |
| Herring scad                                   | 9      |
| Highfin coralfish                              | 12     |
| Highfin moray                                  | 6      |
| <i>Hippichthys (Parasyngnathus) penicillus</i> | 10, 62 |
| <i>Hippocampus spinosissimus</i>               | 10, 62 |
| <i>Hippocampus trimaculatus</i>                | 10, 62 |
| Horn-nosed boxfish                             | 15     |
| Humpback batfish                               | 13     |

**I**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <i>Ilisha kampeni</i>   | 6, 25  |
| <i>Ilisha melastoma</i> | 6, 25  |
| Indian anchovy          | 6      |
| Indian goatfish         | 11     |
| Indian ilisha           | 6      |
| Indian mackerel         | 11     |
| Indian scad             | 9      |
| Indian threadfish       | 8      |
| <i>Inimicus cuvieri</i> | 13, 89 |

|                                 |         |                               |         |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Isthmus goby                    | 8       | Longtail seamoth              | 10      |
|                                 |         | Longtail tripodfish           | 14      |
| <b>J</b>                        |         | <i>Lutjanus bohar</i>         | 12, 82  |
| Jarbua terapon                  | 11      | <i>Lutjanus johnii</i>        | 13, 82  |
| Javan flounder                  | 9       | <i>Lutjanus lutjanus</i>      | 13, 83  |
| <i>Jaydia poeciloptera</i>      | 7, 35   | <i>Lutjanus malabaricus</i>   | 13, 83  |
| <i>Jaydia striatodes</i>        | 7, 35   | <i>Lutjanus vitta</i>         | 13, 83  |
| <i>Jaydia truncata</i>          | 7, 34   |                               |         |
| John's snapper                  | 13      | <b>M</b>                      |         |
| <i>Johnius amblycephalus</i>    | 13, 94  | <i>Maculabatis gerrardi</i>   | 6, 20   |
| <i>Johnius belangerii</i>       | 13, 94  | Mahogany maskray              | 6       |
| <i>Johnius carouna</i>          | 14, 94  | Malabar blood snapper         | 13      |
| <i>Johnius macropterus</i>      | 14, 95  | Malabar trevally              | 9       |
| <i>Johnius macrorhynchus</i>    | 14, 95  | Manyeyed flounder             | 10      |
| <i>Johnius trachycephalus</i>   | 14, 95  | Mauvelip threadfin bream      | 14      |
|                                 |         | <i>Megalaspis cordyla</i>     | 9, 50   |
| <b>K</b>                        |         | <i>Meiacanthus cf. luteus</i> | 8, 44   |
| Kampen's ilisha                 | 6       | <i>Mene maculate</i>          | 9, 52   |
|                                 |         | Milkspotted puffer            | 15      |
| <b>L</b>                        |         | <i>Minous monodactylus</i>    | 13, 89  |
| <i>Lactoria cornuta</i>         | 14, 102 | <i>Monacanthus chinensis</i>  | 15, 104 |
| <i>Lagocephalus lunaris</i>     | 15, 106 | Monogrammed monocle bream     | 14      |
| <i>Lagocephalus spadiceus</i>   | 15, 106 | Moonfish                      | 9       |
| <i>Lagocephalus suezensis</i>   | 15, 106 | Mottled fusilier              | 13      |
| Largebodied silver-biddy        | 11      | Mottled tonguesole            | 10      |
| Largefin croaker                | 14      | <i>Muraenesox bagio</i>       | 6, 24   |
| Largehead hairtail              | 11      | Muzzled blenny                | 8       |
| Largescale flounder             | 10      | <i>Myersina filifer</i>       | 8, 38   |
| Largescale terapon              | 11      |                               |         |
| Largescaled tonguesole          | 10      | <b>N</b>                      |         |
| Largespined flathead            | 13      | Narrowbarred spanish mackerel | 11      |
| Lattice monocle bream           | 14      | <i>Nemipterus furcosus</i>    | 14, 97  |
| Leaf-tail croaker               | 14      | <i>Nemipterus hexodon</i>     | 14, 97  |
| <i>Leiognathus brevirostris</i> | 12, 79  | <i>Nemipterus marginatus</i>  | 14, 97  |
| Leopard coral grouper           | 12      | <i>Nemipterus mesoprion</i>   | 14, 98  |
| <i>Lethrinus lentjan</i>        | 14, 99  | <i>Nemipterus nemurus</i>     | 14, 97  |
| Longarm mullet                  | 8       | <i>Nemipterus tambuloides</i> | 14, 98  |
| Longfin grouper                 | 12      | <i>Neopomacentrus azysron</i> | 8, 40   |
| Longfin silver-biddy            | 11      | <i>Neotrygon kuhlii</i>       | 6, 20   |
| Longfin trevally                | 9       | <i>Neotrygon varidens</i>     | 6, 20   |
| Longhorn cowfish                | 14      | <i>Nibea soldado</i>          | 14, 95  |
| Longnose seahorse               | 10      | <i>Nuchequula gerreoides</i>  | 12, 79  |
| Longrakered trevally            | 9       |                               |         |
| Longsnout stinger               | 13      |                               |         |

**O**

|                                  |         |                                 |        |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|--------|
| Obtuse barracuda                 | 9       | <i>Pegasus latemarius</i>       | 10, 60 |
| Ocellate coralfish               | 12      | <i>Pegasus volitans</i>         | 10, 60 |
| Ocellated eagle ray              | 6       | <i>Pennahia pawak</i>           | 14, 95 |
| Ocellated waspfish               | 13      | <i>Pentapodus setosus</i>       | 14, 98 |
| Ochreband goatfish               | 11      | <i>Pentaprion longimanus</i>    | 11, 72 |
| <i>Omobranchus punctatus</i>     | 8, 44   | Peters' monocle bream           | 14     |
| <i>Opistognathus macrolepis</i>  | 8, 41   | <i>Photopectoralis bindus</i>   | 12, 79 |
| Orangefin ponyfish               | 12      | Pickhandle barracuda            | 9      |
| Orangespotted grouper            | 12      | Pig faced leatherjacket         | 15     |
| Orange-spotted toadfish          | 15      | Pink ear emperor                | 14     |
| Oriental flying gurnard          | 10      | <i>Pisodonophis cancrivorus</i> | 6, 23  |
| Ornate ponyfish                  | 12      | Plaintail firefish              | 13     |
| Ornate threadfin bream           | 14      | <i>Planiliza subviridis</i>     | 8, 43  |
| <i>Osteomugil cunnesius</i>      | 8, 43   | <i>Platax batavianus</i>        | 13, 93 |
| <i>Ostorhinchus cavitensis</i>   | 7, 35   | <i>Platax orbicularis</i>       | 13, 93 |
| <i>Ostorhinchus endekataenia</i> | 7, 34   | <i>Platycephalus indicus</i>    | 13, 90 |
| <i>Ostorhinchus nigrocineta</i>  | 7, 34   | <i>Plectropomus leopardus</i>   | 12, 76 |
| <i>Ostorhinchus pleuron</i>      | 7, 34   | <i>Plectropomus maculatus</i>   | 12, 76 |
| <i>Ostracion cubicus</i>         | 14, 102 | <i>Plotosus canius</i>          | 7, 29  |
| <i>Ostracion rhinorhynchus</i>   | 15, 102 | <i>Plotosus lineatus</i>        | 7, 29  |
| <i>Otolithes ruber</i>           | 14, 95  | <i>Pomadasys maculatus</i>      | 12, 81 |
| Ovate sole                       | 10      | <i>Priacanthus tayenus</i>      | 12, 77 |
| Oxeye scad                       | 9       | Prickly leatherjacket           | 15     |

**P**

|                                       |         |                                   |         |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Painted sweetlips                     | 12      | <i>Priolepis</i> sp.              | 8, 38   |
| Pale-edged stingray                   | 6       | <i>Pseudapocryptes elongates</i>  | 7, 36   |
| Panna croaker                         | 14      | <i>Pseudomonacanthus macrurus</i> | 15, 104 |
| <i>Panna microdon</i>                 | 14, 95  | <i>Pseudorhombus javanicus</i>    | 9, 55   |
| <i>Parachaetodon ocellatus</i>        | 12, 80  | <i>Pterocaesio chrysozona</i>     | 13, 84  |
| <i>Parachaeturichthys polynema</i>    | 8, 38   | <i>Pterois russellii</i>          | 13, 88  |
| <i>Paramonacanthus choirocephalus</i> | 15, 104 | Pugnose ponyfish                  | 12      |
| <i>Parapercis filamentosa</i>         | 11, 70  | Purplespot bigeye                 | 12      |
| <i>Parapercis millepunctata</i>       | 11, 70  | <b>R</b>                          |         |
| <i>Parapercis xanthozona</i>          | 11, 70  | <i>Rachycentron canadum</i>       | 8, 46   |
| <i>Parastromateus niger</i>           | 9, 51   | Rainbow sardine                   | 6       |
| <i>Pardachirus pavoninus</i>          | 10, 58  | <i>Rastrelliger brachysoma</i>    | 11, 68  |
| <i>Parupeneus heptacanthus</i>        | 11, 73  | <i>Rastrelliger kanagurta</i>     | 11, 68  |
| <i>Parupeneus indicus</i>             | 11, 73  | Razorfish                         | 10      |
| Peacock sole                          | 10      | Red cornetfish                    | 10      |
| Pearly monocle bream                  | 14      | Red filament threadfin bream      | 14      |
| Pearly-finned cardinalfish            | 7       | Redbelly yellowtail fusilier      | 13      |
| Pearly-spotted wrasse                 | 11      | Redspine threadfin bream          | 14      |
|                                       |         | Rib-bar cardinalfish              | 7       |
|                                       |         | Ribbontail stingray               | 6       |

|                                    |        |                                  |        |
|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| <i>Rogadius pristiger</i>          | 13, 91 | Slender mudskipper               | 7      |
|                                    |        | Smallscaled terapon              | 11     |
| <b>S</b>                           |        | Smallspotted leatherjacket       | 15     |
| Saddle grunt                       | 12     | Snakefish                        | 7      |
| <i>Samaris cristatus</i>           | 10, 57 | Soldier croaker                  | 14     |
| Sand dragonet                      | 10     | Sole                             | 10     |
| <i>Sardinella albella</i>          | 7, 28  | <i>Solea ovate</i>               | 10, 58 |
| <i>Sardinella gibbosa</i>          | 7, 28  | <i>Sorsogona tuberculata</i>     | 13, 91 |
| <i>Sargocentron rubrum</i>         | 7, 32  | Sphyræna jello                   | 9, 53  |
| <i>Saurida elongate</i>            | 7, 30  | <i>Sphyræna obtusata</i>         | 9, 53  |
| <i>Saurida isarankurai</i>         | 7, 30  | Splendid ponyfish                | 12     |
| <i>Saurida undosquamis</i>         | 7, 30  | Spotless lefteye flounder        | 10     |
| <i>Scatophagus argus</i>           | 13, 86 | Spot-tail shark                  | 6      |
| <i>Scolopsis affinis</i>           | 14, 98 | Spotted coralgrouper             | 12     |
| <i>Scolopsis margaritifer</i>      | 14, 98 | Spotted goby                     | 7      |
| <i>Scolopsis monogramma</i>        | 14, 98 | Spotted green goby               | 8      |
| <i>Scolopsis taeniopterus</i>      | 14, 98 | Spotted sandperch                | 11     |
| <i>Scolopsis vosmeri</i>           | 14, 98 | Spotted scat                     | 13     |
| <i>Scomberoides commersonianus</i> | 9, 51  | Spotted sicklefish               | 13     |
| <i>Scomberomorus commerson</i>     | 11, 68 | Squirrelfishes                   | 7      |
| <i>Scorpaenopsis cf. neglecta</i>  | 13, 89 | Stellate puffer                  | 15     |
| <i>Secutor indicus</i>             | 12, 79 | <i>Stigmatogobius sadanundio</i> | 7, 36  |
| <i>Secutor insidiator</i>          | 12, 79 | <i>Stolephorus dubiosus</i>      | 6, 26  |
| <i>Secutor ruconius</i>            | 12, 79 | <i>Stolephorus indicus</i>       | 6, 26  |
| <i>Selar boops</i>                 | 9, 51  | <i>Stolephorus insularis</i>     | 6, 26  |
| <i>Selar crumenophthalmus</i>      | 9, 51  | Straightstick pipefish           | 10     |
| <i>Selaroides leptolepis</i>       | 9, 51  | Streaked spinefoot               | 13     |
| <i>Seriolina nigrofasciata</i>     | 9, 51  | Striped eel catfish              | 7      |
| Shaggy angler                      | 14     | Striped ponyfish                 | 12     |
| Sharksucker                        | 8      | Strongspine silver-biddy         | 11     |
| Sharpnose stingray                 | 6      | Suez puffer                      | 15     |
| Short mackerel                     | 11     | <i>Suggrundus macracanthus</i>   | 13, 91 |
| Shorthead anchovy                  | 6      | Sulphur goatfish                 | 11     |
| Shortheaded tonguesole             | 10     | <i>Synaptura commersonnii</i>    | 10, 58 |
| Shortjaw saury                     | 7      | <i>Synodus variegatus</i>        | 7, 30  |
| Shortnose ponyfish                 | 12     |                                  |        |
| Shrimp scad                        | 8      | <b>T</b>                         |        |
| <i>Siganus canaliculatus</i>       | 13, 87 | <i>Taeniura lymma</i>            | 6, 20  |
| <i>Siganus javus</i>               | 13, 87 | Taileyed goby                    | 8      |
| <i>Sillago sihama</i>              | 14, 96 | Talang queenfish                 | 9      |
| Silver sillago                     | 14     | <i>Telatrygon zugei</i>          | 6, 20  |
| Silver tripodfish                  | 14     | <i>Terapon jarbua</i>            | 11, 74 |
| Sixbar grouper                     | 12     | <i>Terapon puta</i>              | 11, 74 |
| Slender lizardfish                 | 7      | <i>Terapon theraps</i>           | 11, 74 |



|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Thai anchovy                      | 6       |
| Thorny flathead                   | 13      |
| Threadfin sandperch               | 11      |
| Three-spined frogfish             | 7       |
| <i>Thryssa hamiltonii</i>         | 6, 26   |
| Tigertooth croaker                | 14      |
| Toothpony                         | 12      |
| Torpedo scad                      | 9       |
| <i>Torquigener hypselogeneion</i> | 15, 106 |
| <i>Trachinocephalus myops</i>     | 7, 30   |
| <i>Trachyrhampus longirostris</i> | 10, 62  |
| <i>Triacanthus nieuhofii</i>      | 14, 101 |
| <i>Trichiurus lepturus</i>        | 11, 67  |
| <i>Tripodichthys blochii</i>      | 14, 101 |
| Tropical silverside               | 8       |
| <i>Trypauchen pelaeos</i>         | 8, 36   |
| Tuberculated flathead             | 13      |
| Twospot red snapper               | 12      |

**U**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <i>Ulua mentalis</i>      | 9, 51  |
| Unicorn leatherjacket     | 15     |
| <i>Upeneus sulphureus</i> | 11, 73 |
| <i>Upeneus sundaicus</i>  | 11, 73 |
| <i>Upeneus tragula</i>    | 11, 73 |
| <i>Uraspis uraspis</i>    | 9, 51  |

**V**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Variegated lizardfish | 7 |
|-----------------------|---|

**W**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Whip stingray                 | 6  |
| Whipfin ponyfish              | 12 |
| Whipfin silver-biddy          | 11 |
| White sardine                 | 7  |
| White sardinella              | 7  |
| Whitecheek monocle bream      | 14 |
| Whitefin wolf-herring         | 6  |
| Whiteflag dragonet            | 10 |
| Whiteline cardinalfish        | 7  |
| Whitemouth jack               | 9  |
| Whitespotted spinefoot        | 13 |
| Widemouth largescale flatfish | 9  |
| Wolf cardinalfish             | 7  |

**X**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <i>Xiphasia setifer</i>   | 8, 44  |
| <i>Xiphocheilus typus</i> | 11, 71 |

**Y**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Yellow trunkfish       | 14 |
| Yellowbar sandperch    | 11 |
| Yellowfin scorpionfish | 13 |
| Yellowfined ponyfish   | 12 |
| Yellowstripe scad      | 9  |
| Yellowtail demoiselle  | 8  |
| Yellowtail scad        | 9  |

**Z**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <i>Zebrias quagga</i> | 10, 58 |
|-----------------------|--------|

## ดัชนีรายชื่อไทย

|                       |  |            |                  |  |                |
|-----------------------|--|------------|------------------|--|----------------|
| <b>ก</b>              |  |            |                  |  |                |
| กบ                    |  | 7, 14, 100 | กะรังหัวโขนหูดำ  |  | 13, 88         |
| กระบอกดำ              |  | 8, 43      | กังฮ้อ           |  | 6              |
| กระบอกหางกลม          |  | 8, 43      | กิมซัว           |  | 9              |
| กระบอกหางเขี้ยว       |  | 8, 43      | กูเราแคระ        |  | 7, 31          |
| กระบาง                |  | 6, 19      | กูเราหนวดสี่เส้น |  | 8, 42          |
| กระปี่                |  | 8, 44      | กูแรกล้วย        |  | 6, 28          |
| กระปี่แดง             |  | 13, 85     | เกล็ดเงิน        |  | 7, 28          |
| กระเบนจุมูกโตสีน้ำตาล |  | 6, 20      | เก้าดอกแดง       |  | 11, 76         |
| กระเบนจุดฟ้า          |  | 6, 20      | เก้าหางซ้อน      |  | 12, 76         |
| กระเบนทอง             |  | 6, 20      | แก้วกู่          |  | 11, 71         |
| กระเบนนกจุดขาว        |  | 6, 21      |                  |  |                |
| กระเบนปากแหลม         |  | 6, 20      | <b>ข</b>         |  |                |
| กระเบนแมลงวันจุดขาว   |  | 6, 20      | ข้างตะเภา        |  | 11, 74         |
| กระเบนหางหอย          |  | 6, 20      | ข้างลาย          |  | 11, 74         |
| กระเบนหิน             |  | 6          | ข้างใส           |  | 10, 64         |
| กรัง                  |  | 14         | ข้างเหลือง       |  | 12, 51         |
| กล้วยแดง              |  | 13, 84     | ข้าวเปียก        |  | 14, 98         |
| กล้วยเหลือง           |  | 13, 84     | ข้าวเม่า         |  | 8, 39          |
| กวาง                  |  | 15         | ข้าวเมาน้ำลึก    |  | 7, 32          |
| กะดัก                 |  | 6, 26      | เขือแดง          |  | 8, 36          |
| กะดักควาย             |  | 6, 26      | แข้งไก่          |  | 9              |
| กะดักตัวกลม           |  | 6, 26      |                  |  |                |
| กะดักหัวป้าน          |  | 6, 26      | <b>ค</b>         |  |                |
| กะทิงุด               |  | 12         | คางคก            |  | 7, 33          |
| กะพงข้างแถบ           |  | 13, 83     | โคก              |  | 6, 28          |
| กะพงข้างเหลือง        |  | 13, 83     |                  |  |                |
| กะพงแดง               |  | 13, 83     | <b>ง</b>         |  |                |
| กะพงแดงข้างป้าน       |  | 13, 82     | แงบ้วย           |  | 9              |
| กะพงแดงปานขาว         |  | 12, 82     |                  |  |                |
| กะพงแสม               |  | 12, 81     | <b>จ</b>         |  |                |
| กะพงเหลืองเล็ก        |  | 12, 75     | จวด              |  | 13, 14, 94, 95 |
| กะรังจุดเหลือง        |  | 12         | จวดคอดำ          |  | 13, 94         |
| กะรังดอกน้ำตาล        |  | 12, 76     | จวดเทียน         |  | 14, 95         |
| กะรังท้องกำป็น        |  | 11, 75     | จวดยาว           |  | 14, 95         |
| กะรังลายเสือ          |  | 12, 76     | จวดสามเขี้ยว     |  | 14             |
| กะรังลายหางตัด        |  | 12, 75     | จะละเม็ดดำ       |  | 9, 51          |
| กะรังหกแถบ            |  | 12, 76     | จัมพินจะระเข้    |  | 10, 61, 62     |
| กะรังหัวโขน           |  | 13, 89     | จุ่ม             |  | 8              |
| กะรังหัวโขนยาว        |  | 13, 89     | จู้ยจิน          |  | 9, 49, 50, 51  |
| กะรังหัวโขนหูดำ       |  | 13, 89     | จู้ยจินบั้ง      |  | 9, 51          |

**ฉ**

|                |           |
|----------------|-----------|
| ฉลามกบ         | 6, 16     |
| ฉลามทราย       | 6         |
| ฉลามลายหินอ่อน | 6, 17     |
| ฉลามหูดำ       | 6, 18     |
| โคมงาม         | 8, 48, 49 |

**ช**

|                  |        |
|------------------|--------|
| ช่อนทะเล         | 8, 46  |
| ช้างเหยียบ       | 13, 91 |
| ช้างเหยียบหัวแบน | 13, 90 |
| แซ่หลังสองจุด    | 7, 28  |

**ช**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| ชัวม้อ          | 7      |
| ชีกเดียว        | 10, 58 |
| ชีกเดียวครีบจุด | 9, 54  |
| ไซตอ            | 6      |

**ด**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| ดอกหมาก         | 11, 72 |
| ดอกหมากกระโดง   | 11, 72 |
| ดอกหมากครีบสั้น | 11, 72 |
| ดัก             | 7      |
| ดาบเงิน         | 11, 67 |
| ดาบลาว          | 6, 27  |
| ดุกทะเล         | 7, 29  |

**ด**

|                  |        |
|------------------|--------|
| ตะกรับ           | 13, 86 |
| ตะไกรงขาว        | 9, 49  |
| ตะคองเหลือง      | 9, 50  |
| ตะเพียนน้ำเค็ม   | 6      |
| ตักแตนหินเขี้ยว  | 8, 44  |
| ตักแตนหินปากยื่น | 8, 44  |
| ดาตุ่ม           | 6      |
| ดาโต             | 12     |
| ดาหวาน           | 12, 77 |
| ดาหางนครีบยาว    | 11, 70 |
| ดาหางนแถบเหลือง  | 11, 70 |
| ดาหางนลายจุด     | 11, 70 |
| ตุ๊กกา           | 6      |

**ถ**

|     |    |
|-----|----|
| แถบ | 13 |
|-----|----|

**ท**

|           |            |
|-----------|------------|
| ทราย      | 14         |
| ทรายขาว   | 14, 98     |
| ทรายแดง   | 14, 97, 98 |
| ท้องเทียว | 7, 36      |
| ทู        | 11, 68     |
| ทูแขก     | 9, 50      |
| ทูยาว     | 11         |
| ทูสั้น    | 11         |

**น**

|           |        |
|-----------|--------|
| นกกะลิง   | 14     |
| นกขุนทอง  | 11, 71 |
| นกฮูก     | 10, 65 |
| นาโก      | 7      |
| น้ำดอกไม้ | 9, 53  |

**บ**

|                |           |
|----------------|-----------|
| บู่            | 8, 37     |
| บู่กึ่ง        | 8, 37     |
| บู่กึ่งครีบยาว | 8, 38     |
| บู่จุด         | 7         |
| บู่จุดเขียว    | 8, 38     |
| บู่ทะเล        | 8, 37     |
| บู่ปะการัง     | 8, 38     |
| บู่หางจุด      | 8, 38     |
| ไบขนุน         | 9, 10, 56 |
| ไบปอ           | 13, 92    |
| ไบโพธิ์        | 9, 13     |
| ไบมิดโคน       | 10        |
| ไบไม้          | 10        |

**ป**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| ปักเป้า             | 15, 105 |
| ปักเป้าก้นดำ        | 15, 105 |
| ปักเป้ากล่อง        | 14, 102 |
| ปักเป้ากล่องจมูกยาว | 15, 102 |
| ปักเป้าเขียว        | 15, 106 |
| ปักเป้าลาย          | 15, 106 |
| ปักเป้าลายน้ำตาล    | 15, 106 |
| ปักเป้าหนามทุเรียน  | 15, 107 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| ปักเป้าหลังดำ        | 15, 106 |
| ปากก้าง              | 8, 41   |
| ปากคม                | 7, 30   |
| ปากคมลาย             | 7, 30   |
| ปากคมหางจุด          | 7, 30   |
| ปากคมหูดำ            | 7, 30   |
| ปากคมอิศรางกูร       | 7, 30   |
| ปากแตร               | 10, 63  |
| ปิ่นแก้ว             | 7, 29   |
| แป้น                 | 12, 79  |
| แป้นกระดาน           | 12, 79  |
| แป้นกระโดงยาว        | 12, 78  |
| แป้นกระสวย           | 12, 78  |
| แป้นแก้ว             | 11      |
| แป้นคอดำ             | 12, 79  |
| แป้นจุมูกสั้น        | 12, 79  |
| แป้นแถบ              | 12, 78  |
| แป้นเบี้ย            | 12, 79  |
| แป้นป้อม             | 12      |
| แป้นปากหมู           | 12, 79  |
| แป้นเมือก            | 12, 78  |
| แปบทะเล              | 12, 79  |
| <b>ผ</b>             |         |
| ผมนาง                | 8, 9    |
| ผีเสื้อกลางคืนสั้น   | 10, 60  |
| ผีเสื้อกลางคืนหางยาว | 10, 60  |
| ผีเสื้อครีบสูง       | 12, 80  |
| ผีเสื้อเอวดำ         | 12, 80  |
| <b>ฝ</b>             |         |
| ฝักพริ้ว             | 6       |
| <b>พ</b>             |         |
| พระจันทร์            | 9, 52   |
| พินพาท               | 11      |
| แพะ                  | 11, 73  |
| แพะแดง               | 11, 73  |
| แพะลาย               | 11, 73  |
| แพะหัวโต             | 11, 73  |
| แพะเหลือง            | 11, 73  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>ม</b>         |                   |
| ม่งแช่           | 9                 |
| มโหรี            | 11, 12            |
| มังกร            | 13                |
| มังกรน้อย        | 10, 11, 66        |
| ม้าน้ำสามจุด     | 10, 62            |
| ม้าน้ำหนาม       | 10, 62            |
| แมว              | 6, 26             |
| <b>ย</b>         |                   |
| ยอดจาก           | 6, 24             |
| ยอดม่วง          | 10                |
| ยอดม่วงลาย       | 10, 59            |
| <b>ล</b>         |                   |
| ล่อเหยื่อ        | 14                |
| ลั้ง             | 11, 68            |
| ลิ้นควาย         | 9, 10, 55, 56, 58 |
| ลิ้นควายจุด      | 10, 58            |
| ลิ้นหมา          | 10, 59            |
| ลิ้นหมาลาย       | 10, 58            |
| ลิ้นหมาหางอนยาว  | 10, 57            |
| ลิ้นหมาหางอนสั้น | 10, 56            |
| เล็กฮ้อ          | 6                 |
| <b>ว</b>         |                   |
| วัว              | 15, 103           |
| วัวจุด           | 15, 104           |
| วัวดาบ           | 15, 103           |
| วัวสามขา         | 14, 101           |
| วัวสามขาหางยาว   | 14, 101           |
| วัวหนามดอก       | 15, 104           |
| วัวหน้าหมู       | 15, 104           |
| วัวหางตัด        | 14                |
| วัวหางพัด        | 15, 104           |
| <b>ส</b>         |                   |
| สร้อยนกเขา       | 12, 81            |
| สละ              | 9, 51             |
| สลิดทะเลจุดขาว   | 13, 87            |
| สลิดทะเลแถบ      | 13, 87            |
| สลิดหินหางเหลือง | 8, 40             |
| สากด้า           | 9, 53             |
| สากทุย           | 9                 |

|                    |         |                 |           |
|--------------------|---------|-----------------|-----------|
| สาเกยี่            | 11, 69  | หลังเขียวแถบทอง | 7, 28     |
| สาเกเหลี่ยม        | 9       | หัวขวาน         | 12        |
| สายรุ้ง            | 14, 98  | หัวตะกั่ว       | 8, 45     |
| ลำลิ               | 9, 51   | หางกิ้ง         | 9         |
| สิงโต              | 13, 88  | หางกิ้งหม้อ     | 9, 50     |
| สีกรุด             | 12      | หางแข็ง         | 9, 50     |
| สีกุน              | 9       | หางควาย         | 13, 90    |
| สีกุนแก้มดำ        | 8, 49   | หางเหลี่ยมทอง   | 8         |
| สีกุนข้างลวด       | 9       | หูช้าง          | 13, 93    |
| สีกุนครีบดำ        | 9, 50   | หูช้างกลม       | 13, 93    |
| สีกุนครีบบาว       | 9, 50   | เห็ดโคน         | 14, 96    |
| สีกุนตาพอง         | 9, 51   | เหยื่อแดง       | 13, 84    |
| สีกุนตาวัว         | 9, 51   | เหาฉลาม         | 8, 47     |
| สีกุนบั้ง          | 9, 49   | ไหลง            | 6, 23     |
| สีกุนแป้นจุดเหลือง | 9, 50   | ไหลมอเรีย       | 6, 22     |
| สีกุนรากขาย        | 9, 49   |                 |           |
| สีขน               | 9       | <b>อ</b>        |           |
| สีขนกลม            | 9       | อมไข่           | 7, 34, 35 |
| สีขนเขียว          | 8, 49   | อินทรีบั้ง      | 11, 68    |
| สีขนทอง            | 8, 49   | อีปุดตาโต       | 6, 25     |
| สีเหลี่ยมเขวาว     | 14, 102 | อีปุดยาว        | 6, 25     |
| ไส้ตัน             | 6       | อีฮื้อ          | 6         |
|                    |         | อุรุรุท         | 12, 76    |
| <b>ห</b>           |         | อุบ             | 7         |
| หมวดฤๅษี           | 11      |                 |           |
| หมูสีแก้มแดง       | 14, 99  | <b>ฮ</b>        |           |
| หลังเขียวเกล็ดขาว  | 7, 28   | ไฮโหลย          | 8         |







ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)  
Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan)  
49 ซอยพระราชวริยาภรณ์ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
โทรศัพท์ 0 2816 7634-36 โทรสาร 0 2816 7634