



## รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่อง

ศักยภาพการป้องกันการแตกกระจายของเม็ดดินและการชะล้างพังทลายของป่าเสื่อม  
โทรม ป่าปลูกและสวนไม้ผล เพื่อประเมินมูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารและผลตอบแทน  
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่โครงการอุทยานเกษตรฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Potential of CP-index on soil erosion and fertility erosion protection including  
economic analysis return of the Multi Agricultural Area  
Maejo University

ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย

ประจำปีงบประมาณ 2544-2545

จำนวน 120,780 บาท

ผู้วิจัย

ผศ. ดร. อรทัย มิ่งธิพล

งานวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์

วันที่ 25 เมษายน 2548

### กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากงบประมาณปี 2544 – 2545 โดย  
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ และความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้โอกาสผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัย

กองห้องสมุด  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ก  
สารบัญ

| เรื่อง  |                                                | หน้า |
|---------|------------------------------------------------|------|
|         | สารบัญ                                         | ก    |
|         | สารบัญภาพ                                      | ข    |
|         | สารบัญตาราง                                    | จ    |
|         | บทคัดย่อ                                       | ฉ    |
|         | Abstract                                       | ช    |
| บทที่ 1 | บทนำ                                           | 1    |
|         | วัตถุประสงค์                                   | 1    |
|         | ขอบเขตการศึกษาวิจัย                            | 2    |
|         | สถานที่และ วัน เวลาศึกษาวิจัย                  | 2    |
|         | ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                      | 2    |
| บทที่ 2 | การตรวจเอกสารด้านทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 3    |
| บทที่ 3 | ขั้นตอนการศึกษาวิจัย                           | 11   |
| บทที่ 4 | พื้นที่ศึกษาวิจัย                              | 28   |
| บทที่ 5 | ผลการวิจัย                                     | 42   |
|         | สรุปและข้อเสนอแนะ                              | 63   |
|         | เอกสารอ้างอิง                                  | 67   |
|         | ภาคผนวก                                        | 69   |

**๒**  
**สารบัญภาพ**

| ภาพที่                                                                                                 | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.1 กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย                                                                            | 12   |
| 3.2 ลักษณะการสร้างแปลงศึกษา                                                                            | 15   |
| 3.3 ลักษณะการวางท่อรับน้ำจากแปลงศึกษา                                                                  | 15   |
| 4.1 ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไจ้                                                                              | 28   |
| 4.2 ธรณีสัณฐานแอ่งเชียงใหม่                                                                            | 30   |
| 4.3 ภาพถ่ายดาวเทียม แอ่งเชียงใหม่                                                                      | 30   |
| 4.4 ลักษณะธรณีสัณฐานของลุ่มน้ำเชิงเขา ห้วยไจ้                                                          | 32   |
| 4.5 ลักษณะภูมิประเทศ ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไจ้                                                             | 34   |
| 4.6 ภาพสามมิติ ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไจ้                                                                   | 34   |
| 4.7 ก ตัดขวางแนวเหนือ - ใต้                                                                            | 35   |
| 4.7 ข ตัดขวางแนวตะวันออก - ตะวันตก                                                                     | 35   |
| 4.8 ลักษณะความลาดชันของลุ่มน้ำ                                                                         | 35   |
| 4.9 การใช้ประโยชน์ที่ดินและพืชพรรณในพื้นที่ลุ่มน้ำ                                                     | 36   |
| 4.10 แผนที่ชุดดินของลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไจ้                                                              | 37   |
| 4.11 ลักษณะอากาศประจำถิ่นของลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไจ้                                                      | 41   |
| 5.1 เปรียบเทียบลักษณะของฝน ระหว่าง ปี 2544 - 2545                                                      | 42   |
| 5.2 เปรียบเทียบความเข้มของฝนระหว่าง ปี 2544 - 2545                                                     | 43   |
| 5.3 เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายวัน (accumulative daily rainfall) สะสม                                    | 44   |
| 5.4 เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายวัน (range : daily rainfall)                                              | 44   |
| 5.5 เปรียบเทียบค่าพลังงานของน้ำฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) สะสม        | 45   |
| 5.6 เปรียบเทียบลำดับค่าพลังงานของน้ำฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที (range : $I_{30-max}$ ) | 46   |
| 5.7 เปรียบเทียบพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R-factor) สะสม                                | 47   |
| 5.8 เปรียบเทียบลำดับค่าพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (range: R-factor)                      | 47   |



**ค**  
**สารบัญตาราง**

| ตารางที่ |                                                                                                                                                                                   | หน้า |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.1      | แสดงขนาดแปลงศึกษาการชะล้างพังทลายและการสูญเสียธาตุอาหาร                                                                                                                           | 15   |
| 4.1      | ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มน้ำห้วยไค้                                                                                                                                       | 36   |
| 4.2      | ชุดดินที่ปรากฏในพื้นที่ลุ่มน้ำ                                                                                                                                                    | 37   |
| 4.3      | แสดงลักษณะเนื้อดินและปริมาณธาตุอาหารจากแปลงทดลอง                                                                                                                                  | 39   |
| 4.4      | ลักษณะอากาศ ลุ่มน้ำห้วยไค้ ปี 2542 - 2544                                                                                                                                         | 40   |
| 5.1      | ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนรายวัน(daily rainfall) ต่อปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) จากแปลงปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor)                                        | 48   |
| 5.2      | ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) ต่อปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ในแปลงปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor)  | 49   |
| 5.3      | ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R – factor) ต่อปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ในแปลงปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor)                  | 49   |
| 5.4      | ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนรายวัน (daily rainfall) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ในแปลงปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor)                                       | 50   |
| 5.5      | ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ในแปลงปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor) | 50   |
| 5.6      | ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R – factor) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ในแปลงปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor)                 | 51   |
| 5.7      | ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนรายวัน (daily rainfall) ต่อการเกิดปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ในแปลงศึกษาปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor)                                          | 51   |

## สารบัญภาพ (ต่อ)

|      |                                                                                                                                                                              |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.8  | ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) ต่อการเกิดปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ในแปลงศึกษา ปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor) | 52 |
| 5.9  | ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R – factor) ต่อการเกิดปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ในแปลงศึกษา ปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor)              |    |
| 5.10 | ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนรายวัน (daily rainfall) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ในแปลงศึกษาปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor)                                           | 52 |
| 5.11 | ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ในแปลงศึกษา ปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor)    | 53 |
| 5.12 | ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R – factor) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ในแปลงศึกษาปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor)                     | 53 |
| 5.13 | ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ต่อปริมาณการพัดพาตะกอน (sediment) จากแปลง K-factor และแปลง C-factor ของปี 2544                                            | 54 |
| 5.14 | ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ต่อปริมาณการพัดพาตะกอน (sediment) จากแปลง K-factor และแปลง C-factor ของปี 2545                                            | 55 |
| 5.15 | ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดินต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าเบญจพรรณ                                                                        | 55 |
| 5.16 | ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน ต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าเต็งรังแควะ                                                                    | 56 |
| 5.17 | ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน ต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าเต็งรังรุ่นสอง                                                                 | 56 |
| 5.18 | ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน ต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าปลูก                                                                           | 56 |
| 5.19 | ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน ต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองสวนมะม่วง                                                                         | 57 |

## สารบัญภาพ (ต่อ)

|      |                                                                                |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.20 | ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่า<br>เบญจพรรณ         | 57 |
| 5.21 | ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่า เต็ง<br>รังแคระ     | 58 |
| 5.22 | ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าเต็ง<br>รัง รุ่ง สอง | 58 |
| 5.23 | ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าปลูก                 | 59 |
| 5.24 | ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองสวน<br>มะม่วง           | 59 |
| 5.25 | ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงศึกษาป่าเต็งรัง<br>รุ่งสอง   | 59 |
| 5.26 | ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงศึกษาป่าปลูก                 | 60 |
| 5.27 | ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงศึกษาสวน<br>มะม่วง           | 60 |



ศักยภาพการป้องกันการแตกกระจายของเม็ดดินและการชะล้างพังทลายของป่าเสื่อมโทรม ป่าปลูกและ  
สวนไม้ผล เพื่อประเมินมูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของพื้นที่โครงการ  
อุทยานเกษตรและฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Potential of CP-index on soil erosion and fertility erosion protection including economic  
analysis return of the Multi Agricultural Area  
Maejo University

ผศ. ดร. อรทัย มิ่งธิพล

ภาควิชาภูมิทัศน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
คณะผลิตกรรมการเกษตร  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290

บทคัดย่อ

พื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กที่มีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งต้นน้ำ  
ลำธารที่หล่อเลี้ยงชุมชนในพื้นที่เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรม เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่  
หลากหลายในพื้นที่ลุ่มน้ำ จึงเกิดปัญหาการสูญเสียหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินจากการชะล้าง  
พังทลายที่แตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษาการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียธาตุอาหารตาม  
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจจึงถูกวิจัยขึ้น เพื่อค้นหาเหตุผลภายใต้ความ  
แตกต่างกันกล่าว และนำไปสู่แนวทางการป้องกันการสูญเสียหน้าดินและธาตุอาหารในดินจากการชะ  
ล้างพังทลาย

การศึกษาวิจัย ดำเนินการตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2544 ถึงเดือน กันยายน ปี พ.ศ.  
2546 โดยกำหนดพื้นที่หลายแหล่งที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันเป็นพื้นที่ เป็นพื้นที่ศึกษา  
ได้แก่ พื้นที่ป่าเบญจพรรณ พื้นที่ป่าเต็งรังแควะ พื้นที่ ป่าเต็งรังรุ่นสอง พื้นที่ป่าปลูก และพื้นที่สวน  
มะม่วง ข้อมูลได้จากแปลงทดลองขนาด 4x20 เมตร จำนวน 2 แปลง และแปลงขนาด 2x4 เมตร จำนวน  
1 แปลง ในทุกพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อเก็บปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินและปริมาณตะกอน ไปวิเคราะห์หา  
ปริมาณการสูญเสียหน้าดินและธาตุอาหาร

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณน้ำฝนรายวัน (daily rainfall) มีผลทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดิน  
ได้สูงในทุกพื้นที่ศึกษา แต่ปริมาณน้ำฝนรายวัน (daily rainfall) ไม่มีผลต่อการเกิดตะกอนในพื้นที่ ใน  
ขณะเดียวกันค่าพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) กลับมีผลต่อการเกิด  
การพัดพาตะกอนออกจากพื้นที่ศึกษา เมื่อศึกษาอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ศึกษาทั้ง 5  
พื้นที่ พบว่า พื้นที่ป่าเบญจพรรณมีอัตราการชะล้างพังทลายสูงสุด รองลงมาได้แก่พื้นที่ป่าเต็งรังรุ่นสอง

พื้นที่ป่าเต็งรังแควะ พื้นที่ป่าปลูก และสวนมะม่วง คิดเป็น 3.147, 2.537, 1.647, 1.184 และ 0.328 ตันต่อไร่ต่อปี ตามลำดับ และพื้นที่ศึกษาที่มีอัตราการสูญเสียธาตุอาหารออกจากพื้นที่ต่ำสุด ได้แก่ พื้นที่สวนมะม่วง คิดเป็น การสูญเสียธาตุอาหารไนโตรเจน (N) 0.425, ฟอสฟอรัส (P) 0.094, โพแทสเซียม (K) 0.157, แคลเซียม (Ca) 0.464, และแมกนีเซียม (Mg) 0.025 กิโลกรัมต่อปี, ส่วนพื้นที่ที่มีการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารสูงสุด ได้แก่ พื้นที่ป่าเบญจพรรณ คิดเป็น การสูญเสียธาตุอาหารไนโตรเจน (N) 6.757, ฟอสฟอรัส (P) 0.2265, โพแทสเซียม (K) 0.8119, แคลเซียม (Ca) 0.8418, และแมกนีเซียม (Mg) 0.597 กิโลกรัมต่อปี

ผลการศึกษาอัตราการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียธาตุอาหารในพื้นที่ ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไจ้ สรุปได้ว่า พื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไจ้มีอัตราการชะล้างพังทลายของดินโดยรวมประมาณ 645.45 ตันต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ พื้นที่ที่มีอัตราการชะล้างพังทลายของดินสูงสุด ได้แก่ พื้นที่ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ เนื่องจากระดับความลาดชันที่มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพื้นที่ที่มีอัตราการชะล้างพังทลายต่ำสุด ได้แก่ พื้นที่สวนไม้ผลและป่าเบญจพรรณ เนื่องจากระดับความลาดชันที่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อศึกษาอัตราการสูญเสียธาตุอาหาร สรุปได้ว่า พื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไจ้มีอัตราการสูญเสียธาตุอาหาร คิดเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่สูญเสียไปประมาณ 31,770 บาทต่อปี



## Abstract

Huai Jo Low-Hill Watershed is one of several small watersheds that locate on San Sai Mountain Range surrounding Chiangmai Basin. The low-hill watershed at Huai Jo is rather small but it is the very important source of upstream for local consumption and farming. Various land uses on low-hill watershed result in soil surface erosion, nutrient is absent from land surfaces, violent runoff and the trees are deficiently absorbing water.

The study was conducted during June 2001 to September 2003 in five locations of different forest types and cropping, namely; mixed deciduous forest, dry dipterocarp forest, secondary dry dipterocarp forest, planted forest and mango orchard. In each forest type, 2 plots of 4 x 20 m and one plot of 2 x 4 m was set-up in order to study the volume of runoff and sediment for data analysis on rainfall factor that causes soil surface erosion.

It was found that high runoff on each site was related to daily rainfall but daily rainfall did not produce runoff sediment. However, the consecutive 30 minutes maximum rainfall intensity ( $I_{30-max}$ ) created soil erosion. In the findings of 5 locations indicated that mixed deciduous forest had the highest on-site erosion rate, followed by secondary dry dipterocarp forest, primary dry dipterocarp forest, planted forest and mango orchard at 3.147, 2.537, 1.647, 1.184 and 0.328 ton per rai per year respectively. Low nutrient losses were found in mango orchard namely: Nitrogen(N) at 0.425, Phosphorus(P) at 0.094, Potassium(K) at 0.157, Calcium(Ca) at 0.464 and Magnesium(Mg) at 0.025 kg/year. High nutrient losses were found in mixed deciduous forest namely; Nitrogen(N) at 6.757, Phosphorus(P) at 0.2265, Potassium(K) at 0.8119, Calcium(Ca) at 0.8418 and Magnesium(Mg) at 0.597 kg/year.

In conclusion, Huai Jo low-hill watershed erodes soil surface about 645.45 tons per year, which is considerably high but acceptable. High erosion rate is recorded in dry dipterocarp forest and mixed deciduous forest due to the slope level is higher than 35 percents. On the other hand, low erosion rate occurs in mango orchard and mixed deciduous forest due to the degree of slope is lower than 5 percents. Finally, the nutrient loss study can be summarized that nutrient losses of Huai Jo Low-Hill Watershed is the cost in term of economic value about 31,770 baht year.

## บทที่ 1. ความนำ

### 1.1 หลักการและเหตุผล

ห้วยไฉ้เป็นลุ่มน้ำเชิงเขาขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่บริเวณของภูเขาส่วนนอกของแนวภูเขาสูงของเทือกเขาขุนตาล ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของแอ่งสะสมตะกอนเชิงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 17.58 ตารางกิโลเมตร ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสันทราย ภายใต้โครงการอนุรักษ์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ป่าบ้านโปง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้อนุรักษ์ป่าบ้านโปงเป็นป่าต้นน้ำลำธารของห้วยไฉ้ โดยมีพระราชกระแสรับสั่งต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2521 ให้หาเส้นทางอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยไฉ้และพื้นที่ป่าใกล้เคียง ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง จัดการส่งเสริมอาชีพและการบริการให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูก และให้ความรู้แก่ราษฎรให้รู้คุณค่าทรัพยากรป่าไม้ จากพระราชกระแสดังกล่าวจึงเกิดโครงการสนองแนวพระราชดำริ โดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้ ได้มอบพื้นที่ป่าบริเวณใต้อ่างเก็บน้ำห้วยไฉ้ เนื้อที่ 3,686 ไร่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเนื้อที่ 907 ไร่ และพื้นที่ป่าธรรมชาติเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยไฉ้ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาวิจัยทางนิเวศวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาวิจัยทางธรรมชาติอย่างแท้จริง และมีเงื่อนไขให้การศึกษาวิจัยไม่รบกวนสภาพธรรมชาติหรือมีการรบกวนน้อยที่สุด เนื่องจากพื้นที่ป่าที่ปกคลุมลุ่มน้ำห้วยไฉ้ส่วนใหญ่คือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณบริเวณแอ่งที่ราบระหว่างหุบเขา โดยป่าทั้งสองประเภทต่างก็มีบทบาทสำคัญในการเก็บกักและชลอความเร็วของน้ำ การป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ตลอดจนความสำคัญทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวบ้านโปง ขณะที่พื้นที่ 907 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกมาก่อน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาด้วยวิทยาการการเกษตรแผนใหม่ ขณะที่พื้นที่ป่าบางส่วนให้มีการฟื้นฟูด้วยธรรมชาติของมันเอง ดังนั้นการศึกษาศักยภาพการป้องกันการแตกกระจายของเม็ดดินและชะล้างพังทลายของป่าปลูกและสวนไม้ผล เป็นการศึกษาเพื่อนำผลการวิจัยมาสร้างแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของลุ่มน้ำเชิงเขาภาคเหนือต่อไป

### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพในการป้องกันการชะล้างพังทลายและการพัดพาตะกอนของป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ ป่าปลูกและสวนผลไม้ในพื้นที่โครงการอุทยานเกษตรและฟาร์มมหาวิทยาลัย



1.2.2 เพื่อศึกษาปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารที่เกิดขึ้นพร้อมกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และนำข้อมูลดังกล่าวมาประเมินความสูญเสียและผลตอบแทนในรูปมูลค่าจริงทางเศรษฐกิจ

1.2.3 เพื่อนำผลการศึกษาทั้งหมดมาสร้างโมเดลที่เหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้และกลุ่มน้ำใกล้เคียง โดยพิจารณาที่ความสามารถในการลงทุนและความคุ้มค่าของหน่วยงานท้องถิ่นและเกษตรกรท้องถิ่นเป็นหลัก

### 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

โครงการวางขอบเขตการศึกษาวิจัยครอบคลุมดังนี้

1.3.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่ วางขอบเขตการศึกษาครอบคลุมพื้นที่กลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้เนื้อที่ 17.58 ตารางกิโลเมตร ทั้งพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำและใต้อ่างเก็บน้ำห้วยไฉ้ รวมทั้งพื้นที่ป่าเต็งรังรุ่นสองในเขต 907 ไร่ จำแนกป่าไม้ออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะโครงสร้างทางนิเวศ

1.3.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหา

- 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชะล้างพังทลายด้านภูมิกายภาพ น้ำฝน คุณสมบัติของดิน ชนิดพืชพรรณที่ปกคลุม และมาตรการอนุรักษ์
- 2) อัตราการชะล้างพังทลาย
- 3) ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหาร
- 4) มูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปริมาณการสูญเสียธาตุอาหาร

### 1.4 วัน เวลา และสถานที่ศึกษาวิจัย

กลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 17.58 ตารางกิโลเมตร ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร การศึกษาวิจัยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2543 – เดือนเมษายน 2545 และการวิเคราะห์และผลิตรายงาน 2 ปี รวมระยะเวลาการทำงาน 4 ปี

### 1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการวิจัยที่ได้ สามารถบ่งชี้ให้ทราบถึงคุณค่าของป่าด้านการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการจัดการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำหรับพื้นที่กลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้และกลุ่มน้ำเชิงเขาภาคเหนือใกล้เคียงต่อไป

## บทที่ 2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การชะล้างพังทลายของดินนั้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่จะต้องอธิบายควบคู่ไปกับการกระบวนการเกิดน้ำป่าหน้าดิน เริ่มจากการที่น้ำฝนตกลงมาและเป็นปัจจัยแรกที่ทำให้ดินพังทลาย และเป็นตัวการพัดพาให้ตะกอนเคลื่อนที่ไป ตะกอนเหล่านั้นประกอบดิน และธาตุอาหารอินทรีย์วัตถุ การพังทลายของดินเป็นเหตุให้เกิดการตกตะกอนในลำน้ำ เมื่อมีตะกอนมากขึ้นก็ทำให้ระดับน้ำในลำธารสูงขึ้น เกิดน้ำป่าทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นสาเหตุให้เกิดการพังทลายของดินเป็นทอด ๆ สิ่งที่ถูกพัดพาเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นในลำน้ำ ที่ราบลุ่มและพื้นที่สุดท้ายคือปากแม่น้ำ ดังนั้นการศึกษาในเรื่องการพังทลายของดินและตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ ซึ่งต้องมีวิธีการศึกษาเฉพาะและต้องมีการสร้างอุปกรณ์การศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

### 2.1 กระบวนการชะล้างพังทลาย

การชะล้างพังทลายของดินหมายถึง กระบวนการทำลายและเคลื่อนย้ายอนุภาคดินและหินด้วยการกระทำของน้ำ ลมและแรงโน้มถ่วงของโลก (Satterlund, 1972) ตามธรรมชาติ ผืนดินมักจะปรับตัวให้อยู่สภาพสมดุลเสมอ ดังนั้นการพังทลายของดินมีปรากฏให้เห็นเสมอในธรรมชาติ แม้แต่ในสภาพพื้นที่ที่มีพืชปกคลุมอย่างสมบูรณ์ ขณะเดียวกัน การรบกวนผืนดิน ต้นไม้หรือพืชคลุมดิน ก็เป็นสาเหตุให้เกิดการพังทลายของดิน จากเหตุผลเช่นนี้จึงมีการแบ่งการพังทลายของดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่ออัตราการชะล้างพังทลายของดิน เมื่อพิจารณาตามกระบวนการที่กล่าวมาโดยละเอียดที่ผ่านมา สามารถสรุปดังนี้

#### 2.2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการชะล้างและการพัดพาดินตะกอน

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพังทลายของดินและเกิดตะกอนในลุ่มน้ำใดก็ตามจะประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศ สภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิประเทศ ดินและสมรรถนะการพังทลายของดิน สภาพพืชพรรณ และกิจกรรมของมนุษย์

1) อิทธิพลจากปัจจัยน้ำฝน Wischmeier and Smith (1958) กล่าวว่าฝนเป็นตัวการสำคัญอย่างยิ่งต่อการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากการชะล้างพังทลายของดินจะมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลน์ของฝนที่มีความเข้มสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที (maximum 30 minute rainfall intensity) มากที่สุด พลังงานจลน์ของฝนพิจารณาจากความเร็วของเม็ดฝนและ



ปริมาณฝนที่ตก Satterlund (1972) สนับสนุนว่า ถ้าค่าความหนักเบาของฝนที่ 30 นาทีสูงสุดมีค่าน้อยมาก การพังทลายของดินจะไม่เกิดขึ้น และอัตราการพังทลายของดินมีค่าเกือบเป็นศูนย์

Wischmeier และคณะ (1958) ศึกษาพบว่าการสูญเสียดินที่เกิดขึ้นในระหว่างพายุฝนแต่ละครั้งนั้นไม่มีสหสัมพันธ์กับปริมาณน้ำฝน หรือปริมาณสูงสุดในระยะเวลาที่ฝนตกต่างๆ แต่การสูญเสียดินมีสหสัมพันธ์กับพลังงานโมเมนตัมของฝนแต่ที่ดีที่สุดคือพลังงานจลน์ของฝนมีสหสัมพันธ์กับการสูญเสียดิน อย่างไรก็ตามยังมีความแปรปรวนอีกมากที่ไม่สามารถอธิบายได้จากสหสัมพันธ์ดังกล่าว หลังจากได้ใช้หลักของสมการการถดถอย (multiple regression) มาช่วยในการทดสอบ โดยนำเอาปัจจัยต่างๆ มารวมกัน และผลที่สุดพบว่ามาตรการที่ให้ประเมินการสูญเสียดินที่ดีที่สุดคือมาตรการที่เกิดจากการผสมผสานกันหลายปัจจัย (compound parameter) ได้แก่ ผลคูณระหว่างพลังงานของฝนกับความแรงของฝนในระยะฝนตก 30 นาที ซึ่งหมายถึงความแรงของฝนเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ในขณะที่มีพายุฝนเกิดขึ้น และพบว่าปริมาณการสูญเสียดินมีสหสัมพันธ์ดีที่สุดกับผลคูณระหว่างพลังงานจลน์ของฝนกับความแรงสูงสุดของฝนในช่วงเวลา 30 นาที

2) อิทธิพลของน้ำไหลบ่าหน้าดิน Killinc and Richardson (1973) สรุปผลการทดลองว่า น้ำไหลบ่าหน้าดินมากกว่า 1 นิ้วหรือ 25.4 มิลลิเมตรขึ้นไปจะสามารถพัดพาปริมาณตะกอนมากขึ้นจากปกติถึง 4 เท่า

3) อิทธิพลของเปอร์เซ็นต์ความลาดชัน ลักษณะภูมิประเทศที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการชะล้างพังทลายของดินคือ ความลาดชันของพื้นที่ Zingg (1940) เป็นบุคคลแรกที่ทำการศึกษาความลาดชันต่อการชะล้างพังทลายของดิน พบว่าในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ดินจะพังทลายเพิ่มเป็นสองเท่าของเปอร์เซ็นต์ความลาดชันน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความลาดชันมีอิทธิพลต่อความสามารถในการเคลื่อนย้ายตะกอนโดยน้ำไหลบ่าหน้าดิน

ตะกอนที่ถูกพัดพาจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการเคลื่อนที่ของน้ำไหลบ่าหน้าดินในที่ลาดชันมากกว่าในที่ราบ จากการศึกษาของ Einstien, (1968) และ Foster และ Meyer (1972) สรุปได้ว่า เมื่อพื้นที่มีความลาดชันมากขึ้น ความสามารถในการเคลื่อนย้ายพัดพาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราการพังทลายของดินขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างปริมาณตะกอนที่ถูกเคลื่อนย้ายและความสามารถในการพัดพาของน้ำ

4) อิทธิพลของความยาวของความลาดชัน Zingg (1940) และ Wischmeier และ Smith (1965) รายงานว่า ความยาวของความลาดชันมีอิทธิพลอย่างมากต่อ

การชะล้างพังทลายของดิน ปริมาณดินที่สูญเสียไปจากพื้นที่แปรผันโดยตรงกับกำลัง  $n$  ของความยาวของความลาดชัน ค่า  $n$  เปลี่ยนแปลงจาก 0 ถึง 0.9 ซึ่งขึ้นกับสภาพความแตกต่างของดินและสัดส่วนของการพังทลายของดินในร่องริ้วและระหว่างร่องริ้วเช่นเดียวกับการศึกษาของ Young และ Mutchler (1969) และ Foster และ Meyer (1972 และ 1975) ในเวลาต่อมา

5) **อิทธิพลจากสมบัติของดิน** ภายใต้สภาพการเคลื่อนที่ของน้ำ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสภาพพืชพรรณที่เหมือนกัน ความแตกต่างของดินแต่ละชนิดมีอิทธิพลอย่างมากต่อความยากง่ายในการชะล้างพังทลายและสูญเสียดิน ปัจจัยหลักของดินที่มีอิทธิพลต่อการพังทลาย คือ ลักษณะของเนื้อดิน โครงสร้าง ความหนาแน่นของดิน และความสามารถในการซึมน้ำของดิน โดยปกติในที่มีความลาดชัน ดินเนื้อปานกลางจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่ายกว่าดินทราย (Kilinc และ Chardson, 1973)

Middleton (1930) กำหนดดัชนีแสดงความยากง่ายต่อการพังทลายของดิน โดยใช้ค่าอัตราส่วนการแตกกระจายของดิน (soil dispersion ratio) และค่าอัตราส่วนการพังทลายของดิน (soil erosion ratio) ซึ่งค่าอัตราส่วนทั้งสองนี้เป็นค่าที่แสดงถึงการพังทลายและการแตกกระจายของดิน คือ ถ้าค่าอัตราส่วนการแตกกระจายของดินมากกว่า 10 และค่าอัตราส่วนการพังทลายของดินมากกว่า 15 แสดงว่าดินนั้นพังทลายง่าย ถ้าน้อยกว่านี้ แสดงว่าดินนั้นพังทลายยาก หน่วยอนุรักษ์ดินของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA Soil Conservation Service) ได้กำหนดค่าสมรรถนะการพังทลายของดิน (soil erodibility factor,  $K$ ) ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากแปลงทดลอง โดยกำหนดให้เป็นค่าที่แสดงอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่ทำให้ดินเกิดการพังทลายของดิน อันเนื่องมาจากพลังน้ำฝนและน้ำไหลบ่าหน้าดิน (Wischmeier และคณะ, 1958) ค่า  $K$  นี้ เป็นค่าๆ หนึ่งในสมการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation) ซึ่งใช้ในการประมาณค่าการสูญเสียดินจากพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและกำหนดแนวทางในการควบคุมการพังทลายของดิน

อิทธิพลของพืชคลุมดินและการจัดการพืชพรรณ พืชและสิ่งปกคลุมดินเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากสามารถป้องกันและลดแรงกระแทกของเม็ดฝน ชะลอการไหลของน้ำไหลบ่าหน้าดิน ซึ่งเป็นการลดแรงกระทำที่เป็นสาเหตุของการชะล้างพังทลายของดิน อนึ่ง สารเชื่อมที่เกิดจากการย่อยสลายใบไม้และสิ่งปกคลุมดิน ทำให้ดินจับกันเป็นก้อนดีขึ้นและเพิ่มปริมาณช่องว่างในดิน มีผลทำให้น้ำมีโอกาสไหลซึมลงสู่ชั้นดินที่ลึกลงไปได้มากขึ้น ตลอดจนช่วยทำให้กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในดินมีมากขึ้น



Schulz (1981) ให้คำนิยามของ C-factor ไว้ว่า เป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณดินที่สูญเสียจากพื้นที่ที่มีการปกคลุมพืชพรรณและสิ่งคลุมดินต่างๆ กับปริมาณดินที่สูญเสียจากพื้นที่ปราศจากพืชหรือสิ่งคลุมดิน และมีการไถพรวนดินเป็นแนวตลอดตามแนวความลาดชัน ในเมื่อพื้นที่นั้นมีระดับของความลาดชันและความยาวของความลาดชันอันเดียวกันเช่นเดียวกับ Schwab และคณะ (1966) , Morgan (1981) และนิพนธ์ (2527) สรุปบทบาทของพืชที่มีต่อการควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน คือพืชคลุมดินช่วยรองรับเม็ดฝนที่ตกลงมาเป็นการลดพลังงานที่เม็ดฝนกระทบหน้าดินโดยตรงและส่วนต่างๆ ของพืชที่ช่วยเพิ่มการซึมซับน้ำ (infiltration) ลดการไหลบ่าหน้าดิน เพิ่มการสูญเสียน้ำในดินโดยการคายน้ำ เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน และช่วยลดอัตราความเร็วของการไหลบ่าหน้าดิน

Wischmeier (1975) ได้จำแนกอิทธิพลของพืชพรรณ และสิ่งคลุมดินในการป้องกันการพังทลายของดิน ออกเป็น 3 ส่วนคือ อิทธิพลจากส่วนของเรือนยอดต้นไม้ อิทธิพลจากสิ่งคลุมดินหรือพืชชั้นล่าง และอิทธิพลจากการเพาะปลูกหรือเศษเหลือจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ค่าอิทธิพลต่างๆ ดังกล่าวรวมกันจะคิดเป็นค่าประสิทธิภาพการควบคุมการพังทลายของดินโดยพืชคลุมดิน (crop management factor) หรือ C-factors ในสมการการสูญเสียดินสากล ซึ่งใช้สำหรับประเมินปริมาณการสูญเสียดินจากพื้นที่ใดๆ ได้

ค่าปัจจัย C จากงานวิจัยในอดีต Wischmeier (1975) กล่าวว่า ในสภาพป่าสมบูรณ์จะมีการคลุมดินของเรือนยอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ การสูญเสียตามธรรมชาติก็จะมีน้อยมาก จึงได้กำหนดค่า C ของป่าไม้เท่ากับ 0.001 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศไทยโดยคณะวนศาสตร์ ที่ทำการศึกษาดทดลองหาค่า C ของป่าชนิดต่างๆ สำหรับป่าดิบเขาที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือของประเทศไทยนั้น การประเมินค่า C-factor ที่จะใช้ในสมการจากแปลงทดลองขนาดเล็ก (4x20 เมตร) บนพื้นที่ความลาดเทประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ และเนื้อดินประเภท sandy clay loam เช่นเดียวกันกับ ฤวิธ (2528) ได้ศึกษาค่า C ในสมการการสูญเสียดินสากล สำหรับป่าดิบเขาที่มีเปอร์เซ็นต์เรือนยอดปกคลุมในระดับต่างๆ กันในจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่า ในป่าดิบเขาธรรมชาติมีค่า C เท่ากับ 0.0009 และในป่าดิบเขาที่มีเรือนยอดปกคลุมประมาณ 20-30, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, และ 80-90 เปอร์เซ็นต์ มีค่า C เท่ากับ 0.0007, 0.0010, 0.0012, 0.0014, 0.0011 และ 0.0013 ตามลำดับ ซึ่งค่าดังกล่าวไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการปกคลุมของเรือนยอดต้นไม้ แล้วปล่อยให้พื้นดินฟื้นคืนสภาพตามธรรมชาติก็ได้ค่าแตกต่างกัน เช่นเดียวกันจึงสรุปว่า เรือนยอดต้นไม้ป่าดิบเขาไม่มีบทบาทต่อค่า C-factor มากนัก วรรณ (2528) ตรวจสอบประเมินค่า C-factor ของปอแก้วไทยต้นเขียว โดย



อาศัยสมการการสูญเสียดินสากลเป็นรายพายุฝน แล้วรวมเฉลี่ยเป็นรายปี มีค่า 0.31 ในขณะที่ สุรจิตต์ และคณะ (2525) คำนวณค่า C-factor ของข้าวไร่ โดยเก็บเศษพืชออกจากแปลง และทิ้งเศษไว้ในแปลง เท่ากับ 0.8, 0.62 และการปลูกข้าวไร่อย่างเดียวเท่ากับ 0.68 แต่ วาสุเทพ และคณะ (2530) ศึกษาในจังหวัดลำปาง ได้ค่า C-factor ของข้าวไร่ตามด้วยข้าวไร่ ทั้งเก็บออกนอกแปลง และทิ้งเศษพืชไว้ในแปลง ประมาณ 0.83, 0.42 ตามลำดับ แต่ถ้าปลูกข้าวไร่ตามด้วยถั่วเขียวจะได้ค่า C-factor เท่ากับ 0.72, 0.48 ตามลำดับ แต่เมื่อนำไปทำการศึกษาลักษณะเดียวกัน ในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าได้ค่า C-factor เท่ากับ 0.76, 0.53, 0.64 และ 0.51 ตามลำดับ

อิทธิพลจากปัจจัยที่เกิดจากมาตรการอนุรักษ์ทั้งแบบวิธีกลและการปลูกพืช เพื่อควบคุมการพังทลายของดิน

Wischmeier (1978) รายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยการปฏิบัติการควบคุมการพังทลายของดินว่า สัดส่วนระหว่างปริมาณการสูญเสียดินจากแปลงทดลองในสภาพพื้นที่ซึ่งทำการไถพรวนขึ้นลงตามความลาดชันนั้น มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าสมบัติอย่างอื่นในแปลงทดลอง เช่น ระบบการปรับปรุงบำรุงดิน การทิ้งเศษซากพืชเหลือไว้ในแปลงซึ่งจะมีส่วนช่วยในการควบคุมการสูญเสียดินก็ตาม นิพนธ์ (2527) แบ่งค่า P แบ่งออกเป็น 4 ระบบ คือ การทำการเกษตรกรรมตามแนวระดับ ควบคุมแนวการปลูกพืชและปรับพื้นที่ยกคันเป็นแนว การปลูกพืชสลับตามแนวระดับ และการทำคันดิน

Wischmeire และ Smith (1978) กล่าวว่า ดินป่าไม้ที่ปกคลุมด้วยปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง ค่าอิทธิพลมาตรการที่ใช้ในการอนุรักษ์ดิน มีค่า 0.7 และ Arnoldus (1976) รายงานว่าพื้นที่ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ใดๆ ในทุกระดับความลาดชันนั้นมีค่า P เท่ากับ 1

สำหรับในประเทศไทย ค่านี้อย่างไม่มีมาตรฐานแน่นอน และการปฏิบัติกับกิจกรรมการใช้ที่ดินโดยมีวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำนั้นน้อยมากจนไม่สามารถแสดงขอบเขตได้ การทดลองในภาคสนามเพื่อหาค่า P-factor โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว และทำการรวบรวมโดยมนู (2529) ที่มีการนำเอาค่า P ของนักอนุรักษ์ดินและน้ำต่างประเทศและในประเทศมาใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะพื้นที่

## 2.2 สภาพการพังทลายของดินที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรม

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยและเทคนิควิชาการหลายๆสาขา และเป็นที่แน่นอนว่านักอนุรักษ์ดินจะต้องมีส่วนร่วม ภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือการอนุรักษ์

ทรัพยากรดินให้คงไว้ซึ่งผลผลิตยาวนาน การจำแนกพื้นที่เกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน (2526) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และประเมินการชะล้างพังทลายของดินในแต่ละระบบดังต่อไปนี้

1) ความประณีตในการทำการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการ ชนิดพืชและผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ โดยสามารถจำแนกได้ 2 ชนิด

: การเกษตรแบบประณีต (intensive agriculture) การทำการเกษตรแบบนี้เป็นการใช้พื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตามสภาพพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลผลิตมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ภายใต้การลงทุนสูงเช่นกัน กิจกรรมจะไม่เอื้ออำนวยให้เกิดปัจจัยการพังทลายของดินมากนัก เพราะปัจจัยการจัดการดินและคลุมดินของพืชดี

: การเกษตรแบบหยาบ (Extensive agriculture) พื้นที่การเกษตรแบบนี้มักจะปลูกพืชไร่ที่ลงทุนต่ำและการบำรุงรักษาก็ต่ำ ขณะเดียวกัน ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ก็ต่ำเช่นกัน และมักเกิดปัญหาการสูญเสียดินสูงมาก

2) ความแน่นอนในการใช้พื้นที่ จำแนกได้ 3 ประเภท

: การเกษตรกรรมถาวร (Permanent cultivation) เป็นการใช้พื้นที่มากกว่า 70 ปีขึ้นไป ปัญหาการพังทลายจากการใช้พื้นที่น้อยมาก เนื่องจากการใช้ประโยชน์มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพตามการพัฒนาการใช้

: การเกษตรกรรมกึ่งถาวร (Semi-permanent cultivation) เป็นการใช้ที่ดินในช่วงต่อเนื่องตั้งแต่ 30 - 70 ปี

: การเกษตรกรรมแบบไร่เลื่อนลอย (Shifting cultivation) คือพื้นที่เกษตรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง 30 ปี การเกษตรในระบบนี้ก่อให้เกิดปัญหาการพังทลายของดินมาก และไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ

## 2.3 การสูญเสียธาตุอาหารในดิน

การสูญเสียธาตุอาหารในดินโดยกระบวนการชะล้างหน้าดินนั้น Hudson (1971) เรียกว่าการชะล้างความอุดมสมบูรณ์ (Fertility erosion) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้จากจำนวนหรือปริมาณผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวพืช ปริมาณธาตุอาหารจะถูกพัดพาไปในสภาพสารละลายและ/หรือสารแขวนลอย จากการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินพบว่าในแปลงทุ่งหญ้าที่ไม่มีการพังทลายของดินจะมีไนโตรเจน 38 เท่าและอินทรีย์วัตถุ 2 เท่า ของแปลงที่มีการพังทลาย โดย Roose (1977) กล่าวว่าสภาพดินในเขตร้อน (tropical soil) ปริมาณธาตุอาหารในดินมีสูงใน



ระดับความลึกประมาณ 20 เซนติเมตร โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งมีการสูญเสียธาตุอาหารรุนแรง หลังจากป่าไม้ถูกเปิดออก ยิ่งไปกว่านั้น Willrich และ Smith (1970) พบว่าการสูญเสียไนโตรเจน ในรูปของ  $\text{NH}_4 - \text{NO}_2$  และ  $\text{NO}_3$  เมื่อตกตะกอนจะอยู่ในรูป  $\text{NH}_4 - \text{N}$  และ  $\text{N}$  ซึ่งมีความเข้มข้น ระหว่าง 1 - 60 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่ง Barrows และ Vilmer (1963) ศึกษาพบว่า ปริมาณไนโตรเจนที่ สูญเสียจริงมีเพียง 42 ปอนด์ต่อเอเคอร์ อย่างไรก็ตาม ยังคงสูงกว่าธาตุอาหารตัวอื่นๆ ขณะที่ ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในน้ำไหลป่าจะมีสูงกว่าดินที่ถูกพัดพา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่า Enrichment ratio (ER) จะมีค่าแตกต่างกันตั้งแต่ 1.3 ถึง 3.3 ในดินแต่ละชนิด การประเมินค่าการ สูญเสียธาตุอาหาร Das (1977) ในอินเดียมีปริมาณการสูญเสียไนโตรเจน 2.5 ล้านตันต่อปี ฟอสฟอรัส 1.5 ล้านตันและโปแตสเซียม 2.2 ล้านตัน ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียต่อปีมีมากกว่าปริมาณปุ๋ยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั่วประเทศ

## 2. 4 สมการการสูญเสียดินสากล

Smith และ Whitt (1947) ; Musgrace (1947) ; Van Bartelli (1956) และ Wischmeier และ Smith (1965) ได้ประมวลผลการศึกษาการชะล้างพังทลายของดินเพื่อพัฒนา สมการ เพื่อใช้ในการประเมินการสูญเสียดิน เรียกว่า สมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation ,USLE) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

$$A = RKLSCP \quad \dots (1)$$

เมื่อ A = ปริมาณดินที่สูญเสียต่อหน่วยพื้นที่ได้จากการคำนวณ

R = ปัจจัยน้ำฝน เป็นหน่วยของดัชนีการพังทลายที่เกิดจากฝนตกกรายปี อย่างปกติ

K = ปัจจัยสมรรถนะการพังทลายของดิน เป็นอัตราส่วนต่อหน่วยของ ดัชนีการพังทลายในดินแต่ละชนิดที่ได้ทำการไถพรวนบนความลาด ชัน 9 เปอร์เซนต์ และมีความยาว 72.6 ฟุต

L = ดัชนีความยาวของความลาดชัน เป็นอัตราส่วนของดินที่สูญเสียจาก พื้นที่ที่มีความยาวของความลาดชัน 72.6 ฟุต จากความลาดชัน 9 เปอร์เซนต์

S = ดัชนีของความลาดชัน เป็นอัตราส่วนของดินที่สูญเสียจากพื้นที่ที่มี ความลาดชัน 9 เปอร์เซนต์

C = ดัชนีการจัดการพืชพรรณ เป็นอัตราส่วนของดินที่สูญเสียจากพื้นที่ที่ มีการจัดการและปลูกพืชโดยเฉพาะ ซึ่งทราบปัจจัย K เรียบร้อยแล้ว



P = ดัชนีสิ่งก่อสร้างเพื่อควบคุมการพังทลายของดิน เป็นอัตราส่วนของ  
ดินที่สูญเสียกับการสร้างแนวขอบเขา ปลุกพืชเป็นแนว หรือการทำ  
เทอร์โรซปลูกเป็นแนวขนานตามแนวตอนบนและตอนล่างของความ  
ลาดชัน

นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยหลายท่านได้พยายามคิดค้นสมการเพื่อพัฒนาการหาค่า  
การสูญเสียดินในแต่ละท้องถิ่นตามสภาพภูมิอากาศ และขามลาดชันที่ต่างกันภายใต้สภาพดินฟ้า  
อากาศและฝนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ต่างกัน

กองห้องสมุด  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

### บทที่ 3. กระบวนการศึกษาวิจัย

#### 3.1 กระบวนการวิจัย


การกำหนดขั้นตอนและวิธีการศึกษาของงานวิจัยนี้ยึดถือวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นแนวทางสำคัญ ซึ่งสามารถกำหนดแนวทางและขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 1) ศึกษาศักยภาพทางกายภาพและทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ศึกษาที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิงการสูญเสียดิน 2) ศึกษาสมรรถนะและปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียดิน โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้

3.1.1 กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจัย การกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจัย ด้วยแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ก่อนทำการวางแผนรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

3.1.2 การรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลในอดีตและปัจจุบันสำรวจพื้นที่เบื้องต้น และแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา ข้อมูลภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีต

1) ข้อมูลภูมิอากาศ เนื่องจากไม่มีสถานีตรวจอากาศในพื้นที่ศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะสร้างสถานีตรวจวัดอากาศและติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศบริเวณแปลงเพาะข้ากล้ำไม้เก่า ของกรมป่าไม้ โดยมีเครื่องมือตรวจวัดอากาศดังนี้

(1) เครื่องมือวัดน้ำฝนแบบอัดโนมิติ (recording rain guage) และเครื่องมือวัดน้ำฝนแบบมาตรฐาน (standard rain guage)



ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย



(2)เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอากาศแบบธรรมดาและเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด (maximum-minimum thermometer)

(3) เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกกระเปาะแห้ง (wet-dry thermometer) เพื่อวัดความชื้นสัมพัทธ์

(4) ถาดวัดการระเหยน้ำแบบ U.S. Class A Pan

### 3.1.3 การแปลงข้อมูลจากแผนที่

ก่อนดำเนินการสำรวจพื้นที่ศึกษาเพื่อการวางแผนจัดเก็บข้อมูลภาคสนามและสร้างแปลงทดลอง จำเป็นต้องทำการแปลความหมายในแผนที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสำรวจ ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยาและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ลักษณะทางธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาและสภาพปฐพีวิทยา ซึ่งใช้ในการอธิบายลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นที่ลุ่มน้ำต่อไป

3.1.4 การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การสำรวจภาคสนามนั้น ดำเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ที่ใช้ในข้อ 5.6.3 ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาลักษณะทางกายภาพในพื้นที่ศึกษา ลักษณะทางธรณีสัณฐาน โครงสร้างทางธรณี ปฐพีวิทยาและการใช้ที่ดิน ตลอดจนกำหนดจุดสร้างแปลงศึกษาการชะล้างพังทลายของดิน และเลือกตำแหน่งที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ในการสร้างสถานีตรวจอากาศและติดตั้งเครื่องมือวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ

### 3.2 การกำหนดตำแหน่งและสร้างแปลงศึกษา

การศึกษ้อัตราการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียธาตุอาหารในพื้นที่ ได้ทำการศึกษาจากลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันของกลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ ได้แก่ พื้นที่ป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่ารุ่นสอง และพื้นที่วนเกษตร เป็นดัชนีในการศึกษาวิจัย โดยวิธีสร้างแปลงศึกษาในพื้นที่ตัวอย่างของแต่ละประเภทการใช้ที่ดิน เพื่อศึกษ้อัตราการชะล้างหน้าดิน และการสูญเสียธาตุอาหารอันเนื่องมาจากน้ำไหลบ่าหน้าดิน วิธีนี้จะให้ผลด้านการประเมินค่าความคงทนของดินในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ โดยใช้ปริมาณตะกอนในแต่ละพื้นที่เป็นตัวบ่งชี้อัตราความคงทนของดินแล้วนำมาเปรียบเทียบกับแปลงตัวอย่างที่สร้างไว้ในทุก ๆ พื้นที่ศึกษา

บริเวณที่กำหนดตำแหน่งเป็นพื้นที่แปลงศึกษา ได้กำหนดไว้ 3 ลักษณะพื้นที่ด้วยกัน ได้แก่ 1) บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังแควะ ได้กำหนดตำแหน่งสร้างแปลงศึกษาในบริเวณพื้นที่ป่าเบญจพรรณ จำนวน 1 แปลง และในบริเวณพื้นที่ป่าเต็งรังแควะ จำนวน 1 แปลง 2) บริเวณพื้นที่ป่า

เสื่อมโทรม หรือป่าเต็งรังรุ่นสอง ซึ่งอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้จัดให้เป็นพื้นที่ป่าปลูกทดแทน มีมาตรการในการควบคุมไฟฟ้า และทำชั้นบันไดดินในทุก ๆ ระยะ 20 เมตร ได้กำหนดตำแหน่งสร้างแปลงศึกษาในบริเวณพื้นที่ป่าเต็งรังรุ่นสองนี้ จำนวน 1 แปลง และในบริเวณพื้นที่ป่าปลูกทดแทนที่อยู่ใกล้เคียงอีก จำนวน 1 แปลง 3) บริเวณพื้นที่วนเกษตร ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รับผิดชอบจัดให้เป็นพื้นที่เกษตรแผนใหม่มีการทดลองปลูกมะม่วง ลำไย ส้ม และไม้ผลอื่น ๆ ได้กำหนดตำแหน่งสร้างแปลงศึกษาในบริเวณพื้นที่สวนมะม่วง จำนวน 1 แปลง

พื้นที่ในการสร้างแปลงศึกษาควรมีลักษณะดังนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่เรียบตามสภาพธรรมชาติ ไม่มีทางน้ำไหลเป็นร่องลึก หรือมีหินขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาเหนือผิวดิน ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้น้ำไหลบ่าหน้าดินเปลี่ยนทิศทางไม่เป็นไปตามธรรมชาติได้ และควรเป็นพื้นที่ลาดมีความกว้างพอสมควรและสามารถสร้างแปลงศึกษาที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตรได้ และที่สำคัญ คือ พืชพรรณที่ขึ้นในพื้นที่ต้องเป็นพืชพรรณตามธรรมชาติของพื้นที่ประเภทนั้น ๆ

#### 1) วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างแปลงศึกษา


- เทปวัดระยะ
- หมุดไม้
- เชือกฟาง
- ลังกะสีแผ่นเรียบ
- ปูนซีเมนต์
- ทราวยหยาบ
- ท่อคอนกรีตเทพื้น      ขนาด  $\varnothing$  0.80 x 0.50 เมตร
- ท่อคอนกรีต              ขนาด  $\varnothing$  0.80 x 0.50 เมตร
- ท่อคอนกรีต              ขนาด  $\varnothing$  6 นิ้ว
- ท่อ PVC                    ขนาด  $\varnothing$  1 นิ้ว

#### 2) ขนาดของแปลงศึกษาในพื้นที่ศึกษา



ตารางที่ 3.1 แสดงขนาดแปลงศึกษาการชะล้างพังทลายและการสูญเสียธาตุอาหาร

| ประเภทการใช้ประโยชน์ | ขนาดแปลง (เมตร) | จำนวน | ขนาดแปลง (เมตร) | จำนวน |
|----------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ       | 4 x 20          | 2     | 2 x 4           | 1     |
| 2. ป่าเต็งรังแคระ    | 4 x 20          | 2     | 2 x 4           | 1     |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่นสอง | 4 x 20          | 2     | 2 x 4           | 1     |
| 4. ป่าปลูก           | 8 x 20          | 2     | 4 x 8           | 1     |
| 5. สวนมะม่วง         | 12 x 20         | 2     | 4 x 8           | 1     |



ภาพถ่ายที่ 3.2 แสดงลักษณะการสร้างแปลงศึกษา



ภาพที่ 3.3 แสดงลักษณะการวางท่อรับน้ำจากแปลงศึกษา



#### 4) การสร้างแปลงศึกษา ควรดำเนินการดังนี้

- กำหนดตำแหน่งและขนาดแปลงศึกษาในพื้นที่ ให้มีขนาดตามที่กำหนดไว้ใน ตารางที่ 3.1
- ใช้เทพวัดระยะกำหนดขนาดแปลงศึกษา และปักหมุดเป็นระยะใช้เชือกฟางซึ่งเป็นแนวรอบขอบแปลง
- ขุดร่องแนวขอบรอบแปลงศึกษาให้มีความลึก และกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร จากนั้นเทคอนกรีตลงในร่อง ใช้สังกะสีแผ่นเรียบวางในแนวยาวตั้งฉากกับพื้นที่ ต่อเนื่องกันตามรูปแปลงศึกษา ดังภาพที่ 3.3
- แนวระดับต่ำสุดของความลาดเทในแปลงศึกษา ให้ขุดหลุมฝังท่อคอนกรีตขนาด  $\phi$  0.80 x 0.50 เมตร ต่อกัน 2 ท่อ และปิดฝา ดังภาพที่ 3.4
- ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน จากข้อ 1 ถึง ข้อ 4. ในทุกพื้นที่ที่ต้องการศึกษา

### 3.2 การกำหนดตำแหน่งพื้นที่ศึกษาวิจัย

พื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้เป็นลุ่มน้ำเชิงเขาขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่โครงการบ้านโป่งและอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารมีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรกรรมของราษฎรในฤดูแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำครอบคลุมพื้นที่ป่าธรรมชาติที่อยู่ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ของอ่างเก็บน้ำห้วยไฉ้ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 3,686 ไร่ และพื้นที่วนเกษตรอีกประมาณ 907 ไร่ ซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้ประกอบด้วยป่าเต็งรังและป่าเต็งรังรุ่นสอง ป่าเบญจพรรณ ป่าเบญจพรรณชื้น ป่าปลูก พื้นที่สวนไม้ผล และที่อยู่อาศัยของราษฎร

ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

- 1). พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติประกอบด้วยป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ
- 2). พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับมอบจากกรมป่าไม้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดเป็นพื้นที่ป่าปลูกทดแทน และมีมาตรการควบคุมไฟป่า

3). พื้นที่วนเกษตร ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับผิดชอบจัดเป็นพื้นที่เกษตรแผนใหม่ มีการทดลองปลูกไม้ผล ไม้ดอก - ไม้ประดับ และมีระบบการจัดการด้วยวิทยาการที่ทันสมัย

จากการสำรวจชนิดและพันธุ์ไม้ในบริเวณพื้นที่ป่าพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ่ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

1). ป่าเต็งรังแคะ เป็นพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงประมาณ 32.5 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนพันธุ์ไม้ประมาณ 33 ชนิด มีความสูงตั้งแต่ 1.6 ถึง 24.0 เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 ถึง 49 นิ้ว ชนิด

พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ เหียง (*D. obtusifolius*) มะเฒ่าสาย (*Antidesma acidum*) อักหลาง (*Gluta usitata* (Anacardiaceae)) จั๋งดำ (*Micromelum* sp.) เปา (*S. siamensis* (Dipterocarpaceae)) เหมือนโค่น (*M. Scutellatum*) เป็นต้น

สภาพทั่วไปของป่าเต็งรังแคะ อยู่บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงถึงปานกลาง ในช่วงฤดูแล้งมักจะเกิดไฟไหม้ป่าอยู่เสมอ ๆ มีสาเหตุมาจากความประมาท หรือราษฎรที่เข้าไปหาของป่าและมีความเชื่อว่าการผลิดจากป่าจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้พื้นที่ป่า ดังนั้นจึงมีผลทำให้ลูกไม้ป่าบริเวณพื้นที่ป่าเต็งรังถูกไฟไหม้ทำลายอยู่เสมอ มีผลให้อัตราการเจริญเติบโตของลูกไม้ลดลง และไม้พื้นล่างที่ปกคลุมพื้นดินไม่มีความหนาแน่นเพียงพอที่จะป้องกันผิวน้ำดินมิให้ถูกพัดพาออกจากพื้นที่โดยน้ำไหลบ่าหน้าดินได้ เป็นผลให้ผิวน้ำดินในบริเวณพื้นที่ป่าเต็งรังเกิดการชะล้างพังทลายอยู่เสมอ

2). ป่าเต็งรังรุ่นสอง พื้นที่ส่วนใหญ่กระจายครอบคลุมพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (907 ไร่) เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ มีมาตรการควบคุมไฟป่าและมีการสร้างขั้นบันไดดิน (banch terrace) ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน โดยสร้าง banch terrace ให้มีความกว้างประมาณ 3 เมตร จากส่วนที่สูงที่สุดของพื้นที่ทุก ๆ ระยะ 25 เมตร เพื่อลดอัตราการชะล้างพังทลายของหน้าดิน พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีลูกไม้เล็ก ๆ ขึ้นอย่างหนาแน่นในพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่พบมีจำนวนประมาณ 13 ชนิด มีความสูงตั้งแต่ 1.50 ถึง 8.5 เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1 ถึง 18 นิ้ว ชนิดพันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ เหียง (*D. obtusifolius*) อักหลาง (*Gluta usitata* (Anacardiaceae)) จั๋งดำ (*Micromelum* sp.) มะเกิ้ม (*Carariun - subulatum*) กาวเครือ (*Millettia auriculata* Bak. Virextnsa Benth) และ รัง (*S. siamensis* - (Dipterocarpaceae)) เป็นต้น



3) ป่าเบญจพรรณและเบญจพรรณชื้น เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติพบอยู่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไจ้ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขา และพื้นที่ราบริมลำห้วย เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความชื้นสูง เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงประมาณ 25.5 เปอร์เซ็นต์ มีพันธุ์ไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น เปอร์เซ็นต์การปกคลุมเรือนยอดมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ไม้ที่พบมีจำนวน ประมาณ 17 ชนิด มีความสูงตั้งแต่ 2.0 ถึง 22.0 เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1 ถึง 18 นิ้ว ชนิดพันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ตะแบกเลือด (*Lagerstroemia mucronata*) เหียง (*D.obtusifolius*) รัง (*S.siamensis* - (*Dipterocarpaceae*)) สักทอง

(*Tectona grandis*) แะ (*Shorea obtusa*) เป็นต้น

4) ป่าปลูก เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของพื้นที่ 907 ไร่ ของฟาร์มวนเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่สูงมากนักประมาณ 11.5 เปอร์เซ็นต์ มีมาตรการในการดูแลรักษา ระยะปลูกพันธุ์ไม้ประมาณ 4 ถึง 6 เมตรต่อแถว พันธุ์ไม้ที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ยางเหียง (*Dipterocarpus obtusifolius* Teijsm.ex Miq) ยางนา (*Dipterocarpus alatus* Roxb) สัก (*Lagerstroemia - venusta* Wall) ประดู่ (*Pterocarpus macrocapus*) ฯลฯ มีความสูงตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00 เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 ถึง 4 นิ้ว ไม้พื้นล่างส่วนใหญ่เป็นวัชพืชคลุมดิน ความหนาแน่นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

5) สวนมะม่วง เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของพื้นที่ 907 ไร่ ของฟาร์มวนเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่สูงมากนักประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ มีมาตรการในการดูแลรักษา ระยะปลูกพันธุ์ไม้ ประมาณ 3 ถึง 4 เมตรต่อแถว มะม่วงที่ปลูกเป็นพันธุ์โชคอนันท์ที่ให้ผลผลิตตลอดปี มีความสูงประมาณ 1.50 ถึง 2.50 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 2.00 เมตร ทรงพุ่มค่อนข้างโปร่ง ไม้พื้นล่างส่วนใหญ่เป็นวัชพืชคลุมดิน มีความหนาแน่นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบมีความลาดชันไม่สูงมากนัก

### 3.3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม

#### 3.3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอน

การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยทำการจัดเก็บตัวอย่างตะกอนหลังฝนตกตลอดฤดูฝน โดยดำเนินการดังนี้

1) เก็บข้อมูลในช่วงเวลาหลังฝนตกทันทีหรือภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง หรือก่อนที่จะมีกลุ่มพายุฝนกลุ่มใหม่ตกลงมาในพื้นที่อีก

2) วัดความสูงขอ



งน้ำในถังรับน้ำ จดบันทึกไว้เพื่อนำไปคำนวณหาปริมาณของน้ำและตะกอน

3) กวนน้ำในถังให้ตะกอนผสมกับน้ำจนเข้ากัน แล้วตวงน้ำตัวอย่างจำนวน 1 ลิตร เพื่อหาปริมาณตะกอน

4) นำน้ำ 1 ลิตร ใส่ในภาชนะตวง แล้วเติม calcium chloride เพื่อเร่งการตกตะกอน

5) เขย่าส่วนผสมในภาชนะตวงแล้วทิ้งให้ตกตะกอนจนหมด

6) นำตัวอย่างน้ำจากแปลงศึกษามากรอง โดยใช้กระดาษกรองเบอร์ 42

7) นำตะกอนตัวอย่างเข้าตู้อบในอุณหภูมิ 75 ถึง 80 องศา ใช้เวลาอบนาน 24 ชั่วโมง หรืออบจนแห้งสนิท แล้วนำตะกอนแห้งมาชั่งน้ำหนักเพื่อหาความหนาแน่นของตะกอน มีหน่วยเป็น กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

8) นำค่าความหนาแน่นของตะกอนมาคำนวณ หาปริมาณความสูงของตะกอนต่อขนาดแปลงศึกษา

9) นำตัวอย่างตะกอนที่ได้ในแต่ละแปลงศึกษา มาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหาปริมาณธาตุอาหาร (N,P,K,Ca,Mg) ในตะกอน

3.3.2 การวางแผนและจัดเก็บข้อมูลดิน การเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและการชะล้างพังทลาย โดยเลือกเก็บตัวอย่างดินตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ครั้ง จากพื้นที่ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ สวนไม้ผลและแปลงเกษตรแบบผสมผสาน โดยทำการเก็บดิน 2 รูปแบบ คือ เก็บตัวอย่างดินไม่คงสภาพ (disturbed soil sampling) เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการ ได้แก่ อินทรีย์วัตถุ, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม และวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพบางประการ ได้แก่ เนื้อดิน, สี, และองค์ประกอบของดิน และการเก็บตัวอย่างแบบคงสภาพ (undisturbed soil sampling) เพื่อศึกษาความสามารถในการซึมซับน้ำของดิน ตำแหน่งของจุดเก็บตัวอย่างดิน โดยเก็บบริเวณกึ่งกลางของความลึกของชั้นดิน (soil profile) จำนวนตัวอย่างในแต่ละจุด เก็บที่ระดับความลึกซึ่งเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของชั้นดินแต่ละชั้นในภาคตัดขวางของดินบริเวณนั้น

### 3.2.3 การวิเคราะห์ตัวอย่าง

1) การวิเคราะห์ลักษณะทางภูมิกายภาพ และ ธรณีวิทยา ใช้แผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000 และแผนที่ธรณีวิทยา 1: 50,000 ของกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งสำรวจโดย ไชยยันต์ (2538) ประกอบกับการเดินสำรวจภาคสนามและการใช้อุปกรณ์สนามเช่น เครื่องวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS: Geographic Position System) เชื่อมทิศ

2) การวิเคราะห์สมบัติของดิน สมบัติทางเคมีของดินวิเคราะห์ที่ภาควิชาดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมทางเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมบัติทางกายภาพของดิน วิเคราะห์ที่สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ภาควิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การศึกษาการชะล้างพังทลาย และการสูญเสียธาตุอาหารของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ มีวิธีการศึกษาโดยสร้างแปลงศึกษาในแต่ละเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการศึกษานี้ได้เลือกใช้พื้นที่ตัวอย่าง 5 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณพื้นที่ป่าเต็งรัง บริเวณพื้นที่ป่าเบญจพรรณ บริเวณพื้นที่ป่าเต็งรังรุ่นสอง บริเวณพื้นที่ป่าปลูก และบริเวณพื้นที่สวนมะม่วง ซึ่งค่าปริมาณตะกอนจากการชะล้างพังทลายที่ได้จากแปลงศึกษา เป็นค่าตัวแทนของการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ และสามารถนำไปคำนวณหาอัตราการชะล้างพังทลายและการสูญเสียธาตุอาหารในพื้นที่ลุ่มน้ำต่อไป

ในการศึกษานี้ สามารถแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ ออกเป็น 6 ส่วน คือ

- 1) การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยน้ำฝน ที่ส่งผลกระทบต่อ การสูญเสียดิน
- 2) การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านน้ำฝน ต่อปริมาณน้ำไหลบ่า หน้าดิน และต่อปริมาณการพัดพาตะกอน จากแปลงศึกษา
- 3) การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน ต่อปริมาณการ พัดพาตะกอน ออกจากแปลงศึกษา
- 4) การวิเคราะห์ข้อมูลการสูญเสียดินในแปลงศึกษา
- 5) การวิเคราะห์ข้อมูลการสูญเสียดินในพื้นที่ระดับลุ่มน้ำ
- 6) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประเมินมูลค่าการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ จากอัตราการสูญเสียดินในพื้นที่ระดับลุ่มน้ำ

### 3.5 การวิเคราะห์การชะล้างพังทลายและการพัดพาตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำ

วิธีการคำนวณปริมาณการสูญเสียดินบริเวณ ได้แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็นกริดและพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยครอบคลุมพื้นที่ 907 ไร่ ด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่ (weighting area) โดยใช้โปรแกรม LANDCAD (Land computer aid design) ในการคำนวณและสร้างแผนที่เพื่อความต้องการในการประเมิน ทั้งนี้อยู่บนหลักวิเคราะห์โดยสมการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation) ดังนี้

|       |    |                                                                    |         |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------|---------|
|       | A  | = RKLSCP                                                           | ... (2) |
| เมื่อ | A  | = ปริมาณดินที่สูญเสียจากพื้นที่รับน้ำ (ตันต่อเฮกตาร์ต่อปี)         |         |
|       | R  | = เป็นปัจจัยจากน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (ตันต่อเฮกตาร์ต่อปี) |         |
|       | K  | = ปัจจัยจากความยาก - ง่าย ในการสูญเสียดิน                          |         |
|       | LS | = ปัจจัยด้านสภาพความลาดชันของพื้นที่รับน้ำ                         |         |
|       | C  | = ปัจจัยด้านพืชพรรณที่ปกคลุมดิน                                    |         |
|       | P  | = ปัจจัยด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ                                   |         |

การวิเคราะห์วิธีทั้งสองข้างต้น ใช้วิธีการคำนวณค่าปัจจัย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยความยาก-ง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor) ปัจจัยด้านสภาพความลาดชันของพื้นที่รับน้ำ (LS-factor) ปัจจัยพืชปกคลุมดินและการจัดการพืช (C-factor) และปัจจัยการปฏิบัติการควบคุมการพังทลายของดิน (P-factor) ปัจจัยดังกล่าวใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่ ตามวิธีการของ William และ Berndt (1972)

#### 3.5.1 การวิเคราะห์ค่า R (ค่าปัจจัยของน้ำฝนที่ทำให้การสูญเสียดิน)

การวิเคราะห์โดยใช้พลังงานของฝนที่ทำให้เกิดการพังทลาย โดยอาศัยสมการตามรูปแบบของ Wischmeier และ Smith (1958) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลน์ที่เกิดจากฝนและอัตราความหนักเบาของฝน ดังสมการ (3)

|       |       |   |                                                                                                                            |         |
|-------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | $E_k$ | = | $210.3 + 89 \log I$                                                                                                        | ... (3) |
| เมื่อ | $E_k$ | = | พลังงานจลน์ที่เกิดจากฝน (เมตร-ตันต่อเฮกตาร์)                                                                               |         |
|       | I     | = | ความหนักเบาของฝนที่ตกแต่ละช่วงเวลาซึ่งอ่านจากกราฟน้ำฝนที่ได้จากการบันทึกด้วยเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ (เซนติเมตร ต่อวินาที) |         |

ค่า  $E_k$  ที่คำนวณได้นี้เมื่อนำมาสัมพันธ์กับความเข้มข้นของฝนที่ตกสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที (maximum 30-minute rainfall intensity:  $I_{30-max}$ ) ของฝนที่ตกในวันนั้นๆ จะได้พลังงาน



ทั้งหมดที่เกิดจากน้ำฝน จากนั้นแปลงค่าให้อยู่รูปของเปอร์เซ็นต์ จะได้สมการที่เรียกว่า rainfall factor (RFAC หรือ R) ดังสมการ (4)

$$R = \frac{[\sum E_k] I_{30-max}}{100} \dots (4)$$

### 3.5.2 การหาค่าปัจจัยด้านสภาพความลาดชันของพื้นที่รับน้ำ (slope length and slope gradient factor, LS)

ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิประเทศไปที่มีผลกระทบต่อการพังทลายของดิน เนื่องจากเป็นตัวช่วยส่งเสริมทำให้แรงดึงดูดของโลกมีบทบาทขึ้นในการทำให้ดินเกิดการพังทลาย ลักษณะสำคัญสองประการของภูมิประเทศ ได้แก่ ความชันและความยาวของความลาดเท เนื่องจากพื้นที่ที่มีความชันและความยาวความลาดเทมาก จะทวีความรุนแรงของน้ำที่ไหลบ่าและก่อให้เกิดการกัดกร่อนของผิวน้ำดินได้มากกว่า ขณะเดียวกันยังมีอิทธิพลต่อความสามารถในการเคลื่อนย้ายน้ำที่ไหลบ่าหน้าดิน นอกจากนั้นความลาดชันที่เพิ่มขึ้นจะทำให้พลังงานของน้ำบ่าหน้าดินที่จะกัดกร่อนให้ดินแตกกระจายเพิ่มพลังงานมากขึ้นด้วย เมื่ออัตราความหนักเบาของฝนมากกว่าอัตราการซึมน้ำได้ของดิน และพื้นที่มีความลาดชันมากขึ้น การเคลื่อนย้ายและพัดพาตะกอนจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การคำนวณค่าปัจจัยความลาดชันและความยาวของพื้นที่ลาดชันมีขั้นตอนการคำนวณความยาวของความลาด โดยใช้โปรแกรม LANDCAD ในการแบ่งพื้นที่ออกเป็นกริดย่อยขนาด 10x10 เมตร โดยเริ่มต้นจากการคำนวณระยะทางที่น้ำบ่าไหลหลากลงมาตามความลาดชันของพื้นที่ (L) ดังสมการ (5)

$$L = 0.5 A_D / L_C \dots (5)$$

เมื่อ  $A_D$  = พื้นที่กริดย่อย (ตารางกิโลเมตร)

$L_C$  = ความยาวของลำน้ำหรือความลาดชันของพื้นที่ที่ต้องการคำนวณการสูญเสียดินจากการกัดเซาะและพัดพาโดยน้ำฝนละน้ำบ่าไหลหลากลงสู่ลำธาร (เมตร)

$L$  = ความยาวของความลาดชัน (เมตร)

การคำนวณค่าความลาดชันของพื้นที่จากแผนที่ภูมิประเทศและการสำรวจภาคพื้นดินโดยสมการ (6)

$$S = (L_{c_j} + L_{c_{j+1}} + 1) \times 100/2 A_j \quad \dots (6)$$

$S_j$  = ค่าเฉลี่ยของความลาดชันของพื้นที่ (ร้อยละ) ในระหว่างระดับความสูง  $j$  และ  $j+1$   
 $H$  = ความแตกต่างระหว่างเส้นระดับความสูงเท่า  $j$  และ  $j+1$   
 $L_j$  = ความยาวของเส้นระดับความสูง  $j$   
 $A_j$  = พื้นที่ที่ระหว่างเส้นระดับความสูงเท่า  $j$  และ  $j+1$  (ตารางกิโลเมตร)

การคำนวณค่าความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่ที่กรดย่อยดังในสมการ (7)

$$S = (\sum_{i=1}^N S_i A_i) / A_0 \quad \dots (7)$$

เมื่อ  $n$  = จำนวนพื้นที่ระหว่างเส้นระดับความสูงเท่า  $j$  และ  $j+1$

การคำนวณค่าปัจจัยความลาดชันของพื้นที่ดังสมการ (8)

$$LS = 22.13 (L/4.705)^m (0.0076 + 0.0053S + 0.00076 S^2) \quad \dots (8)$$

เมื่อ  $L$  = ความยาวของพื้นที่ลาดชัน (เมตร)

$m = 0.2$  เมื่อความลาดชันของพื้นที่น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์

$m = 0.3$  เมื่อความลาดชันของพื้นที่มีค่าระหว่าง 1 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์

$m = 0.4$  เมื่อความลาดชันของพื้นที่มีค่าระหว่าง 3 ถึง 4.5 เปอร์เซ็นต์

$m = 0.5$  เมื่อความลาดชันของพื้นที่มีค่าระหว่าง 5-12 เปอร์เซ็นต์

$m = 0.6$  เมื่อความลาดชันของพื้นที่มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

3.5.3 การหาค่า  $K$  (ปัจจัยจากความยาก-ง่าย ในการสูญเสียดิน) การประเมินค่า  $K$  ที่ได้จากวัดปริมาณตะกอนจากแปลงทดลองทุกครั้งหลังฝนตก สำหรับแปลงตะกอนตรวจวัดความยากง่ายต่อการถูกชะล้างของดินมีขนาด  $1 \times 4$  เมตร ซึ่งสร้างติดกับแปลงตะกอนศึกษาค่าปัจจัยพืชปกคลุมดิน ขนาด  $20 \times 4$  เมตร (C-factor) ขอบแปลงทำด้วยแผ่นสังกะสีขนาดหนาปานกลาง เพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกแปลงไหลเข้ามา โดยฝังแผ่นสังกะสีลงในดินความลึก 30 เซนติเมตร และสูงจากผิวดินประมาณ 30 เซนติเมตร ด้านปากแปลงอยู่ด้านล่างของความลาดชัน มีภาชนะคือถังน้ำมันขนาด 100 ลิตรรองรับน้ำตะกอนที่สามารถอ่านปริมาตรได้โดยการใช้ไม้บรรทัดขนาด 1.50 เมตร วัดความสูงของน้ำในถัง วิธีการปฏิบัติต่อผิวดิน คือ ถางพื้นที่ให้ปราศจากพืชปกคลุมและพรวนดินทุกครั้งหลังเก็บข้อมูล เพื่อรอรับพายุฝนที่จะตกใหม่อีกครั้ง วิธีการเก็บตะกอน คือ เก็บตัว

อย่างน้ำจากถังรองรับน้ำจากแปลงตะกอน 1,000 ซีซี (1 ลิตร) หลังฝนตกทุกครั้ง ทำตัวอย่างน้ำให้ตกตะกอน กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 12 และนำตัวอย่างตะกอนไปอบแห้ง เพื่อชั่งน้ำหนักแห้งสุทธิของตะกอนที่เกิดจากพายุฝนแต่ละครั้ง

จากนั้นวิเคราะห์ค่า K ที่มีค่า  $E_K$  โดยการประยุกต์สมการของ Dangler และ El-Seaiy (1976) เสนอไว้ดังนี้

$$K = A / ELSCP \quad \dots (8)$$

เมื่อ A = น้ำหนักแห้งของตะกอนที่วัดได้จากแปลงทดลองที่ไม่มีสิ่งปกคลุม

(Erodibility plot) มีหน่วยเป็นตัน

$E_K$  = พลังกัดเซาะของฝน มีหน่วยเป็นเมตร-ตันต่อเฮกตาร์

LS = ได้จากสมการที่ (7)

จากนั้น คำนวณค่า K ด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่ ทั้งโดยวิธีการประเมินแบบลุ่มน้ำย่อยและแบบกริด ได้ค่า K จากของแปลงทดลอง ดังนี้

$$K = \frac{\sum_{i=1}^N K_i A_i}{\sum_{i=1}^N A_i} \quad \dots (9)$$

เมื่อ K = ปัจจัยแสดงสภาพพังทลายของดินในลุ่มน้ำ

$K_i$  = ปัจจัยแสดงสภาพพังทลายของดินแต่ละชนิดในลุ่มน้ำ

$A_i$  = พื้นที่การใช้ที่ดินแต่ละประเภทที่ปรากฏในลุ่มน้ำ

3.5.4 การวิเคราะห์ปัจจัยพืชคลุมดินและการจัดการพืช (Cropping management factor, c) จากแปลงทดลอง สำหรับแปลงตะกอนศึกษาพืชปกคลุมดิน (C-factor) มีขนาด 4x20 เมตร วิธีการสร้าง ลักษณะและวิธีการเก็บตะกอน กระทำการเช่นเดียวกับแปลงตรวจวัดความยากง่ายต่อการชะล้างพังทลายของดิน วิธีปฏิบัติต่อผิวดิน คือปล่อยให้พื้นที่อยู่ในสภาพธรรมชาติ

Dangler and El - Swaify (1976) เสนอการประมาณค่าปัจจัยพืชคลุมดินและการจัดพืช (C-factor) เมื่อพื้นที่นั้นมีระดับของความลาดชันและความยาวของความลาดชันเดียวกัน

$$C = A / (EKLSP) \quad \dots (10)$$

โดย A = น้ำหนักแห้งของตะกอนที่ได้จากแปลงทดลอง มีหน่วยเป็นเมตร-ตันต่อเฮกตาร์

E = เป็นค่าปัจจัยการชะล้างพังทลาย (erosivity factor) ที่คำนวณได้จากสม



การ มีหน่วยเป็นเมตร-ตันต่อเฮกตาร์

K = ปัจจัยความยากง่ายในการเกิดการพังทลายของดิน (K-Factor)

L = ปัจจัยความลาดชัน

S = ปัจจัยความยาวความลาดเท

P = ปัจจัยการปฏิบัติการอนุรักษ์ดินและน้ำ

จากนั้นคำนวณด้วยหลักการถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่เช่นเดียวกับปัจจัยตัวอื่นๆ โดยแบ่งพื้นที่โครงการออกเป็นกริดและพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยดังสมการ (11)

$$C = \frac{\sum_{i=1}^N C_i A_i}{\sum_{i=1}^N A_i} \quad \dots (11)$$

โดย  $C_i$  = = ปัจจัยจากแต่ละชนิดพืชพรรณที่ปกคลุมดินของแต่ละพืชพรรณและแต่ละความลาดชันของพื้นที่

$A_i$  = = พื้นที่ที่มีพืชพรรณหรือการใช้ที่ดินแต่ละประเภท (ตารางกิโลเมตร)

### 3.5.5 การคำนวณค่าปัจจัยการปฏิบัติการควบคุมการพังทลายของดิน

(Conservation practice factor, P)

สำหรับในประเทศไทย ค่า P-factor ยังไม่มีมาตรฐานแน่นอน และการปฏิบัติกับกิจกรรมการใช้ที่ดินโดยมีวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำนั้นน้อยมากจนไม่สามารถแสดงขอบเขตได้ การทดลองในภาคสนามเพื่อหาค่า P-factor ของกรมพัฒนาที่ดินได้กระทำไปบ้างแล้ว และรวบรวมโดยมนู (2529) และมีการนำเอาค่า P ของนักอนุรักษ์ดินและน้ำต่างประเทศและในประเทศมาใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะพื้นที่

จากนั้นคำนวณด้วยหลักการถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่เช่นเดียวกับปัจจัยตัวอื่นๆ ดังสมการ (12)

$$P = \frac{\sum_{i=1}^N P_i A_i}{\sum_{i=1}^N A_i} \quad \dots (12)$$

เมื่อ  $P_i$  = ค่าปัจจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำของแต่ละพืชพรรณและแต่ละความลาดชันของพื้นที่

$A_i$  = พื้นที่ที่มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ แต่ละรูปแบบ (ตารางกิโลเมตร)

3.5.6 การประเมินค่าอัตราส่วนการพัดพาตะกอนลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยใจ อัตราส่วนการพัดพาตะกอน (sediment delivery ratio; SDR) เป็นอัตราส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนทั้งหมดที่วัดได้ ณ จุดวัดในลำน้ำกับปริมาณการสูญเสียดินจากลุ่มน้ำที่อยู่เหนือจุดน้ำออก (outlet) ซึ่งเป็นปริมาณดินที่สูญเสียและถูกพัดออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำ

สมการที่ใช้คำนวณอัตราส่วนการพัดพาตะกอน ดังสมการที่ 13

$$\log SDR = 1.8768 - 0.14191 \log (10 A_0) \quad \dots (13)$$

โดยที่ SDR = อัตราส่วนการพัดพาตะกอนออกจากพื้นที่ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์

$A_0$  = พื้นที่กิริดย่อย (ตารางกิโลเมตร)

3.5.7 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในตะกอนแขวนลอยและดินตะกอน หลังจากนำตะกอนที่ผ่านการอบแห้งและชั่งน้ำหนักแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์ธาตุอาหารที่ได้จากตะกอนแขวนลอยและดินตะกอนมาวิเคราะห์ธาตุอาหาร ดังนี้ ไนโตรเจน (N) โปรแทสเซียม (K) ฟอสฟอรัส (P) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) เพื่อประเมินการสูญเสียธาตุอาหารที่เกิดขึ้นพร้อมกับการชะล้างพังทลายหน้าดิน

3.5.8 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประเมินมูลค่าการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ จากอัตราสูญเสียดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ

1) การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการชะล้างพังทลายต่อการสูญเสียธาตุอาหาร ในลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน โดยใช้สมการ regression analysis ในการวิเคราะห์จากตัวแปรปัจจัยที่ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการชะล้างพังทลาย และจากตัวแปรการใช้ที่ดินทั้ง 5 พื้นที่

2) การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างในพื้นที่ลุ่มน้ำต่อการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ สามารถคำนวณได้จากสมการ regression analysis โดย นำค่าปริมาณตะกอนแห้งจากแปลงศึกษาตัวอย่าง ไปคำนวณเปรียบเทียบกับปริมาณตะกอนที่จะสูญเสียจากพื้นที่ลุ่มน้ำ จากนั้นนำตัวอย่างตะกอนแห้งที่ได้จากแปลงศึกษามาวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการ

- นำข้อมูลปริมาณธาตุอาหารที่ได้จากการวิเคราะห์ มาคำนวณเปรียบเทียบหาปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารจากพื้นที่ลุ่มน้ำ ผลที่ได้จากการคำนวณ คือ ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียจากพื้นที่ลุ่มน้ำที่เกิดจากการชะล้างพังทลาย

- ค่าปริมาณธาตุอาหารเหล่านี้ นำมาคิดเทียบกับราคารู้อยู่ในท้องตลาด จะได้มูลค่าเป็นอัตราการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ


กองห้องสมุด  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้



## บทที่ 4 พื้นที่ศึกษา

### 4.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา

ห้วยไฉ้เป็นลุ่มน้ำเชิงเขาขนาดเล็กที่วางตัวบริเวณภูเขาส่วนนอก รอบแนวภูเขาสูงของเทือกเขาขุนตาลซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของแอ่งสะสมตะกอนเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 17.58 ตารางกิโลเมตร ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร มีรูปร่างเรียวยาว (elongated shape) วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 21 กิโลเมตร (ภาพที่ 4.1)



ภาพที่ 4.1 ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้

ที่มา: ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat (2542)

ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย ภายใต้โครงการอนุรักษ์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ป่าบ้านโปง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยไฉ้ โดยมีพระราชกระแสรับสั่งแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2521 ให้มหาวิทยาลัยศึกษาแนวทางวิชาการเพื่ออนุรักษ์ ศึกษาและพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยไฉ้และพื้นที่ลุ่มน้ำใกล้เคียง ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยมีพระราชดำรัสให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไฉ้ที่มีขนาด

ความจุ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้งและส่งน้ำไปช่วยเหลือราษฎรในลุ่มน้ำห้วยฮักและลุ่มน้ำห้วยเฮี้ย รวมทั้งจัดการส่งเสริมอาชีพและการบริการให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูก และให้ความรู้แก่ราษฎรให้รู้คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ จากโครงการพระราชดำริดังกล่าว โดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้ ได้มอบพื้นที่ป่าบริเวณได้อ่างเก็บน้ำห้วยใจ้ 3,686 ไร่ และพื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยใจ้ ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาวิจัยทางนิเวศวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาวิจัยทางธรรมชาติอย่างแท้จริง และมีเงื่อนไขว่า การศึกษาวิจัยนั้นต้องไม่รบกวนสภาพป่าธรรมชาติหรือให้เกิดน้อยที่สุด

#### 4.1.1 ลักษณะธรณีสัณฐาน


ผลการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2542 การแปลความหมายแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณี ประกอบการสำรวจภาคสนาม สามารถสรุปได้ว่าแอ่งสะสมตะกอนเฉียงใหม่อาจเกิดจากรอยเลื่อน จากการทรุดตัวลงไปเป็นแอ่งในช่วงตอนกลางถึงตอนปลาย (post-middle) ของยุคไมโอซีน (Miocene) อันเนื่องมาจากการแปรสัณฐานทางธรณีในช่วงเวลาที่มีการเชื่อมกันระหว่างภาคพื้นทวีปอินเดียและยูเรเชีย ทำให้บริเวณคาบสมุทรมาลายูหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกา จึงเกิดความเค้นดึงในแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งมีผลทำให้เกิดการทรุดตัวเป็นแอ่งในแนวเหนือ-ใต้ และคาดว่าจะมีความเค้นกระทำบนเปลือกโลกครั้งหลังสุดอีกครั้งหนึ่งมีผลทำให้เกิดการหมุนทวนเข็มนาฬิกาของคาบสมุทรมาลายูทำให้เกิดโครงสร้างรอยเลื่อนในบริเวณแอ่งสะสมตะกอนดังกล่าว เช่นเกิดการทรุดตัว ยกตัว และขึ้นหินคดโค้ง บริเวณขอบแอ่งสะสมตะกอนเดิม ซึ่งตรงกับการศึกษาของ Vella (1983), Chuaviroj (1991), Bunopus และ Vella (1992)

แอ่งสะสมตะกอนเฉียงใหม่มีลักษณะเป็นแอ่งทรุด (graben) และแอ่งกึ่งทรุด (half graben) ที่เกิดจากรอยเลื่อนในแนวเหนือ-ใต้ และรอยเลื่อนในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วยตะกอนขนาดกรวดและทรายยุคเทอร์เชียรี ซ้อนทับด้วยตะกอนน้ำพายุควอเทอร์นารี ดังนั้นจึงพบตะกอนยุคเทอร์เชียรีรองรับอยู่ด้านล่างของตะกอนน้ำพา (ขนาดหยาบ) ยุคควอเทอร์นารีในพื้นที่สูง และตะกอนน้ำพา (ขนาดละเอียด) ยุคควอเทอร์นารีทับถมในบริเวณตะพักที่ต่ำและที่ราบน้ำท่วมถึง (Chuanthaisan, 1971; Kaewnara, 1985)

สภาพธรณีวิทยาบริเวณแอ่งสะสมตะกอนเฉียงใหม่ ประกอบด้วยหินแกรนิตและหินไนส์ ซึ่งเป็นแกนหลักของเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออก ด้านเทือกเขาขุนตาลประกอบด้วยหินแกรนิตและหินควอร์ตไซต์ เป็นแกนหลัก หินที่กระจายอยู่รอบนอกของเทือกเขาทั้งสองได้แก่ หินดินดาน หินทราย หินปูน ตะกอนบริเวณเชิงเขาและที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ดังแสดงแผนที่ธรณีวิทยาบริเวณแอ่ง



สะสมตะกอนเชียงใหม่ในภาพที่ 4.2 และ 4.3 รายละเอียดของการลำดับชั้นหินตั้งแต่อายุมากที่สุดถึงน้อยมีดังนี้



ภาพที่ 4.2 ธรณีสัณฐานแอ่งเชียงใหม่



ภาพที่ 4.3 ภาพถ่ายดาวเทียม แอ่งเชียงใหม่

ที่มา : Chuamthaison (1971)

ที่มา : LANDSAT 3-4-5 (2540)

1) หินยุคพรีแคมเบรียน (Precambrian Rocks) หินยุคพรีแคมเบรียนปรากฏบริเวณยอดเขาทางทิศตะวันตกของแอ่งเชียงใหม่ หรือบริเวณแนวเทือกเขาที่เป็นแกนหลักของเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออก ประกอบด้วย หินพาราไนส์ และ ออโรไนส์ เป็นส่วนใหญ่ บางบริเวณเป็นไบโอไทต์-ซิลิกาไนต์ชีสต์ ไมกาชีสต์ และหินแคลคซิลิเกต

2) หินยุคออร์โดวิเซียน (Ordovician Rocks) หินยุคออร์โดวิเซียนปรากฏแทรกกระจายเฉพาะบางบริเวณของเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออก ประกอบด้วยหินปูนสีเทาเข้ม

3) หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน (Silurian-Devonian Rocks) หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียนปรากฏแทรกกระจายเฉพาะบางบริเวณในแนวแกนของเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออก แต่ปรากฏเป็นแกนหลักด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ของเทือกเขาขุนตาล ประกอบด้วยหินดินดาน หินควอร์ตไซต์ และหินโคลนปนกรวด



4) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous Rocks) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส ปรากฏกระจายโดยรอบแนวแกนของเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกและเทือกเขาขุนตาล ประกอบด้วยหินดินดาน หินทราย และหินทรายปนควอร์ตไซต์

5) หินยุคเพอร์เมียน (Permian Rocks) หินยุคเพอร์เมียนปรากฏกระจายเฉพาะบางบริเวณโดยรอบเทือกเขาขุนตาล ประกอบด้วยหินปูนสีเทาอ่อน

6) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary Sediments) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี ปรากฏกระจายบริเวณเชิงเขาขอบแอ่งเชียงใหม่ของเทือกเขาทั้งสองด้าน ประกอบด้วยก้อนหินมน กรวดมน ทรายหยาบ ทรายละเอียด และดินเหนียว ปะปนกันเป็นตะกอนที่ทับถมบริเวณเชิงเขา ตะพักลำน้ำระดับสูง และตะพักลำน้ำระดับต่ำ ต่อจากแนวตะพักลำน้ำ เป็นตะกอนยุคควอเทอร์นารี ที่มีระดับสูงกว่าบริเวณน้ำท่วมถึง ประกอบด้วยทรายหยาบ ทรายละเอียดและตะกอนบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง ซึ่งประกอบด้วย ทรายละเอียดสลับชั้นกับดินเหนียว


ธรณีวิทยาของกลุ่มน้ำห้วยใจ้ประกอบด้วยหินทรายปนควอร์ตไซต์ (quartzitic sandstone) และหินทรายปนเฟลด์สปาร์ (feldspartic sandstone) แทรกสลับกับหินดินดานของหินชุดแม่ทายุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous Mae Tha Groups) ซ้อนทับอย่างไม่ต่อเนื่องบนหินดินดานยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน (Silurian - Devonian Shale) มีรอยเลื่อนทุดตัว (block faults) ปรากฏในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้บริเวณปลายความลาดชันของภูเขา (ภาพที่ 4.4) หุบเขาเล็กๆ ในกลุ่มภูเขาสวนนอกรอบเทือกเขาขุนตาลนี้มีห้วยต้นกอกซึ่งเกิดจากรอยเลื่อนและเป็นทางน้ำสาขาของห้วยใจ้วางตัวในแนวเฉียงเหนือของตะวันตกเฉียงเหนือและเฉียงใต้ของตะวันตกเฉียงใต้ (NNW-SSE) ซึ่งมีทิศทางในแนวเดียวกันกับรอยเลื่อนอื่นๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กวง ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Sukwattananunt และ Assuapatchara (1992) และ Hinthong (1993)

ธรณีสัณฐานบริเวณลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ้ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขา (mountainous area) ตะพักลำน้ำระดับสูง (high terrace) ตะพักลำน้ำระดับต่ำ (low terrace) และ ที่ราบน้ำท่วมถึง (floodplain) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Thanadpipat และคณะ (1982) และ Thanadpipat และคณะ (1989) ดังรายละเอียด

1) ตะพักลำน้ำระดับสูง (high terrace) ตะพักลำน้ำระดับสูงปรากฏเป็นแนวยาวบริเวณขอบของแอ่งสะสมตะกอน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยก้อนกรวด (gravel) และทราย (sand) มีขนาดไม่สม่ำเสมอ มีรูปร่าง ค่อนข้างกลม (subrounded) ถึงกลม (rounded) ก้อนหินมนใหญ่ (boulder) และก้อนกรวด (gravel) ซึ่งพัฒนามาจากการสลายตัวและการพังทลายของหินทราย



(sandstone) หินควอร์ตไซต์ (quartzite) ที่มีชั้นหินดินดาน (shale) บางๆ แทรกอยู่ ตะกอนหน่วยนี้มีปริมาณดินเหนียวเพียงเล็กน้อย



ภาพที่ 4.4 ลักษณะธรณีสัณฐานของกลุ่มน้ำเชิงเขา ห้วยใจ

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2538)

2) ตะกอนน้ำระดับต่ำ (low terrace) ตะกอนน้ำระดับต่ำปรากฏเป็นแนวยาวระหว่างตะกอนน้ำระดับสูง (high terrace) และพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง ตะกอนหน่วยนี้มีขนาดอนุภาคละเอียดเป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ดินเหนียวเคโอลิไนต์ (Kaolinitic clay) แทรกด้วยทรายและก้อนกรวดรูปร่างของก้อนกรวดเป็นเหลี่ยม (angular) ถึงค่อนข้างเหลี่ยม (subangular) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแร่เขี้ยวหนุมาน (quartz)




3) ที่ราบน้ำท่วมถึง (floodplain) ที่ราบน้ำท่วมถึงเป็นพื้นที่ส่วนน้อยของพื้นที่ต่ำตอนล่างต่อจากตะพักลำน้ำระดับต่ำ (low terrace) เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งทับถมธารน้ำพา (fluvial deposition) โดยลำน้ำสายหลักของแอ่งสะสมตะกอนเชิงใหม่ (แม่น้ำปิง) ที่ราบน้ำท่วมถึงประกอบด้วยตะกอนน้ำพา (alluvial sediments) ซึ่งเป็นทรายละเอียดที่มีการคัดขนาดอย่างดีสลับชั้นกับดินเหนียวหนาประมาณ 2-3 เมตร ความหนาของการตกตะกอนนี้ประมาณ 4 เมตร


#### 4.1.2 ลักษณะภูมิฐานของลุ่มน้ำ

การศึกษาลักษณะภูมิฐานของลุ่มน้ำโดยการตรวจวัดจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มน้ำ ความลาดชันและความยาวของลำน้ำ ความลาดชันของพื้นที่ลุ่มน้ำ ทิศด้านลาดของพื้นที่ลุ่มน้ำ ความหนาแน่นของการระบายน้ำ รูปทรงและรูปร่างของลำน้ำ โดยสรุปได้ว่า ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจมีรูปร่างเรียวยาวและหักงอคล้ายบูเมอแรง ครอบคลุมพื้นที่ 17.58 ตารางกิโลเมตร ตำแหน่งละติจูด 18 องศา 54 ลิปดาเหนือ ถึง 18 องศา 59 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 99 องศา 00 ลิปดาตะวันออก ถึง 99 องศา 06 ลิปดา ตะวันออก ดังภาพที่ 4.5 – 4.6

เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ มีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากพื้นที่ลุ่มน้ำที่สูงตอนบนและลุ่มน้ำที่สูงตอนกลาง กล่าวคือ ลุ่มน้ำเชิงเขาเป็นพื้นที่รับน้ำที่อยู่ในกลุ่มภูเขารอบนอกของแนวเทือกเขา จึงมีความสูงและความลาดชันไม่มาก มักปกคลุมด้วยป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ มีลำธารสายสั้นๆ ระบายน้ำลงสู่ที่ราบน้ำท่วมถึงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุของการเกิดอุทกภัยในฤดูฝน และมักขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ลักษณะภูมิฐานที่สำคัญอีกลักษณะหนึ่งของลุ่มน้ำเชิงเขา คือ มักมีที่ราบระหว่างหุบเขาแคบๆ ซึ่งมีความกว้างประมาณ 200 - 500 เมตร ที่ราบบริเวณนี้เป็นพื้นที่สะสมตะกอน เนื่องจากที่ราบนี้ต่อเนื่องจากลาดเขาและสันเขา มีความลาดชันมากกว่าเมื่อฝนตกลงมามากกว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินบริเวณลาดเขาและสันเขา จึงเกิดน้ำไหลบ่าเหนือดินลงสู่บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา ปริมาณน้ำนี้จะถูกกักเก็บไว้โดยตะกอนบริเวณที่ราบ และจะระบายสู่ลำธารอย่างช้าๆ ซึ่งจะแสดงผลการวิเคราะห์ห้อย่างละเอียดในผลการศึกษาด้านกราฟน้ำท่า ลักษณะภูมิฐานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขานี้แสดงในแผนที่แสดงความลาดชันของลุ่มน้ำในภาพที่ 4.5 และแสดงภาพตัดขวางของพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยใจ ในภาพที่ 4.7- 4.8




ภาพที่ 4.5 ลักษณะภูมิประเทศ ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ




ภาพที่ 4.6 ภาพสามมิติ ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ

ความสูงเฉลี่ยของลุ่มน้ำห้วยใจ 450 เมตรจากระดับน้ำ ณ ช่วงระดับความสูง 375 - 872 m MSL ความลาดชันสูงสุดในพื้นที่ 43% โดยมีความลาดชันเฉลี่ยทั้งพื้นที่ 17.5 เปอร์เซ็นต์ ระบบการระบายน้ำ (drainage pattern) ดีกว่าตอนล่าง สำหรับความหนาแน่นในการระบายน้ำ 1,024 ต่อตารางกิโลเมตร ความแตกต่างของระดับความสูงระหว่างต้นน้ำและปลายน้ำมีมาก ขณะที่จุดกึ่งกลางลุ่มน้ำอยู่ ณ ระดับ 450 เมตร จากระดับน้ำทะเล






ภาพที่ 4.7 ก ตัดขวางแนวเหนือ - ใต้




ภาพที่ 4.7 ข ตัดขวางแนวตะวันออก - ตะวันตก



ภาพที่ 4.8 ลักษณะความลาดชันของกลุ่มน้ำ

#### 4.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินและพืชพรรณในพื้นที่ลุ่มน้ำ

จากการสำรวจพื้นที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มน้ำห้วยใจ พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยใจตอนบนเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยใจปกคลุมด้วยป่าธรรมชาติ 70 เปอร์เซ็นต์ บริเวณตอนล่างของพื้นที่ลุ่มน้ำมีสภาพภูมิประเทศค่อนข้างราบจึงมีการใช้ที่ดินหลายประเภทได้แก่ สวนผลไม้ ทุ่งนา และที่อยู่อาศัย (บ้านโปง) พื้นที่สวนผลไม้เป็นแนวยาวแคบๆ ตลอดแนวห้วยใจตอนล่าง ทุ่งนากระจายบริเวณพื้นที่ราบตอนล่าง พื้นที่ชุมชนและสวนผลไม้พบในบริเวณบ้านโปง (ภาพที่ 4.9 และ ตารางที่ 4.3) ผลการศึกษานิคมและพรรณไม้ในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณใกล้เคียงกับการศึกษาพันธุ์กรรมพืชโดยโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริรายละเอียดของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2543) ดังรายละเอียดต่อไปนี้



ภาพที่ 4.9 การใช้ประโยชน์ที่ดินและพืชพรรณในพื้นที่ลุ่มน้ำ


ตารางที่ 4.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ำห้วยไฉ่

| Land use type                                             | Area (km <sup>2</sup> ) | Percentage of cover area |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ป่าไม้                                                    | 11.655                  | 69.5                     |
| • ป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest)                     | 7.385                   | 53.0                     |
| • ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest)                    | 0.575                   | 3.0                      |
| • ป่าเบญจพรรณชื้น (Moist mixed deciduous forest)          | 1.375                   | 7.5                      |
| • ป่าเต็งรังพัฒนา (Abundance dry dipterocarp forest)      | 2.875                   | 2.3                      |
| สวนไม้ผล และสวนผสม (Orchard)                              | 1.50                    | 5.7                      |
| นาข้าว พืชไร่และพืชผัก (Paddy field mixed with cash crop) | 1.005                   | 14.0                     |
| หมู่บ้านและอาคารสิ่งก่อสร้าง (Human settlement)           | 2.425                   | 8.5                      |
| รวมพื้นที่ (Total area)                                   | 17.58                   | 100                      |



#### 4.1.4 ลักษณะปฐพีลุ่มน้ำ

ผลการสำรวจดินบริเวณลุ่มน้ำห้วยไจ้สามารถจำแนกดินในระดับชุดดินประกอบ ด้วย ชุดดินรือเสาะ (Ruso series) ชุดดินสายบุรี (Sai Buri) และ ชุดดินธัญบุรี (Thanyaburi Series) ซึ่งเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินประเภทหินทราย และหินควอร์ตไซต์ พบชุดดินรือเสาะบริเวณเชิงเขา และตะพักลำน้ำระดับสูง และบริเวณตะพักลำน้ำระดับสูง และพบชุดดินสายบุรีและชุดดินธัญบุรีพบ บริเวณตะพักลำน้ำระดับต่ำ ส่วนพื้นที่สูงไม่สามารถจำแนกชุดดินได้ เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง (slope complex) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการสำรวจดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อ พ.ศ. 2528 ดังมี รายละเอียดของแต่ละชุดดินแสดงในภาคผนวกที่ 1 (ภาพที่ 4.10 และตารางที่ 4.4)



ภาพที่ 4.11 แผนที่ชุดดินของกลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2539)

ตารางที่ 4.2 ชุมดินที่ปรากฏในพื้นที่ลุ่มน้ำ

| ชุดดิน | ชื่อชุดดิน           | กลุ่มดิน          | เนื้อดิน                           |
|--------|----------------------|-------------------|------------------------------------|
| 62     | ดินภูเขา             | Slope complex     | -                                  |
| 48C    | รือเซาะ (Ruso)       | Paleustults       | Clayey skeletal, mixed, Kaolinitic |
| 22     | ธัญบุรี (Thanyaburi) | Typic Ochraqualfs | Coarse loamy                       |
| 44     | คล้ายดินชุดสายบุรี   | Ustoxic Quartzips | Sandy, siliceous                   |

ผลจากการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างดินใน 3 ระดับ คือ ระดับความลึกที่ 0 – 10, 10 – 20, 20 – 30 เซนติเมตร ของแปลงศึกษาวิจัย ทั้ง 5 พื้นที่ พบว่า

1. ลักษณะเนื้อดินของป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เป็นเนื้อดินชนิดเดียวกัน คือ ดินร่วนทราย (sandy loam) ต่างกับเนื้อดินของป่าเต็งรังรุ่น 2 ซึ่งเป็นเนื้อดินชนิดดินร่วน (loam) และพื้นที่ป่าปลูกกับสวนมะม่วงเป็นดินร่วนทราย (sandy loam) ในระดับดินบน และเป็นดินทรายร่วน (loam sandy) ในระดับดินล่าง

2. ค่าความเป็นกรด – ด่าง ของดินทั้ง 5 พื้นที่ มีค่าที่ใกล้เคียงกัน คือ อยู่ในระดับ 5.1 – 5.9

3. ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (OM) เฉลี่ยในดินของพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังแคะ ป่าเต็งรังรุ่น 2 ป่าปลูก และสวนมะม่วง มีเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกัน คือ 1.96, 1.69, 1.39, 1.12 และ 0.99 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

4. ดินที่มีเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนรวมสูงสุด ได้แก่ ดินบริเวณพื้นที่ป่าเต็งรังแคะ เท่ากับ 0.122 เปอร์เซ็นต์ ส่วนดินที่มีเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนรวมต่ำสุด ได้แก่ ดินบริเวณพื้นที่ป่าเบญจพรรณ เท่ากับ 0.052 เปอร์เซ็นต์

5. ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์พบสูงสุดในดินบริเวณพื้นที่ป่าเต็งรังแคะ เท่ากับ 40.85 ppm. รองลงมาได้แก่ดินพื้นที่ป่าเต็งรังรุ่น 2 เท่ากับ 33.33 ppm และดินที่มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์พบต่ำที่สุด คือดินพื้นที่ป่าปลูก เท่ากับ 7.96 ppm

6. ปริมาณโปแตสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้พบสูงสุดในบริเวณดินพื้นที่สวนมะม่วง เท่ากับ 185 ppm รองลงมาคือดินพื้นที่ป่าเต็งรังแคะ เท่ากับ 127 ppm และดินป่าเบญจพรรณ เท่ากับ 116 ppm ส่วนดินในพื้นที่ป่าเต็งรังรุ่น 2 และป่าปลูก ตรวจพบได้น้อยมากจนไม่สามารถอ่านค่าได้ในส่วนของพื้นที่ป่าเต็งรังแคะและสวนมะม่วง ก็จะตรวจพบปริมาณโปแตสเซียมได้ในดินชั้นบนเท่านั้น ส่วนในดินชั้นล่างจะพบได้น้อยมากจนไม่สามารถอ่านค่าได้เช่นกัน

7. ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้พบสูงสุดในดินพื้นที่ป่าเบญจพรรณ เท่ากับ 733 ppm รองลงมาคือดินพื้นที่ป่าปลูก เท่ากับ 705 ppm และที่พบได้ต่ำสุด คือดินป่าเต็งรังรุ่น 2 เท่ากับ 104 ppm

8. ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้พบสูงสุดในดินพื้นที่ป่าเบญจพรรณ เท่ากับ 117 ppm รองลงมาคือดินพื้นที่ป่าเต็งรังแคะ เท่ากับ 110 ppm และพบได้ต่ำสุด คือดินพื้นที่ป่าเต็งรังรุ่น 2 เท่ากับ 32 ppm



ผลการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อดิน และปริมาณธาตุอาหาร จะเห็นว่าดินที่มีคุณสมบัติทางเคมี และมีความอุดมสมบูรณ์สูงสุด ในพื้นที่ป่าทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่ ดินป่าเบญจพรรณ ส่วนดินที่มีปริมาณธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ต่ำสุด ได้แก่ ดินป่าเต็งรังรุ่นสอง ดังตาราง

ตารางที่ 4.3 แสดงลักษณะเนื้อดินและปริมาณธาตุอาหารจากแปลงทดลอง

| พื้นที่ทดลอง      | %Slope | ความลึก(ซม.) | เนื้อดิน   | ทั้งหมด(%) |      |       | ที่เป็นประโยชน์ | ที่แลกเปลี่ยนได้ (ppm.) |     |      |
|-------------------|--------|--------------|------------|------------|------|-------|-----------------|-------------------------|-----|------|
|                   |        |              |            | pH         | OM   | N     | P               | K                       | Ca  | Mg   |
| 1.ป่าเบญจพรรณ     | 25.5   | ระดับ 0-10   | Sandy loam | 5.4        | 2.85 | 0.052 | 14.51           | 116                     | 733 | 117  |
|                   |        | ระดับ 10-20  | Sandy loam | 6.1        | 1.93 | 0.035 | 9.67            | 108                     | 375 | 77   |
|                   |        | ระดับ 20-30  | Sandy loam | 5.7        | 1.11 | 0.052 | 3.03            | 19                      | 156 | 45   |
| 2.ป่าเต็งรังแคะ   | 32.5   | ระดับ 0-10   | Sandy loam | 5.1        | 3.1  | 0.122 | 40.85           | 127                     | 562 | 110  |
|                   |        | ระดับ 10-20  | Sandy loam | 5.1        | 1.16 | 0.07  | 35.55           | T                       | 40  | 20   |
|                   |        | ระดับ 20-30  | Sandy loam | 5.3        | 0.83 | 0.052 | 36.13           | T                       | 92  | 22   |
| 3.ป่าเต็งรังรุ่น2 | 29     | ระดับ 0-10   | Loam       | 5.2        | 1.58 | 0.087 | 33.33           | T                       | 104 | 32   |
|                   |        | ระดับ 10-20  | Loam       | 5.1        | 1.42 | 0.07  | 33.92           | T                       | 92  | 18   |
|                   |        | ระดับ 20-30  | Loam       | 4.9        | 1.18 | 0.087 | 19.21           | T                       | T   | 5.31 |
| 4.ป่าปลุก         | 11.5   | ระดับ 0-10   | Sandy loam | 5.6        | 1.58 | 0.07  | 7.96            | T                       | 705 | 63   |
|                   |        | ระดับ 10-20  | Loam sandy | 5.7        | 1.25 | 0.07  | 9.92            | T                       | 659 | 63   |
|                   |        | ระดับ 20-30  | Loam sandy | 5.8        | 0.54 | 0.035 | 3.58            | T                       | 514 | 51   |
| 5.สวนมะม่วง       | 10     | ระดับ 0-10   | Sandy loam | 5.9        | 1.63 | 0.105 | 21.04           | 185                     | 325 | 85   |
|                   |        | ระดับ 10-20  | Sandy loam | 5.8        | 0.81 | 0.07  | 11.05           | 50                      | 48  | 24   |
|                   |        | ระดับ 20-30  | Loam sandy | 5.7        | 0.53 | 0.07  | 5.21            | T                       | T   | T    |

Trace = น้อยมากจนไม่สามารถตรวจวัดได้

## 4.2 ลักษณะภูมิอากาศ

จากข้อมูลลักษณะอากาศในรอบ 34 ปี ของสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(สถานีอากาศเกษตรแม่ใจ) ซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งพิกัดที่ 18.55.00 N, 99.00.00 E, สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 316.53 MSL. จากปี 2512 ถึง 2545 พบว่า เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือเดือนพฤษภาคม เท่ากัน 41.6 องศา เดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือเดือนมกราคม เท่ากับ 4.0 องศา มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุด เท่ากับ 31.8 และ 19.7 องศา ตามลำดับ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุด เท่ากับ 96 และ 46 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดในรอบ 34 ปี ได้แก่เดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย เท่ากับ 1106.2 มิลลิเมตรต่อปี เดือนที่มีปริมาณน้ำฝนรายวันสูงสุดคือเดือนกรกฎาคม เท่ากับ 163.4 มิลลิเมตรต่อวัน และเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนรายวัน


เฉลี่ยต่ำสุด คือเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 15 มิลลิเมตรต่อวัน อัตราการระเหยของน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 มิลลิเมตรต่อวัน (หรือ 1,642.5 มิลลิเมตรต่อปี) เดือนที่มีปริมาณช่วงแสงสูงสุดคือเดือน พฤษภาคม เท่ากับ 12 ชั่วโมงต่อวัน และเดือนที่มีปริมาณช่วงแสงต่ำสุดคือเดือนกรกฎาคม เท่ากับ 3.6 ชั่วโมงต่อวัน ดังตารางที่ 4.7

ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไจ้ ตั้งอยู่บริเวณแอ่งสะสมตะกอนเชียงใหม่ ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศแบบสะวันนาเขตร้อน (tropical savannah climate) ได้รับอิทธิพลหลักจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและอิทธิพลรองจากพายุหมุนเขตร้อน (tropical cyclone) ทำให้เกิดลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูหนาวจากเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากภาพที่ 4.17 และตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลอากาศอากาศประจำถิ่นของสถานีตรวจวัดอากาศ โครงการศึกษาและพัฒนาลุ่มน้ำเชิงเขา ณ ได้อ่างเก็บน้ำห้วยไจ้ (พิกัด 199500N, 050765E) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2545

ตารางที่ 4.4 ลักษณะอากาศ ลุ่มน้ำห้วยไจ้ ปี 2542 - 2544

| เดือน         | ปริมาณ<br>ฝนรายเดือน<br>(mm) | การระเหย<br>(mm) | อุณหภูมิเฉลี่ย | ความชื้น<br>สัมพัทธ์<br>(%) | ความเร็วลม<br>(notch) |
|---------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| มกราคม        | 12.3                         | 88.8             | 18.2           | 62.4                        | 3.6                   |
| กุมภาพันธ์    | 0.0                          | 132.5            | 22.1           | 64.0                        | 3.9                   |
| มีนาคม        | 28.1                         | 173.3            | 24.1           | 59.3                        | 5.8                   |
| เมษายน        | 70.6                         | 258.4            | 26.9           | 63.0                        | 4.8                   |
| พฤษภาคม       | 148.1                        | 197.3            | 24.8           | 61.8                        | 3.9                   |
| มิถุนายน      | 189.7                        | 89.2             | 23.4           | 73.6                        | 3.3                   |
| กรกฎาคม       | 172.3                        | 84.8             | 23.0           | 75.3                        | 2.8                   |
| สิงหาคม       | 231.6                        | 77.4             | 22.8           | 76.9                        | 2.9                   |
| กันยายน       | 157.8                        | 72.9             | 22.5           | 78.0                        | 3.6                   |
| ตุลาคม        | 146.8                        | 69.7             | 21.5           | 77.5                        | 2.0                   |
| พฤศจิกายน     | 90.6                         | 69.3             | 20.8           | 72.5                        | 2.4                   |
| ธันวาคม       | 48.2                         | 74.1             | 20.8           | 67.4                        | 2.8                   |
| รวม<br>เฉลี่ย | 1,296.1                      | 1,387.7          | 22.6           | 69.3                        | 3.7                   |






ภาพที่ 4.11 ลักษณะอากาศประจำถิ่นของกลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไจ้

เดือนมีนาคมและเมษายนเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีประมาณ 1296.1 มิลลิเมตร และมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด 231.6 มิลลิเมตร ในเดือนสิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18 ถึง 27 องศาเซลเซียสตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย มีค่าต่ำสุด 59.3 % ถึงค่าสูงสุด 78 % ในเดือนมีนาคม และกันยายนตามลำดับ ความชื้นสัมพัทธ์และการคายระเหยมีความสัมพันธ์กันแบบผกผัน ความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำฝน


## บทที่ 5 ผลการศึกษาวิจัย

### 5.1 ลักษณะของฝน

การวิเคราะห์พฤติกรรมของฝน (rainfall characteristics) โดยพิจารณาเฉพาะวันที่มีฝนตกฝนในเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ช่วงแรก (ปี พ.ศ. 2541-2542 ก่อนมีคันหินกั้นน้ำ) และ ช่วงที่ 2 ( พ.ศ. 2543 – 2545 มีคันหินกั้นน้ำ) พบว่า ลักษณะของฝนทั้งสองช่วงใกล้เคียงกัน ขณะที่ปี 2544 มีฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด ดังภาพที่ 5.1ก-ข



ภาพที่ 5.1 ก




ภาพที่ 5.1 ข

ภาพที่ 5.1 เปรียบเทียบลักษณะของฝน ระหว่าง ปี 2544 - 2545



ลักษณะความชื้นของฝนในเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ตลอดช่วงการศึกษามีใกล้เคียงกัน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนและหลังมีคันหินชลอน้ำพบว่า ความชื้นชั้นของฝนช่วงหลังมีสูงกว่า โดยเฉพาะวันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 (79 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) ซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณต้นน้ำห้วยต้นกอกและห้วยมะปรางเกิดแผ่นดินถล่มบริเวณร่องน้ำ ระยะทางยาวประมาณ 0.5 กิโลเมตร และ 1.5 กิโลเมตร ตามลำดับ (ภาพ ที่ 5.2)



ภาพที่ 5.2 เปรียบเทียบความชื้นของฝนระหว่าง ปี 2544 - 2545


การศึกษาวิจัย ใช้ระยะเวลา 2 ปี ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล เริ่มตั้งแต่ ปี 2544 ถึงปี 2545 ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลที่อยู่ในช่วงปี 2544 และปี 2545 เท่านั้น การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาถึงปัจจัยจากอิทธิพลของฝน ที่ส่งผลต่อการชะล้างพังทลายของดิน ดังนั้นการเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นข้อมูลด้านพลังงานของฝน จากสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ (สถานีอากาศเกษตร แม่โจ้) พบว่า ปริมาณน้ำฝนรวมปี 2544 และปี 2545 มีปริมาณเท่ากับ 928 และ 807 มิลลิเมตร ตามลำดับ สำหรับปริมาณน้ำฝนจากสถานีตรวจอากาศย่อย อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ใช้ข้อมูลในช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน มีปริมาณน้ำฝนรวมในปี 2544 และปี 2545 เท่ากับ 894 และ 1,142 มิลลิเมตร ตามลำดับ

### 5.2.1 ปัจจัยน้ำฝนที่มีผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดิน


ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ศึกษาในช่วงระยะเวลา 2 ปี ซึ่งปัจจัยด้านน้ำฝนที่มีผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านปริมาณน้ำฝนรายวัน 2) ปัจจัยด้านพลังงานของน้ำฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ), และ 3) ปัจจัยด้านพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R-factor) โดยนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ สามารถอธิบายรายละเอียด ดังนี้

1) จากข้อมูลค่าปัจจัยด้านปริมาณน้ำฝนรายวัน ระหว่าง ปี 2544 และปี 2545 พบว่า ปริมาณน้ำฝนรายวันสะสมและจำนวนพายุฝนที่เกิดขึ้นในปี 2544 จะมีจำนวนน้อยกว่าพายุฝนที่เกิดขึ้นในปี 2545 แต่จะมีอัตราการตกของน้ำฝนรายวันที่รุนแรงกว่า ดังภาพที่ 5.2

ปี 2544 และปี 2545 พบว่า อัตราการตกของฝนในช่วง มากกว่า 0.1 ถึง 5 มิลลิเมตรต่อวัน มีปริมาณความถี่ของวันที่ฝนตกมากที่สุด ส่วนปริมาณน้ำฝนรายวันที่ตกสูงที่สุด อยู่ในช่วงมากกว่า 100.1 มิลลิเมตรต่อวัน และจากการเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายวัน ในปี 2544 พบว่ามีจำนวนวันที่ฝนตกน้อยกว่าในปี 2545 คือ 62 และ 85 วัน ตามลำดับ ดังภาพที่ 5.3



ภาพที่ 5.3 เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายวัน (accumulative daily rainfall) สะสม




ภาพที่ 5.4 เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายวัน (range: daily rainfall)




2) จากการเปรียบเทียบค่าพลังงานของน้ำฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) พบว่า ปี 2544 เกิดพลังงาน  $I_{30-max}$  น้อยกว่าปี 2545 หากเปรียบเทียบค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  ตามระดับความรุนแรง พบว่า ในปี 2544 เกิดค่าพลังงานที่รุนแรงมากกว่าในปี 2545 ซึ่งพิจารณาได้จากความลาดชันของเส้นกราฟ ที่แตกต่างกันในทั้ง 2 ปี โดยปี 2545 นั้น เส้นกราฟที่แสดงค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  มีความชันสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่างกับปี 2544 ที่เส้นกราฟจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในระดับสม่ำเสมอเป็นปกติ ดังภาพที่ 5.4

ค่าพลังงานของน้ำฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) ในปี 2544 และปี 2545 ช่วงค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  ที่เกิดขึ้นและมีความเข้มข้นสูงสุดจะอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 15 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ส่วนค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  ที่มีอัตราความรุนแรงสูงสุดที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วง 60.1 ถึง 65 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง มีค่าน้อยมาก ดังภาพที่ 5.5



ภาพที่ 5.5 เปรียบเทียบค่าพลังงานของน้ำฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ )  
สะสม




ภาพที่ 5.6 เปรียบเทียบลำดับค่าพลังงานของน้ำฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที (range :  $I_{30-max}$ )

3) จากการเปรียบเทียบค่าพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R-factor) ระหว่างปี 2544 และปี 2545 พบว่า ค่าพลังงานของฝน ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าปริมาณน้ำฝนรายวัน แต่จะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  ที่เกิดขึ้น จากภาพที่ 5.6 พบว่า ค่าพลังงานของฝน สะสมของปี 2544 จะมีอัตราน้อยกว่าปี 2545 เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนการเกิดของพายุฝน ขณะเดียวกัน ค่าพลังงานของฝนของปี 2544 จะมีระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความรุนแรงมากกว่า พิจารณาจากเส้นกราฟที่มีความลาดชันสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนเส้นกราฟที่แสดงถึงค่าพลังงานของฝน ของปี 2545 มีการสะสมและเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ และมีระดับความรุนแรงสูงสุด ต่ำกว่าปี 2544

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R-factor) ในปี 2544 และปี 2545 พบว่า พลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน ที่เกิดขึ้นและมีความถี่มากที่สุดจะอยู่ในช่วง มากกว่า 0.1 ถึง 500 ส่วนค่าพลังงานของฝน (R-factor) ที่เกิดขึ้นและมีความรุนแรงสูงสุด จะอยู่ในช่วง 9,000.1 ถึง 9,500 มีค่าน้อยมาก ดังภาพที่ 5.7





ภาพที่ 5.7 เปรียบเทียบพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R-factor) สะสม



ภาพที่ 5.8 เปรียบเทียบลำดับค่าพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (range: R-factor)

## 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน้ำฝนต่อการชะล้างพังทลายของดิน

จากการศึกษาในลักษณะการใช้พื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ประเภท ดังตารางที่ 4.6 ซึ่งโดยใช้ปัจจัยด้านน้ำฝน ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ ค่าปริมาณน้ำฝนรายวัน (daily rainfall) ค่าพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) และ ค่าพลังงานของน้ำฝนที่ก่อให้เกิดการสูญเสียดิน (R – factor) จากปัจจัยดังกล่าวนำค่าที่ได้มาหาค่าสหสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปัจจัยทั้ง 3 ชนิด ต่อการเกิดปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) และปริมาณตะกอนที่ถูกพัดพาออกจากพื้นที่

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่แปลงทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) แปลงศึกษาปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K – factor) และ 2) แปลงศึกษาปัจจัยพืชพรรณปกคลุมดิน (C – factor) นำไปเปรียบเทียบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านน้ำฝนทั้ง 3 ชนิด ที่เกิดขึ้นต่อการเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินและการชะล้างตะกอนออกจากพื้นที่ของแต่ละแปลงศึกษาข้างต้น ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ผลการศึกษาดังนี้

5.2.1 ปัจจัยน้ำฝนทั้ง 3 ลักษณะ ที่ส่งผลต่อการเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ในแปลงศึกษาปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K – factor)

1) ปริมาณน้ำฝนรายวันมีอิทธิพลที่ทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินได้ในแปลงศึกษาทั้ง 5 พื้นที่ แต่ปี 2544 จะได้รับอิทธิพลน้อยกว่าในปี 2545 อาจเป็นเพราะปริมาณน้ำฝนที่ตกปี 2544 มีอัตราการตกน้อยกว่าปี 2545 อีกทั้งช่วงระยะเวลาการตกของฝนรวมทั้งความสม่ำเสมอของฝนมีลักษณะยาวนานและสม่ำเสมอกว่าปี 2544 ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินในแปลงศึกษาได้ ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนรายวัน(daily rainfall) ต่อปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) จากแปลงปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor)

| พื้นที่            | daily rainfall / runoff / ปี 2544      | daily rainfall / runoff / ปี 2545      |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.ป่าเบญจพรรณ      | $r = 1.265(d) + 3.7954, R^2 = 0.5665$  | $r = 2.7172(d) + 2.8757, R^2 = 0.6915$ |
| 2.ป่าเต็งรังแคว    | $r = 0.8831(d) + 8.5226, R^2 = 0.8135$ | $r = 3.0136(d) - 35.806, R^2 = 0.8285$ |
| 3.ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $r = 1.3961(d) + 27.55, R^2 = 0.6163$  | $r = 3.4527(d) + 7.8153, R^2 = 0.8293$ |
| 4.ป่าปลูก          | $r = 0.381(d) + 5.6188, R^2 = 0.7200$  | $r = 0.7752(d) + 2.7859, R^2 = 0.9206$ |
| 5.สวนมะม่วง        | $r = 0.3443(d) + 3.2393, R^2 = 0.6449$ | $r = 0.5161(d) - 0.4728, R^2 = 0.9183$ |

2) ค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนของทั้ง 2 ปี มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดิน ในแปลงศึกษาได้ค่อนข้างน้อยมาก หากเปรียบเทียบอิทธิพลของค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  ต่อการเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดิน ระหว่างปี 2544 และปี 2545 พบว่า ปี 2544 ค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  มีอิทธิพลทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินได้สูงกว่า ปี 2545 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากค่าความรุนแรงของค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  สะสม ของปี 2544 มีมากกว่า จึงมีผลทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินได้สูงกว่า ดังตารางที่ 5.2



ตารางที่ 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) ต่อปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ในแปลงปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor)

| พื้นที่             | $I_{30-max}$ / runoff / ปี 2544        | $I_{30-max}$ / runoff / ปี 2545        |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ      | $r = 1.558(i) + 33.112, R^2 = 0.2547$  | $r = 3.4576(i) + 35.17, R^2 = 0.4515$  |
| 2. ป่าเต็งรังแคระ   | $r = 1.4067(i) + 3.2336, R^2 = 0.549$  | $r = 2.6742(i) - 4.9368, R^2 = 0.2631$ |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $r = 2.5412(i) + 12.24, R^2 = 0.544$   | $r = 3.1118(i) + 42.201, R^2 = 0.271$  |
| 4. ป่าปลูก          | $r = 0.6624(i) + 2.1273, R^2 = 0.579$  | $r = 0.8341(i) + 6.8531, R^2 = 0.419$  |
| 5. สวนมะม่วง        | $r = 0.6403(i) - 0.9542, R^2 = 0.5887$ | $r = 0.5348(i) + 2.7066, R^2 = 0.366$  |

3) ค่าพลังงาน R – factor มีอิทธิพลทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินในแปลงศึกษา ทั้ง 5 พื้นที่ ได้ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณน้ำฝนรายวัน คือ หากกลุ่มพายุฝนกลุ่มใด มีปริมาณน้ำฝนรายวันที่ตกในอัตราส่วนที่สูง ก็จะมีผลทำให้ค่าพลังงาน R – factor มีค่าสูงตามไปด้วย ซึ่งมีอิทธิพลทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินได้เช่นกัน ดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R – factor) ต่อปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ในแปลงปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor)

| พื้นที่             | R – factor / runoff / ปี 2544          | R – factor / runoff / ปี 2545          |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ      | $r = 0.0066(R) + 51.489, R^2 = 0.5352$ | $r = 0.0172(R) + 66.466, R^2 = 0.5166$ |
| 2. ป่าเต็งรังแคระ   | $r = 0.0045(R) + 18.12, R^2 = 0.7521$  | $r = 0.0203(R) + 3.1256, R^2 = 0.7034$ |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $r = 0.007(R) + 43.502, R^2 = 0.5356$  | $r = 0.0192(R) + 61.698, R^2 = 0.481$  |
| 4. ป่าปลูก          | $r = 0.002(R) + 9.6713, R^2 = 0.6828$  | $r = 0.0051(R) + 12.243, R^2 = 0.7231$ |
| 5. สวนมะม่วง        | $r = 0.0018(R) + 6.8689, R^2 = 0.5892$ | $r = 0.0034(R) + 5.9214, R^2 = 0.6723$ |

5.2.2 ผลการศึกษาปัจจัยด้านน้ำฝนทั้ง 3 ชนิด ที่ส่งผลกระทบต่อการพัดพาตะกอน (sediment) ในแปลงศึกษาปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K – factor)

1) ปริมาณน้ำฝนรายวันมีอิทธิพลที่ทำให้เกิดการชะล้างพัดพาตะกอนออกจากพื้นที่ได้ค่อนข้างน้อยมาก หรืออาจกล่าวได้ว่า ปริมาณน้ำฝนรายวันไม่มีผลต่อการพัดพาตะกอนออกจากพื้นที่ศึกษา ทั้ง 5 พื้นที่ ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ทั้งปี 2544 และปี 2545 ดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนรายวัน (daily rainfall) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ในแปลงปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor)

| พื้นที่             | daily rainfall / sediment / ปี 2544   | daily rainfall / sediment / ปี 2545   |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ      | $s = 24.538(d) + 41.251, R^2 = 0.41$  | $s = 61.59(d) + 259.49, R^2 = 0.214$  |
| 2. ป่าเต็งรังแคระ   | $s = 2.122(d) + 15.807, R^2 = 0.2286$ | $s = 11.196(d) - 66.727, R^2 = 0.197$ |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $s = 8.1871(d) + 129.92, R^2 = 0.472$ | $s = 21.585(d) - 98.075, R^2 = 0.261$ |
| 4. ป่าปลูก          | $s = 1.396(d) + 30.53, R^2 = 0.3182$  | $s = 23.909(d) - 186.98, R^2 = 0.101$ |
| 5. สวนมะม่วง        | $s = 2.5311(d) - 5.374, R^2 = 0.4899$ | $s = 6.3646(d) - 23.446, R^2 = 0.304$ |

2) ค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  มีอิทธิพลทำให้เกิดการชะล้างตะกอนของปี 2544 ได้สูงกว่าในปี 2545 ทั้ง 5 พื้นที่ และพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากพลังงาน  $I_{30-max}$  มากที่สุด คือพื้นที่ป่าเต็งรังรุ่นสอง พื้นที่ป่าปลูก พื้นที่สวนมะม่วง ซึ่งในปี 2544 จะได้รับอิทธิพลมากกว่าในปี 2545 อาจมีสาเหตุมาจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดินใหม่ และไม่มีพืชพรรณปกคลุมหน้าดิน จึงมีผลทำให้เกิดการชะล้างพัดพาตะกอนในพื้นที่ได้สูง ดังตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ในแปลงปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor)

| พื้นที่             | $I_{30-max}$ / sediment / ปี 2544     | $I_{30-max}$ / sediment / ปี 2545      |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ      | $s = 64.896(i) - 671.01, R^2 = 0.764$ | $s = 182.66(i) - 2249.2, R^2 = 0.7599$ |
| 2. ป่าเต็งรังแคระ   | $s = 7.0302(i) - 76.853, R^2 = 0.668$ | $s = 32.826(i) - 420.68, R^2 = 0.6831$ |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $s = 22.516(i) - 126.63, R^2 = 0.952$ | $s = 57.418(i) - 660.31, R^2 = 0.7459$ |
| 4. ป่าปลูก          | $s = 4.5211(i) - 28.152, R^2 = 0.889$ | $s = 76.695(i) - 1077.7, R^2 = 0.421$  |
| 5. สวนมะม่วง        | $s = 6.2988(i) - 70.188, R^2 = 0.808$ | $s = 15.806(i) - 166.2, R^2 = 0.7564$  |

3) ปัจจัยค่าพลังงานของฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R - factor) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ออกจากพื้นที่ ถ้าวิเคราะห์โดยภาพรวม พบว่าพลังงาน R - factor มีอิทธิพลต่อการเกิดการชะล้างตะกอนออกจากพื้นที่ศึกษาในระดับปานกลางถึงต่ำ และในปี 2544 ได้รับอิทธิพลน้อยกว่าในปี 2545 ซึ่งพลังงาน R - factor ที่กระทำต่อพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 พื้นที่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าอิทธิพลที่เกิดจากพลังงาน R - factor ทำให้เกิดการชะล้างตะกอนออกจากพื้นที่ได้แต่ค่อนข้างน้อย ดังตารางที่ 5.6



ตารางที่ 5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R – factor) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ในแปลงปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor)

| พื้นที่             | R – factor / sediment / ปี 2544       | R – factor / sediment / ปี 2545        |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ      | $s = 0.1557(R) + 204.98, R^2 = 0.576$ | $s = 0.7915(R) - 327.91, R^2 = 0.6605$ |
| 2. ป่าเต็งรังแคะ    | $s = 0.0147(R) + 25.64, R^2 = 0.3826$ | $s = 0.1455(R) - 82.876, R^2 = 0.6212$ |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $s = 0.0492(R) + 194.01, R^2 = 0.597$ | $s = 0.2634(R) - 89.797, R^2 = 0.7264$ |
| 4. ป่าปลูก          | $s = 0.0087(R) + 40.462, R^2 = 0.429$ | $s = 0.3455(R) - 301.35, R^2 = 0.3956$ |
| 5. สวนมะม่วง        | $s = 0.0157(R) + 12.785, R^2 = 0.657$ | $s = 0.0735(R) - 11.557, R^2 = 0.7581$ |

5.2.3 ปัจจัยด้านน้ำฝนทั้ง 3 ลักษณะ ที่ส่งผลต่อการเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ในแปลงศึกษาปัจจัยพืชคลุมดิน (C – factor)

1) ปริมาณน้ำฝนรายวัน มีผลทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดิน ได้ค่อนข้างมากทั้ง 2 ปี และในเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แปลงสวนมะม่วง ถ้าเปรียบเทียบอิทธิพลที่เกิดขึ้นจากค่าปริมาณน้ำฝนรายวันปี 2544 และปี 2545 จะเห็นได้ว่าปี 2544 พื้นที่ป่าเต็งรังแคะ และป่าเต็งรังรุ่นสอง จะเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินได้สูงกว่าปี 2545 เล็กน้อย แต่พื้นที่ป่าเบญจพรรณ ป่าปลูกและสวนมะม่วง ปี 2544 จะเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินได้น้อยกว่าปี 2545 เล็กน้อย ดังตารางที่ 5.7

ตารางที่ 5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนรายวัน (daily rainfall) ต่อการเกิดปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ในแปลงศึกษาปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor)

| พื้นที่             | daily rainfall / runoff / ปี 2544      | daily rainfall / runoff / ปี 2545      |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ      | $r = 0.2837(d) + 4.7704, R^2 = 0.6663$ | $r = 0.563(d) + 0.1157, R^2 = 0.8807$  |
| 2. ป่าเต็งรังแคะ    | $r = 0.1334(d) + 2.1073, R^2 = 0.7912$ | $r = 0.3022(d) - 0.6958, R^2 = 0.7302$ |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $r = 0.2172(d) + 0.6163, R^2 = 0.9324$ | $r = 0.2637(d) + 2.0077, R^2 = 0.6945$ |
| 4. ป่าปลูก          | $r = 0.0677(d) + 2.4451, R^2 = 0.5472$ | $r = 0.228(d) - 0.3781, R^2 = 0.8427$  |
| 5. สวนมะม่วง        | $r = 0.0732(d) + 1.4052, R^2 = 0.711$  | $r = 0.0683(d) + 0.3083, R^2 = 0.8551$ |

2) ค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  มีผลทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินในพื้นที่ได้ แต่ค่อนข้างน้อย พื้นที่ป่าเต็งรังรุ่นสอง ป่าปลูก และสวนมะม่วง ค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  มีอิทธิพลทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินปี 2544 ได้สูงกว่าปี 2545 ในขณะที่พื้นที่แปลงอื่น ๆ ค่าพลังงานของฝนไม่ส่งผลกระทบมากนัก ดังตารางที่ 5.8

ตารางที่ 5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) ต่อการเกิดปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ในแปลงศึกษาปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor)

| พื้นที่             | $I_{30-max}$ / runoff / ปี 2544        | $I_{30-max}$ / runoff / ปี 2545        |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ      | $r = 0.457(i) + 2.9516, R^2 = 0.4601$  | $r = 0.5562(i) + 4.7225, R^2 = 0.3467$ |
| 2. ป่าเต็งรังแคระ   | $r = 0.2026(i) + 1.5248, R^2 = 0.486$  | $r = 0.3877(i) - 0.2232, R^2 = 0.4655$ |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $r = 0.3404(i) - 0.5811, R^2 = 0.6082$ | $r = 0.2875(i) + 3.6143, R^2 = 0.3328$ |
| 4. ป่าปลูก          | $r = 0.1268(i) + 1.6816, R^2 = 0.530$  | $r = 0.2388(i) + 1.2122, R^2 = 0.3726$ |
| 5. สวนมะม่วง        | $r = 0.1241(i) + 0.8037, R^2 = 0.544$  | $r = 0.0674(i) + 0.8697, R^2 = 0.3355$ |

3) ค่าพลังงานของฝนมีอิทธิพลที่ทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินในแปลง C-factor ได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างน้อย ยกเว้นในพื้นที่ป่าเต็งรังรุ่นสอง ปี 2544 ได้รับอิทธิพลจากพลังงาน R – factor สูงทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินได้ในปริมาณมาก ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ จะได้รับอิทธิพลในระดับที่ใกล้เคียงกัน ถ้าดูจากภาพรวมแล้วจะพบว่าปี 2544 พื้นที่ศึกษาจะได้รับอิทธิพลจากพลังงาน R – factor ที่ทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินได้น้อยกว่าปี 2545 เล็กน้อย ดังตารางที่ 5.9

ตารางที่ 5.9 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R – factor) ต่อการเกิดปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ในแปลงศึกษาปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor)

| พื้นที่             | R – factor / runoff / ปี 2544          | R – factor / runoff / ปี 2545          |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ      | $r = 0.0007(R) + 3.6543, R^2 = 0.6683$ | $r = 0.0034(R) + 8.2043, R^2 = 0.6144$ |
| 2. ป่าเต็งรังแคระ   | $r = 0.0014(R) + 8.1211, R^2 = 0.5502$ | $r = 0.0023(R) + 2.3521, R^2 = 0.7812$ |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $r = 0.0012(R) + 2.843, R^2 = 0.9277$  | $r = 0.0016(R) + 5.8114, R^2 = 0.4792$ |
| 4. ป่าปลูก          | $r = 0.0003(R) + 3.284, R^2 = 0.4974$  | $r = 0.0015(R) + 2.6279, R^2 = 0.6913$ |
| 5. สวนมะม่วง        | $r = 0.0004(R) + 2.2555, R^2 = 0.6054$ | $r = 0.0004(R) + 1.2803, R^2 = 0.6086$ |

5.2.4 ปัจจัยน้ำฝนทั้ง 3 ลักษณะ ที่ส่งผลต่อการพัดพาตะกอน (sediment) ในแปลงศึกษาปัจจัยพืชคลุมดิน (C – factor)

1) ปริมาณน้ำฝนรายวันในแปลงปัจจัยพืชคลุมดิน (C – factor) มีอิทธิพลทำให้เกิดการชะล้างตะกอนในพื้นที่ค่อนข้างน้อยทั้งปี 2544 และปี 2545 แต่ถ้าเปรียบเทียบจากค่าสมการความสัมพันธ์ ระหว่าง ปัจจัยด้านปริมาณน้ำฝนรายวัน (daily rainfall) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) จะเห็นได้ว่าภาพรวมของอิทธิพลจากปริมาณน้ำฝนรายวัน ในปี 2544 จะก่อให้เกิดการชะล้างตะกอนได้ต่ำกว่าในปี 2545 ดังตารางที่ 5.10



ตารางที่ 5.10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนรายวัน (daily rainfall) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ในแปลงศึกษาปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor)

| พื้นที่             | daily rainfall / sediment / ปี 2544    | daily rainfall / sediment / ปี 2545    |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ      | $s = 2.9438(d) + 2.9115, R^2 = 0.455$  | $s = 2.3747(d) + 7.8206, R^2 = 0.198$  |
| 2. ป่าเต็งรังแคระ   | $s = 0.1978(d) + 3.7599, R^2 = 0.2531$ | $s = 5.9731(d) - 88.578, R^2 = 0.4807$ |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $s = 0.9414(d) + 8.1211, R^2 = 0.2516$ | $s = 6.074(d) - 59.018, R^2 = 0.4836$  |
| 4. ป่าปลูก          | $s = 0.172(d) + 2.6963, R^2 = 0.347$   | $s = 4.1498(d) - 60.551, R^2 = 0.4858$ |
| 5. สวนมะม่วง        | $s = 0.2235(d) + 1.4347, R^2 = 0.4851$ | $s = 0.4489(d) - 2.0161, R^2 = 0.4116$ |

2) ค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  ในพื้นที่ป่าเบญจพรรณป่าปลูก และสวนมะม่วงปี 2544 มีอิทธิพลต่อการเกิดการชะล้างตะกอนค่อนข้างสูง แต่ในพื้นที่อื่น ๆ ค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  มีผลต่อการเกิดการชะล้างตะกอนในปี 2544 ในระดับปานกลาง ขณะที่ปี 2545 พื้นที่ป่าเบญจพรรณ และสวนมะม่วง ได้รับอิทธิพลจากพลังงาน  $I_{30-max}$  และมีผลทำให้เกิดการชะล้างตะกอนได้ในระดับปานกลาง ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ ได้รับอิทธิพลในระดับต่ำ ดังตารางที่ 5.11

ตารางที่ 5.11 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ในแปลงศึกษาปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor)

| พื้นที่             | $I_{30-max}$ / sediment / ปี 2544      | $I_{30-max}$ / sediment / ปี 2545      |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ      | $s = 7.5792(i) - 78.02, R^2 = 0.8034$  | $s = 6.9268(i) - 66.517, R^2 = 0.6792$ |
| 2. ป่าเต็งรังแคระ   | $s = 0.6334(i) - 4.3989, R^2 = 0.6917$ | $s = 8.5383(i) - 93.678, R^2 = 0.3961$ |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $s = 3.1107(i) - 32.805, R^2 = 0.7318$ | $s = 9.2825(i) - 75.047, R^2 = 0.442$  |
| 4. ป่าปลูก          | $s = 0.5204(i) - 3.7329, R^2 = 0.8467$ | $s = 4.7315(i) - 39.519, R^2 = 0.2547$ |
| 5. สวนมะม่วง        | $s = 0.5869(i) - 4.9611, R^2 = 0.8911$ | $s = 0.8245(i) - 6.1411, R^2 = 0.5599$ |

3) ปัจจัยค่าพลังงานของฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R - factor) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ที่เกิดขึ้นในปี 2544 มีค่าค่อนข้างต่ำ แสดงให้เห็นว่าพลังงานของฝนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้เกิดการชะล้างตะกอนออกจากพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่ป่าเบญจพรรณและสวนมะม่วง ซึ่งค่อนข้างจะได้รับอิทธิพลพอสมควร และในปี 2545 จะได้รับอิทธิพลที่สูงกว่าปี 2544 ดังตารางที่ 5.12

ตารางที่ 5.12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R – factor) ต่อการเกิดการชะล้างตะกอน (sediment) ในแปลงศึกษาปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor)

| พื้นที่             | R – factor / sediment / ปี 2544        | R – factor / sediment / ปี 2545        |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ      | $s = 0.0184(R) + 23.361, R^2 = 0.6234$ | $s = 0.0281(R) + 10.814, R^2 = 0.5163$ |
| 2. ป่าเต็งรังแคระ   | $s = 0.0012(R) + 5.2079, R^2 = 0.335$  | $s = 0.055(R) - 45.258, R^2 = 0.7613$  |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $s = 0.0063(R) + 13.251, R^2 = 0.3934$ | $s = 0.0507(R) - 7.212, R^2 = 0.6213$  |
| 4. ป่าปลูก          | $s = 0.0011(R) + 3.8501, R^2 = 0.4858$ | $s = 0.0339(R) - 20.568, R^2 = 0.6059$ |
| 5. สวนมะม่วง        | $s = 0.0013(R) + 3.2042, R^2 = 0.6072$ | $s = 0.0041(R) + 1.3278, R^2 = 0.6398$ |

### 5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ต่อการพัดพาตะกอน (sediment)

แปลงศึกษาปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor) ในปี 2544 พบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 2 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้ามีปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินมาก อัตราการพัดพาตะกอนออกจากพื้นที่ก็จะสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเต็งรังรุ่นสอง ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบด้วย เช่น ความลาดชันของพื้นที่ ลักษณะเนื้อดิน ความพรุนของดิน และความสามารถในซึมน้ำของดิน เป็นต้น จากค่าสหสัมพันธ์ (ตารางที่ 5.13) หากเปรียบเทียบในภาพรวม พบว่า แปลงศึกษาปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor) มีผลต่ออัตราการพัดพาตะกอนได้สูงกว่าแปลงศึกษาปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor) ขณะเดียวกัน หากมีปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินในแปลงศึกษาปัจจัยพืชปกคลุมดิน (C-factor) ในปริมาณมาก ก็ย่อมเกิดการชะล้างพัดพาตะกอนออกจากพื้นที่ได้มากเช่นกัน ดังตารางที่ (5.14) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า แปลงศึกษาปัจจัยความยากง่ายในการสูญเสียดิน (K-factor) เป็นแปลงที่มีความพร้อมที่จะถูกชะล้างตะกอนออกจากพื้นที่เมื่อได้รับอิทธิพลจากพลังงานของฝน ที่ทำให้เกิดการสูญเสียดินมากกระทำก็จะทำให้เกิดการพัดพาตะกอนได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีความน้ำไหลบ่าหน้าดินปริมาณมาก



ตารางที่ 5.13 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ต่อปริมาณการพัดพาตะกอน (sediment) จากแปลง K-factor และแปลง C-factor ของปี 2544

| พื้นที่             | K-factor                               | C-factor                               |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ      | $s = 15.661(r) - 416.57, R^2 = 0.4719$ | $s = 7.1512(r) - 4.7618, R^2 = 0.3244$ |
| 2. ป่าเต็งรังแคระ   | $s = 2.4072(r) - 4.8166, R^2 = 0.282$  | $s = 1.3241(r) + 1.5822, R^2 = 0.255$  |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $s = 4.8536(r) + 36.989, R^2 = 0.5253$ | $s = 4.8881(r) + 1.6286, R^2 = 0.3433$ |
| 4. ป่าปลูก          | $s = 3.5145(r) + 12.432, R^2 = 0.4066$ | $s = 1.8508(r) - 0.4813, R^2 = 0.3368$ |
| 5. สวนมะม่วง        | $s = 5.7453(r) - 7.9974, R^2 = 0.4639$ | $s = 2.642(r) - 1.4104, R^2 = 0.5113$  |

ตารางที่ 5.14 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ต่อปริมาณการพัดพาตะกอน (sediment) จากแปลง K-factor และแปลง C-factor ของปี 2545

| พื้นที่             | K-factor                               | C-factor                               |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. ป่าเบญจพรรณ      | $s = 19.725(r) - 599.71, R^2 = 0.2346$ | $s = 4.3353(r) + 5.4468, R^2 = 0.2374$ |
| 2. ป่าเต็งรังแคระ   | $s = 2.8284(r) + 110.45, R^2 = 0.1379$ | $s = 20.05(r) - 77.093, R^2 = 0.6776$  |
| 3. ป่าเต็งรังรุ่น 2 | $s = 4.7013(r) + 17.255, R^2 = 0.1782$ | $s = 23.628(r) - 110.92, R^2 = 0.7328$ |
| 4. ป่าปลูก          | $s = 32.57(r) - 315.76, R^2 = 0.1229$  | $s = 19.016(r) - 58.653, R^2 = 0.629$  |
| 5. สวนมะม่วง        | $s = 12.532(r) - 20.466, R^2 = 0.3421$ | $s = 6.7166(r) - 4.3689, R^2 = 0.5029$ |

#### 5.4 อิทธิพลของปัจจัยน้ำฝนต่อการสูญเสียธาตุอาหาร

จากการนำตัวอย่างตะกอนจากแปลงทดลองมาวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในแต่ละพื้นที่ สามารถสรุปได้ดังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) ที่จะทำให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารหลักทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม (K), แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) นั้น ในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  ได้ส่งผลกระทบทำให้เกิดการชะล้างธาตุอาหารหลักทั้ง 5 ชนิด ค่อนข้างสูง เช่นเดียวกันในพื้นที่ป่าเต็งรังแคระ ขณะเดียวกันในพื้นที่ป่าเต็งรังรุ่น 2 ค่าพลังงาน  $I_{30-max}$  กลับมีผลทำให้เกิดการชะล้างธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) ต่ำ ส่วนธาตุอาหารอื่นๆ อีก 4 ชนิด มีอัตราการชะล้างใกล้เคียงกับป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังแคระ ส่วนในพื้นที่ป่าปลูก สาเหตุที่ทำให้ปริมาณการชะล้างธาตุอาหารแคลเซียม (Ca), และแมกนีเซียม (Mg) ต่ำอาจมาจากความเข้มข้นของแคลเซียม (Ca), และแมกนีเซียม (Mg) ในสภาพธรรมชาติของป่าเต็งรังรุ่น 2 และป่าปลูก มีต่ำอยู่แล้ว ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 5.15 และตารางที่ 5.16 - 5.19

ตารางที่ 5.15 ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดินต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าเบญจพรรณ

| ธาตุอาหาร | แปลง K-factor                          | แปลง C-factor                           |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| N         | $N = 0.0472(i) - 0.2749, R^2 = 0.8491$ | $N = 0.0023(i) - 0.0064, R^2 = 0.7509$  |
| P         | $P = 0.0018(i) - 0.0119, R^2 = 0.9084$ | $P = 9E-05(i) - 0.0005, R^2 = 0.8393$   |
| K         | $K = 0.0059(i) - 0.0323, R^2 = 0.887$  | $K = 0.0003(i) - 0.0008, R^2 = 0.8032$  |
| Ca        | $Ca = 0.0712(i) - 0.518, R^2 = 0.7871$ | $Ca = 0.0038(i) - 0.0264, R^2 = 0.7101$ |
| Mg        | $Mg = 0.005(i) - 0.0375, R^2 = 0.7516$ | $Mg = 0.0003(i) - 0.0018, R^2 = 0.6782$ |

ตารางที่ 5.16 ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน ต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าเต็งรังแคว

| ธาตุอาหาร | แปลง K-factor                          | แปลง C-factor                           |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| N         | $N = 0.0112(i) - 0.0776, R^2 = 0.7285$ | $N = 0.0006(i) - 0.0038, R^2 = 0.8406$  |
| P         | $P = 0.007(i) - 0.0039, R^2 = 0.7138$  | $P = 3E-05(i) - 0.0002, R^2 = 0.8101$   |
| K         | $K = 0.0009(i) - 0.0022, R^2 = 0.6825$ | $K = 4E-05(i) + 9E-05, R^2 = 0.7136$    |
| Ca        | $Ca = 0.018(i) - 0.1432, R^2 = 0.4151$ | $Ca = 0.0007(i) - 0.0032, R^2 = 0.3568$ |
| Mg        | $Mg = 0.007(i) - 0.0041, R^2 = 0.6981$ | $Mg = 3E-05(i) - 7E-05, R^2 = 0.7339$   |

ตารางที่ 5.17 ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน ต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าเต็งรังทุ่งสง

| ธาตุอาหาร | แปลง K-factor                           | แปลง C-factor                           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| N         | $N = 0.0423(i) - 0.2653, R^2 = 0.7073$  | $N = 0.0015(i) - 0.0087, R^2 = 0.7969$  |
| P         | $P = 0.0007(i) + 0.0017, R^2 = 0.6554$  | $P = 3E-05(i) - 8E-05, R^2 = 0.7471$    |
| K         | $K = 0.002(i) + 0.0298, R^2 = 0.1892$   | $K = 9E-05(i) + 0.0009, R^2 = 0.1973$   |
| Ca        | $Ca = 0.0532(i) - 0.3012, R^2 = 0.8947$ | $Ca = 0.0019(i) - 0.0108, R^2 = 0.9605$ |
| Mg        | $Mg = 0.003(i) - 0.0137, R^2 = 0.9905$  | $Mg = 0.0001(i) - 0.0005, R^2 = 0.9614$ |



ตารางที่ 5.18 ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน ต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าปลูก

| ธาตุอาหาร | แปลง K-factor                           | แปลง C-factor                           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| N         | $N = 0.0077(i) - 0.015, R^2 = 0.9695$   | $N = 0.0005(i) - 5E-05, R^2 = 0.8214$   |
| P         | $P = 0.0003(i) - 0.0024, R^2 = 0.8852$  | $P = 2E-05(i) - 0.0001, R^2 = 0.9565$   |
| K         | $K = 0.0003(i) + 0.004, R^2 = 0.6978$   | $K = 2E-05(i) + 0.0004, R^2 = 0.4858$   |
| Ca        | $Ca = 0.0033(i) - 0.0057, R^2 = 0.5361$ | $Ca = 0.0003(i) - 0.0002, R^2 = 0.4207$ |
| Mg        | $Mg = 0.0003(i) - 0.0008, R^2 = 0.4643$ | $Mg = 2E-05(i) - 4E-05, R^2 = 0.3741$   |

ตารางที่ 5.19 ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน ต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองสวนมะม่วง

| ธาตุอาหาร | แปลง K-factor                           | แปลง C-factor                           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| N         | $N = 0.0231(i) - 0.1726, R^2 = 0.5911$  | $N = 0.0017(i) - 0.0105, R^2 = 0.5761$  |
| P         | $P = 0.0052(i) - 0.0398, R^2 = 0.6494$  | $P = 0.0004(i) - 0.0028, R^2 = 0.6516$  |
| K         | $K = 0.056(i) - 0.0083, R^2 = 0.3117$   | $K = 0.0004(i) + 0.0025, R^2 = 0.224$   |
| Ca        | $Ca = 0.0266(i) - 0.2116, R^2 = 0.6271$ | $Ca = 0.0021(i) - 0.0158, R^2 = 0.6376$ |
| Mg        | $Mg = 0.0013(i) - 0.0099, R^2 = 0.7332$ | $Mg = 0.0001(i) - 0.0006, R^2 = 0.734$  |

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณการพัดพาตะกอน (transported sediment) ต่อปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารจากแปลงศึกษาทั้ง 5 พื้นที่ พบว่า ปริมาณตะกอนมีผลต่อการเพิ่มปริมาณของธาตุอาหาร หากมีปริมาณตะกอนมาก ธาตุอาหารที่จะถูกชะล้างจะเจือปนในปริมาณมากเช่นกัน จากพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าเบญจพรรณ พื้นที่ป่าเต็งรัง แคระ พื้นที่ป่าเต็งรังรุ่มสอง พื้นที่ป่าปลูก และพื้นที่สวนมะม่วง นั้น พบว่ามีเพียงพื้นที่ป่าเต็งรัง รุ่มสองที่มีอัตราความเข้มข้นของโปแตสเซียม (K) ต่ำ เมื่อเทียบกับปริมาณตะกอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะดินในสภาพธรรมชาติมีธาตุอาหารโปแตสเซียม ต่ำอยู่แล้ว ดังนั้นการที่จะถูกชะล้างออกมากับตะกอนจึงมีปริมาณต่ำมากตามไปด้วย ส่วนพื้นที่ป่าปลูกธาตุอาหารที่มีความเข้มข้นต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณตะกอนได้แก่ แมกนีเซียม (Mg) แต่ก็อยู่ในอัตราที่ไม่ได้ต่ำมากนัก เมื่อเทียบกับธาตุอาหารชนิดอื่น ๆ อันมีสาเหตุมาจากในสภาพธรรมชาติดินในพื้นที่ป่าปลูกมี

แมกนีเซียม (Mg) เจือปนอยู่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นการถูกระล้างออกจากพื้นที่จึงมีปริมาณน้อยมาก เช่นเดียวกันกับ พื้นที่สวนมะม่วง ที่มีปริมาณธาตุอาหารในอัตราส่วนที่ต่ำ เมื่อเทียบกับปริมาณ ตะกอน ได้แก่ โพแทสเซียม (K) ซึ่งในสภาพธรรมชาติ ปริมาณธาตุโพแทสเซียมมีแนวโน้มต่ำอยู่แล้ว ดังนั้นอัตราการถูกระล้างออกมาพร้อมกับตะกอนจึงมีต่ำตามไปด้วย ดังตารางที่ 5.20 - 5.27

ตารางที่ 5.20 ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าเบญจพรรณ

| ธาตุอาหาร | แปลง K-factor                           | แปลง C-factor                          |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| N         | $N = 0.0014(s) + 0.0974, R^2 = 0.9904$  | $N = 0.0007(s) + 0.0079, R^2 = 0.9946$ |
| P         | $P = 5E-05(s) + 0.004, R^2 = 0.9506$    | $P = 2E-05(s) + 0.0002, R^2 = 0.9617$  |
| K         | $K = 0.0002(s) + 0.0176, R^2 = 0.9685$  | $K = 8E-05(s) + 0.0012, R^2 = 0.9838$  |
| Ca        | $Ca = 0.0021(s) - 0.007, R^2 = 0.9972$  | $Ca = 0.0011(s) - 0.005, R^2 = 0.9858$ |
| Mg        | $Mg = 0.0002(s) - 0.0035, R^2 = 0.9987$ | $Mg = 8E-05(s) - 0.0004, R^2 = 0.9942$ |

ตารางที่ 5.21 ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าเต็งรัง

| ธาตุอาหาร | แปลง K-factor                           | แปลง C-factor                           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| N         | $N = 0.002(s) + 0.033, R^2 = 0.9582$    | $N = 0.001(s) + 0.0018, R^2 = 0.9094$   |
| P         | $P = 0.0001(s) + 0.0025, R^2 = 0.9666$  | $P = 6E-05(s) + 0.0001, R^2 = 0.9279$   |
| K         | $K = 0.0002(s) + 0.0061, R^2 = 0.9728$  | $K = 8E-05(s) + 0.0004, R^2 = 0.9533$   |
| Ca        | $Ca = 0.0044(s) - 0.0568, R^2 = 0.9847$ | $Ca = 0.0022(s) - 0.0019, R^2 = 0.9493$ |
| Mg        | $Mg = 0.0001(s) + 0.0024, R^2 = 0.9693$ | $Mg = 6E-05(s) + 0.0002, R^2 = 0.9371$  |



ตารางที่ 5.22 ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าเต็งรัง  
รุ่น สอง

| ธาตุอาหาร | แปลง K-factor                           | แปลง C-factor                          |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| N         | $N = 0.0021(s) - 0.1284, R^2 = 0.8198$  | $N = 0.0009(s) - 0.0008, R^2 = 0.7411$ |
| P         | $P = 3E-05(s) + 0.0048, R^2 = 0.6858$   | $P = 1E-05(s) + 0.0002, R^2 = 0.6132$  |
| K         | $K = 6E-05(s) + 0.0523, R^2 = 0.0843$   | $K = 6E-05(s) + 0.0012, R^2 = 0.2364$  |
| Ca        | $Ca = 0.0026(s) - 0.0955, R^2 = 0.9773$ | $Ca = 0.0012(s) - 0.0021, R^2 = 0.97$  |
| Mg        | $Mg = 0.0001(s) + 0.0009, R^2 = 0.9868$ | $Mg = 7E-05(s) + 3E-05, R^2 = 0.9877$  |

ตารางที่ 5.23 ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองป่าปลูก

| ธาตุอาหาร | แปลง K-factor                           | แปลง C-factor                           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| N         | $N = 0.0021(s) + 0.0237, R^2 = 0.9208$  | $N = 0.0012(s) + 0.001, R^2 = 0.917$    |
| P         | $P = 0.0001(s) - 0.011, R^2 = 0.9611$   | $P = 5E-05(s) - 6E-05, R^2 = 0.9422$    |
| K         | $K = 9E-05(s) + 0.0062, R^2 = 0.5477$   | $K = 5E-05(s) + 0.0004, R^2 = 0.53$     |
| Ca        | $Ca = 0.0009(s) + 0.0163, R^2 = 0.4327$ | $Ca = 0.0007(s) - 0.0003, R^2 = 0.5736$ |
| Mg        | $Mg = 8E-05(s) + 0.0012, R^2 = 0.3701$  | $Mg = 6E-05(s) - 6E-05, R^2 = 0.5335$   |

ตารางที่ 5.24 ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงทดลองสวนมะม่วง

| ธาตุอาหาร | แปลง K-factor                           | แปลง C-factor                           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| N         | $N = 0.0079(s) - 0.0618, R^2 = 0.7098$  | $N = 0.0038(s) - 0.005, R^2 = 0.667$    |
| P         | $P = 0.0018(s) - 0.0139, R^2 = 0.7662$  | $P = 0.0009(s) - 0.0014, R^2 = 0.737$   |
| K         | $K = 0.0015(s) + 0.0444, R^2 = 0.2235$  | $K = 0.0007(s) + 0.0047, R^2 = 0.2028$  |
| Ca        | $Ca = 0.009(s) - 0.0816, R^2 = 0.7464$  | $Ca = 0.0045(s) - 0.0086, R^2 = 0.7192$ |
| Mg        | $Mg = 0.0005(s) - 0.0028, R^2 = 0.8423$ | $Mg = 0.0002(s) - 0.0003, R^2 = 0.8209$ |

ตารางที่ 5.25 ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงศึกษาป่าเต็งรัง  
รุ่นสอง

| ธาตุอาหาร | แปลง K-factor                           | แปลง C-factor                          |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| N         | $N = 0.0021(s) - 0.1284, R^2 = 0.8198$  | $N = 0.0009(s) - 0.0008, R^2 = 0.7411$ |
| P         | $P = 3E-05(s) + 0.0048, R^2 = 0.6858$   | $P = 1E-05(s) + 0.0002, R^2 = 0.6132$  |
| K         | $K = 6E-05(s) + 0.0523, R^2 = 0.0843$   | $K = 6E-05(s) + 0.0012, R^2 = 0.2364$  |
| Ca        | $Ca = 0.0026(s) - 0.0955, R^2 = 0.9773$ | $Ca = 0.0012(s) - 0.0021, R^2 = 0.97$  |
| Mg        | $Mg = 0.0001(s) + 0.0009, R^2 = 0.9868$ | $Mg = 7E-05(s) + 3E-05, R^2 = 0.9877$  |

ตารางที่ 5.26 ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงศึกษาป่าปลูก

| ธาตุอาหาร | แปลง K-factor                           | แปลง C-factor                           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| N         | $N = 0.0021(s) + 0.0237, R^2 = 0.9208$  | $N = 0.0012(s) + 0.001, R^2 = 0.917$    |
| P         | $P = 0.0001(s) - 0.011, R^2 = 0.9611$   | $P = 5E-05(s) - 6E-05, R^2 = 0.9422$    |
| K         | $K = 9E-05(s) + 0.0062, R^2 = 0.5477$   | $K = 5E-05(s) + 0.0004, R^2 = 0.53$     |
| Ca        | $Ca = 0.0009(s) + 0.0163, R^2 = 0.4327$ | $Ca = 0.0007(s) - 0.0003, R^2 = 0.5736$ |
| Mg        | $Mg = 8E-05(s) + 0.0012, R^2 = 0.3701$  | $Mg = 6E-05(s) - 6E-05, R^2 = 0.5335$   |

ตารางที่ 5.27 ความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนต่อปริมาณธาตุอาหาร จากแปลงศึกษาสวนมะม่วง

| ธาตุอาหาร | แปลง K-factor                           | แปลง C-factor                           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| N         | $N = 0.0079(s) - 0.0618, R^2 = 0.7098$  | $N = 0.0038(s) - 0.005, R^2 = 0.667$    |
| P         | $P = 0.0018(s) - 0.0139, R^2 = 0.7662$  | $P = 0.0009(s) - 0.0014, R^2 = 0.737$   |
| K         | $K = 0.0015(s) + 0.0444, R^2 = 0.2235$  | $K = 0.0007(s) + 0.0047, R^2 = 0.2028$  |
| Ca        | $Ca = 0.009(s) - 0.0816, R^2 = 0.7464$  | $Ca = 0.0045(s) - 0.0086, R^2 = 0.7192$ |
| Mg        | $Mg = 0.0005(s) - 0.0028, R^2 = 0.8423$ | $Mg = 0.0002(s) - 0.0003, R^2 = 0.8209$ |



## 5.5 การสูญเสียดินในแปลงศึกษา

ผลการศึกษาการชะล้างพังทลายของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน โดยกำหนดแปลงศึกษาไว้ 5 พื้นที่ จากการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำและปริมาณตะกอนตัวอย่างจากแปลงศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประเมินหาปริมาณการชะล้างพังทลายของดินในแปลงศึกษาพบว่า แปลงพื้นที่ป่าเบญจพรรณมีอัตราการชะล้างพังทลายสูงสุด เท่ากับ 3.147 ตันต่อไร่ต่อปี รองลงมาได้แก่ แปลงพื้นที่ป่าเต็งรังรุ่นสอง ป่าเต็งรังแคะ ป่าปลูก และแปลงสวนมะม่วงซึ่งมีอัตราการชะล้าง เท่ากับ 2.537, 1.647, 1.184 และ 0.328 ตามลำดับ (ตารางผนวกที่ 1 - 2)

แปลงพื้นที่ป่าเบญจพรรณมีอัตราการสูญเสียดินจากการชะล้างพังทลายสูงสุด อาจมีสาเหตุมาจากสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง (25.5 เปอร์เซ็นต์) อีกทั้งเนื้อดินค่อนข้างร่วนซุย มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน ระหว่างแปลงศึกษาทั้ง 5 พื้นที่ (ตารางที่ 4.17) จะเห็นได้ว่าแปลงพื้นที่ป่าเบญจพรรณมีปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินสูงสุด ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปริมาณการชะล้างพังทลายและการพัดพาตะกอนได้สูงกว่าแปลงพื้นที่อื่น ๆ ส่วนแปลงศึกษาที่มีอัตราการสูญเสียดินจากการชะล้างพังทลายต่ำสุด ได้แก่ แปลงสวนมะม่วง อาจมีสาเหตุมาจากพื้นที่แปลงสวนมะม่วงมีสภาพความลาดชันต่ำ (10 เปอร์เซ็นต์) ทำให้อัตราความรุนแรงของน้ำไหลบ่าหน้าดินลดลง อีกทั้งเนื้อดินมีปริมาณอินทรีย์วัตถุต่ำ ลักษณะชั้นดินเป็นดินตื้นน้อยกว่า 50 เซนติเมตร ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ นอกจากนี้เนื้อดินยังมีการสะสมของอนุภาคดินเหนียวและก้อนกรวดจำพวกก้อนหิน เมื่อได้รับความชื้นจะยึดเกาะตัวกันได้ดี อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ การปกคลุมดินของวัชพืช เนื่องจากแปลงสวนมะม่วงมีพืชพื้นล่างขึ้นปกคลุมดินอย่างหนาแน่น ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ จึงมีผลช่วยชะลอการไหลบ่าของน้ำหน้าดินได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการระบายน้ำของดินดีจึงมีผลทำให้การชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณแปลงสวนมะม่วงมีอัตราที่ต่ำกว่าแปลงศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ

## 5.6 การชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ระดับลุ่มน้ำ

ผลการประเมินการชะล้างพังทลายและการสูญเสียดินในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยไจ้ (on - site erosion) โดยวิธีการประเมินแบบกริดย่อย พบว่า มีอัตราการชะล้างพังทลายของหน้าดินอยู่ประมาณ 0.00002 ถึง 0.42086 ตันต่อไร่ต่อปี และยังพบอีกว่าพื้นที่ที่มีอัตราการชะล้าง พังทลายสูงสุดเป็นพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ซึ่งอยู่ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ส่วนพื้นที่ที่มีอัตราการสูญเสียดินจากการชะล้างพังทลายต่ำสุดได้แก่ บริเวณพื้นที่ป่าเบญจพรรณและสวนไม้ผลที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดชันต่ำ ซึ่งมีค่าระดับความสูงอยู่ประมาณ 5

เปอร์เซ็นต์ และอยู่ตอนล่างของพื้นที่ลุ่มน้ำ และปริมาณการสูญเสียดินจากการชะล้างพังทลายโดยรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยไจ้จะอยู่ประมาณ 645.44762 ตันต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงพอสมควร (ตารางผนวกที่ 6)

#### 5.7 อัตราการชะล้างพังทลายของดินต่อปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารที่ถูกพัดพาออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำ

จากผลการศึกษาอัตราการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไจ้ โดยแยกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถสรุปได้ว่า พื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไจ้มีเนื้อที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าเต็งรังประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าเบญจพรรณและป่าเบญจพรรณขึ้นประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปลูกไม้ผลประมาณ 1.32 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทำการเกษตรอื่น ๆ นาข้าว พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เพื่อการพักอาศัยของราษฎรในชุมชน

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการชะล้างพังทลายของหน้าดินต่อปริมาณธาตุอาหารที่ถูกชะล้างพัดพาออกมาพร้อมกับตะกอนจากพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยใช้ข้อมูลจากแปลงศึกษาตัวอย่างเป็นตัวประเมิน สามารถสรุปได้ว่า

1) ป่าเต็งรัง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร มีอัตราการชะล้างพังทลายของดินเท่ากับ 295 ตันต่อปี โดยประมาณ มีอัตราการสูญเสียธาตุอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณตะกอน คิดเป็น ไนโตรเจน (N) ทั้งหมด 115.3 กิโลกรัมต่อปี ฟอสฟอรัส (P) ที่เป็นประโยชน์ 7.37 กิโลกรัมต่อปี โพแทสเซียม (K) ที่แลกเปลี่ยนได้ 12.39 กิโลกรัมต่อปี แคลเซียม (Ca) ที่แลกเปลี่ยนได้ 175.48 กิโลกรัมต่อปี และแมกนีเซียม (Mg) ที่แลกเปลี่ยนได้ 7.96 กิโลกรัมต่อปี

2) ป่าเบญจพรรณ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.80 ตารางกิโลเมตร มีอัตราการชะล้างพังทลายของดินเท่ากับ 85.61 ตันต่อปี โดยประมาณ มีอัตราการสูญเสียธาตุอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณตะกอน คิดเป็น ไนโตรเจน (N) ทั้งหมด 175.65 กิโลกรัมต่อปี ฟอสฟอรัส (P) ที่เป็นประโยชน์ 6.163 กิโลกรัมต่อปี โพแทสเซียม (K) ที่แลกเปลี่ยนได้ 22.09 กิโลกรัมต่อปี แคลเซียม (Ca) ที่แลกเปลี่ยนได้ 228.98 กิโลกรัมต่อปี และแมกนีเซียม (Mg) ที่แลกเปลี่ยนได้ 16.26 กิโลกรัมต่อปี

3) สวนไม้ผล ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.32 ตารางกิโลเมตร มีอัตราการชะล้างพังทลายของดินเท่ากับ 0.82 ตันต่อปี โดยประมาณ มีอัตราการสูญเสียธาตุอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณตะกอน คิดเป็น ไนโตรเจน (N) ทั้งหมด 1.07 กิโลกรัมต่อปี ฟอสฟอรัส (P) ที่เป็น



ประโยชน์ 0.26 กิโลกรัมต่อปี โพแทสเซียม (K) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.39 กิโลกรัมต่อปี แคลเซียม (Ca) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.16 กิโลกรัมต่อปี และแมกนีเซียม (Mg) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.06 กิโลกรัมต่อปี

จากปริมาณธาตุอาหารที่ถูกพัดพาออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโจ้ที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ นำมาประเมินมูลค่าการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารต่อราคาปุ๋ยในท้องตลาดช่วงเดือนกันยายน 2546 โดยธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ให้เปรียบเทียบกับปุ๋ยยูเรีย ในราคา 410 บาทต่อกระสอบ ธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) ให้เปรียบเทียบกับปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต ในราคา 780 บาทต่อกระสอบ ธาตุอาหารโพแทสเซียม (K) ให้เปรียบเทียบกับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ในราคา 420 บาทต่อกระสอบ ธาตุอาหารแคลเซียม (Ca) ให้เปรียบเทียบกับปุ๋ยแคลเซียมไนเตรด ในราคา 420 บาทต่อกระสอบ และธาตุอาหารแมกนีเซียม (Mg) ให้เปรียบเทียบกับแมกนีเซียมซัลเฟต ในราคา 280 บาทต่อกระสอบ รวมมูลค่าการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโจ้ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 31,770 บาทต่อปี (ตารางผนวกที่ 7)

## 5.8 สรุปและข้อเสนอแนะ

5.8.1 สรุปผลการศึกษา การศึกษาการชะล้างพังทลายและการสูญเสียธาตุอาหารในลักษณะการใช้ที่ดินที่แตกต่างกันของพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโจ้ ได้กำหนดพื้นที่ที่จะทำการศึกษาไว้ 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าเบญจพรรณ พื้นที่ป่าเต็งรังแควะ พื้นที่ป่าเต็งรังรุ่นสอง พื้นที่ป่าปลูก และพื้นที่สวนมะม่วง โดยศึกษาจากการเก็บข้อมูลปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินและการพัดพาปริมาณตะกอนออกจากพื้นที่ศึกษา ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินและการพัดพาตะกอน ได้แก่ ปัจจัยด้านน้ำฝน สามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้

1) จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านน้ำฝนทั้ง 3 ลักษณะ ได้แก่ ปัจจัยด้านน้ำฝนรายวัน (daily rainfall) ปัจจัยด้านพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) และปัจจัยด้านพลังงานของน้ำฝนที่ทำให้เกิดการสูญเสียดิน (R - factor) ต่อการเกิดปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินพบว่า ปัจจัยด้านน้ำฝนรายวัน (daily rainfall) มีผลอย่างยิ่งต่อการเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินและในทุกพื้นที่ศึกษาจะมีค่าระดับความเป็นไปได้ที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างปี 2544 และปี 2545 จะเห็นได้ว่าในปี 2545 มีแนวโน้มที่จะเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินได้สูงกว่าในปี 2544 อาจเนื่องมาจากในปี 2545 มีอัตราการตกของน้ำฝนรายวัน (daily rainfall) ยาวนานกว่าและมีปริมาณน้ำฝนในแต่ละกลุ่มพายุฝน (rain storm) ที่สูงกว่าในปี 2544 จึงทำให้มีอัตราน้ำไหลบ่าหน้าดินได้สูงกว่า

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านน้ำฝนทั้ง 3 ลักษณะ ที่ส่งผลต่อการเกิดการชะล้างพัดพาตะกอน (sediment) พบว่า ปัจจัยด้านพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) มีผลต่อการเกิดการชะล้างพัดพาตะกอนในพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 พื้นที่ สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ และเกิดขึ้นกับทั้ง 2 ปีในระดับที่ใกล้เคียงกัน

2) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน (runoff) ต่อการพัดพาตะกอน (sediment) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 2 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้ามีปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินมากอัตราการพัดพาตะกอนออกจากพื้นที่ก็จะมีสูงตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบด้วย ได้แก่ ปัจจัยด้านพลังงานของฝนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลา 30 นาที ( $I_{30-max}$ ) ปัจจัยด้านสภาพของพื้นที่ เช่น ความลาดชันของพื้นที่ ทิศด้านลาดรวมถึงความยาวของความลาดชันด้วย ปัจจัยด้านลักษณะดิน เช่น เนื้อดิน ความพรุนของดิน องค์ประกอบของดิน รวมถึง ปัจจัยด้านพืชพรรณปกคลุมดิน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราการเกิดการชะล้างพังทลายและการพัดพาตะกอนออกจากพื้นที่ทั้งสิ้น

3) จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน และการพัดพาตะกอน เพื่อประเมินอัตราการสูญเสียดินในแปลงพื้นที่ศึกษาตัวอย่าง ทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าเบญจพรรณ พื้นที่ป่าเต็งรังแควะ พื้นที่ป่าเต็งรังรุ่มสอง พื้นที่ป่าปลูก และพื้นที่สวนมะม่วง พบว่าพื้นที่ป่าเบญจพรรณ มีอัตราการชะล้างพังทลายของดินสูงที่สุด 3.15 ตันต่อไร่ต่อปี รองลงมาได้แก่ พื้นที่ป่าเต็งรังรุ่มสอง พื้นที่ป่าเต็งรังแควะ พื้นที่ป่าปลูก และพื้นที่สวนมะม่วง คิดเป็น 2.54, 1.65, 1.18 และ 0.33 ตันต่อไร่ต่อปี ตามลำดับ

เมื่อนำปริมาณตะกอนที่ได้จากแปลงพื้นที่ศึกษาตัวอย่างมาประเมินหาปริมาณธาตุอาหารที่ถูกชะล้างพัดพาออกจากพื้นที่ พบว่า

1). พื้นที่ป่าเบญจพรรณ มีอัตราการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างพังทลายของดิน คิดเป็น ไนโตรเจน (N) ทั้งหมด 6.76 กิโลกรัมต่อปี ฟอสฟอรัส (P) ที่เป็นประโยชน์ 0.2265 กิโลกรัมต่อปี โพแทสเซียม (K) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.81 กิโลกรัมต่อปี แคลเซียม (Ca) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.84 กิโลกรัมต่อปี และแมกนีเซียม (Mg) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.60 กิโลกรัมต่อปี 2). พื้นที่ป่าเต็งรังรุ่มสอง มีอัตราการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างพังทลายของดิน คิดเป็น ไนโตรเจน (N) ทั้งหมด 2.77 กิโลกรัมต่อปี ฟอสฟอรัส (P) ที่เป็นประโยชน์ 0.07 กิโลกรัมต่อปี โพแทสเซียม (K) ที่



แลกเปลี่ยนได้ 0.32 กิโลกรัมต่อปี แคลเซียม (Ca) ที่แลกเปลี่ยนได้ 3.70 กิโลกรัมต่อปี และแมกนีเซียม (Mg) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.23 กิโลกรัมต่อปี

3) พื้นที่ป่าเต็งรังแควะ มีอัตราการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างพังทลายของดิน คิดเป็น ไนโตรเจน (N) ทั้งหมด 0.64 กิโลกรัมต่อปี ฟอสฟอรัส (P) ที่เป็นประโยชน์ 0.041 กิโลกรัมต่อปี โพแทสเซียม (K) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.07 กิโลกรัมต่อปี แคลเซียม (Ca) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.98 กิโลกรัมต่อปี และแมกนีเซียม (Mg) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.05 กิโลกรัมต่อปี

4) พื้นที่ป่าปลูก มีอัตราการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างพังทลายของดิน คิดเป็น ไนโตรเจน (N) ทั้งหมด 0.62 กิโลกรัมต่อปี ฟอสฟอรัส (P) ที่เป็นประโยชน์ 0.02 กิโลกรัมต่อปี โพแทสเซียม (K) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.04 กิโลกรัมต่อปี แคลเซียม (Ca) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.29 กิโลกรัมต่อปี และแมกนีเซียม (Mg) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.03 กิโลกรัมต่อปี

5) พื้นที่สวนมะม่วง มีอัตราการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างพังทลายของดิน คิดเป็น ไนโตรเจน (N) ทั้งหมด 0.43 กิโลกรัมต่อปี ฟอสฟอรัส (P) ที่เป็นประโยชน์ 0.09 กิโลกรัมต่อปี โพแทสเซียม (K) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.16 กิโลกรัมต่อปี แคลเซียม (Ca) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.464 กิโลกรัมต่อปี และแมกนีเซียม (Mg) ที่แลกเปลี่ยนได้ 0.03 กิโลกรัมต่อปี

การวิเคราะห์ข้อมูลการสูญเสียดินในพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยใจ จากการศึกษาและประเมินการสูญเสียดินแบบกิริดย่อย พบว่า อัตราการชะล้าง พังทลายของหน้าดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ มีระดับค่าการชะล้างอยู่ที่ประมาณ 0.00002 ถึง 0.42086 ตันต่อไร่ต่อปี และพื้นที่ที่มีอัตราการชะล้างพังทลายสูงที่สุด คือ พื้นที่ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพื้นที่ที่มีอัตราการชะล้างพังทลายต่ำที่สุด คือ พื้นที่ป่าเบญจพรรณและสวนไม้ผลที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อประเมินอัตราการชะล้างพังทลายในภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยใจ มีปริมาณการชะล้างพังทลายและการสูญเสียดินโดยรวมประมาณ 645 ตันต่อปี

#### 5.8.2 การประเมินการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจจากการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยใจ

จากปริมาณตะกอนที่ประเมินได้จากอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสามารถนำมาประเมินเปรียบเทียบหาอัตราการสูญเสียธาตุอาหารที่ถูกชะล้างพัดพาออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำโดยรวม ซึ่งคิดเป็นปริมาณธาตุอาหารได้ดังนี้ ไนโตรเจน (N) ทั้งหมด 292 กิโลกรัมต่อปี ฟอสฟอรัส (P) ที่เป็นประโยชน์ 14 กิโลกรัมต่อปี โพแทสเซียม (K) ที่แลกเปลี่ยนได้ 35 กิโลกรัมต่อ

ปี แคลเซียม (Ca) ที่แลกเปลี่ยนได้ 405 กิโลกรัมต่อปี และแมกนีเซียม (Mg) ที่แลกเปลี่ยนได้ 24 กิโลกรัมต่อปี เมื่อนำมาคิดเปรียบเทียบกับราคาปุ๋ยในท้องตลาดจะเกิดการ สูญเสียเป็นมูลค่าเท่ากับ 31,770 บาทต่อปี

#### 5.8.3 การประเมินระดับความรุนแรงของการเกิดการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้

ผลการศึกษาอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้ โดยรวมมีปริมาณ ประมาณ 648.4476 ตันต่อปี คิดเป็นอัตราการสูญเสียดินต่อไร่ เท่ากับ 4.41 ตันต่อไร่ต่อปี เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจัดชั้นความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน (2543) สามารถสรุปได้ว่า อัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้ อยู่ในระดับ ขั้นที่ 2 มีความรุนแรงน้อย (slight) คือ มีอัตราการสูญเสียดินอยู่ระหว่าง 2 ถึง 5 ตันต่อไร่ต่อปี หรือคิดเป็นระดับความลึกของดิน เท่ากับ 0.96 ถึง 2.4 มิลลิเมตรต่อปี

#### 5.9 ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การเกิดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยไฉ้ เป็นไปในลักษณะที่เกิดขึ้นโดยสภาพธรรมชาติของพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นระดับความสูญเสียที่ไม่รุนแรงมากนัก แต่ถ้าไม่มีมาตรการในการป้องกันก็อาจจะเกิดการชะล้างพังทลายที่รุนแรงตามมาในอนาคต ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการอนุรักษ์และดูแลรักษาพื้นที่ป่าผืนนี้ด้วยเช่นกัน วิธีการที่ใช้ดูแลรักษาและอนุรักษ์พื้นที่ป่ามีหลายวิธี เช่น การใช้มาตรการป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง เพราะการเกิดไฟป่าจะส่งผลกระทบต่อการทำลายไม้พื้นล่าง และลูกไม้เล็ก ๆ ที่ช่วยคลุมดินให้เกิดความเสียหาย อีกทั้งอิทธิพลของไฟปายังส่งผลกระทบต่อการทำลายลักษณะทางโครงสร้างของดิน ทำให้เนื้อดินแตกกระจายง่ายต่อการถูกพัดพาออกจากพื้นที่โดยน้ำไหลบ่าหน้าดิน หรือการดูแลรักษาพื้นที่ป่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ใหญ่ โดยมาตรการหรือกำหนดข้อบังคับไม่ให้ตัดไม้ในป่าหรือป้องกันการบุกรุกพื้นที่เพื่อนำมาทำเป็นพื้นที่เกษตร เพื่อให้ผืนป่ายังคงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญต่อไป



## เอกสารอ้างอิง

- กรมพัฒนาที่ดิน. 2528. แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ 2528. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.
- กรมพัฒนาที่ดิน. 2528. แผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:50,000 จังหวัดเชียงใหม่. 2528. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ.
- กรมทรัพยากรธรณี. 2538. แผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1: 50,000. กองสำรวจธรณีและแหล่งแร่. กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพฯ.
- ถวิล โกศลอนันตวงศ์. 2528. การประมาณค่าประสิทธิผลการควบคุมการพังทลายของดินในสมการการสูญเสียดินสากล (USLE) สำหรับป่าดิบเขาที่มีเปอร์เซ็นต์เรื้อนยอดปกคลุมในระดับต่างๆ กัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- นิพนธ์ ตั้งธรรม. 2527. การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน. ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 618 น.
- Arnoldus, H.M. 1977. Methodology used to determine the maximum potential average annual soil loss due to sheet and rill erosion in Morocco. Annex IV In: Assessing soil degradation, FAO Soil Bulletin 34, FAO, Rome.
- Darcy, H. 1859. Les Fontaines Publiques de la ville de Dijon. Victor Dalmont, Paris.
- Einstein, H.A. 1963 Deposition of suspended particles in a gravel bed. Journal of the Hydraulics Division, Proceedings of the America Society of Civil Engineering, 94 (HYS):1197 -1205.
- Hinthong, C. 1992. Environmental geology : A thematic map for landuse planning in the Lampang Area, Northern Thailand. Geological Survey Division, Department of Mineral Resources, Bangkok. pp. 368-382.
- Hudson, N. 1971. Soil conservation. London Batsford. 320 p.
- Keawwana, W. 1985. Preliminary report on Quaternary geology of Mae Taeng Basin. Geology of Surficial deposits. Department of Geologic Science, Chiang Mai Univ., Chaing Mai. pp. 403-411.

- Kilinc, M. and E.V. Richardson. 1973. Mechanics of Soil Erosion from Overland flow Generated by Simulated Rainfall. Hydrology Paper NO. 63, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, 54 pp., September 1973.
- Middleton, H.E. 1930. Physical and chemical characteristics of the soils from the erosion experiment stations. USDA Tech. Bull. No. 316.
- Morgan, R.P.C. 1981. The role of the plant cover in controlling soil erosion, pp. 255-264. In Proceeding of the South-East Asian Regional Symposium of problems of soil erosion and sedimentation, Asian Institute of Technology, Bangkok.
- Satterlund, D.R. 1972. Wildland Watershed Management. Ronald Press Co., New York. 370 p.
- Schulz, E.F. 1981. Sediment yield estimated in planning landuse changed, pp. 117 - 128. Proc. South-East Asian Regional Symposium on Problems of soil Erosion and Sedimentation. AIT and Hydraulics Res. Sta. (Wallingford, U.K.), Bangkok.
- Wischmeier, W.H. and D.D Smith. 1958. Rainfall energy and its relationship to soil loss. Trans. Amer. Geophys. Union. 39(2): 285-291.
- \_\_\_\_\_. 1965. Predicting rainfall erosion losses from cropland east of the Rocky Mountain. USDA Agri. Handbook No. 282. 47 p.
- Wischmeier, W.H., D.D Smith and R.E. Uhland. 1958. Evaluation of factors in the soil-loss equation. Agricultural Engineering, P. 458-462.
- Young, R.A., and C.K. Mutchler. 1969. Soil movement on irregular slopes. Water Resources Res. 5Z5X : 1084 - 1089.
- Zingg, A.W. 1940. Degree and length of land slope as it affects soil loss in runoff. Agri. Eng. 21:59-64.



ตารางผนวกที่ 1 ปริมาณการชะล้างพังทลายของดิน (erosion) จากแปลงศึกษา ปี 2544

แปลงป่าเบญจพรรณ

| storm     | R - factor | K - factor | L - factor | S - factor | C - factor | P - factor | A (ton/rai) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1         | 4421.68    | 0.0221     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1130     | 1          | 3.8461      |
| 4         | 378.55     | 0.0018     | 0.9511     | 2.1734     | 0.4444     | 1          | 0.1061      |
| 5         | 308.93     | 0.0030     | 0.9511     | 2.1734     | 0.3385     | 1          | 0.1099      |
| 6         | 32.26      | 0.0030     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1333     | 1          | 0.0045      |
| 10        | 34.24      | 0.0036     | 0.9511     | 2.1734     | 0.6667     | 1          | 0.0288      |
| 12        | 973.07     | 0.0069     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1699     | 1          | 0.3979      |
| 13        | 753.38     | 0.0081     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0415     | 1          | 0.0880      |
| 14        | 1171.73    | 0.0115     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0117     | 1          | 0.0548      |
| 15        | 10096.67   | 0.0139     | 0.9511     | 2.1734     | 0.2430     | 1          | 11.8898     |
| 16        | 7757.18    | 0.0170     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0814     | 1          | 3.7360      |
| 17        | 158.07     | 0.0021     | 0.9511     | 2.1734     | 0.2143     | 1          | 0.0249      |
| 25        | 579.33     | 0.0012     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1111     | 1          | 0.0271      |
| 26        | 396.03     | 0.0022     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1250     | 1          | 0.0379      |
| 28        | 5265.96    | 0.0099     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0891     | 1          | 1.6184      |
| 32        | 28469.23   | 0.0424     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1144     | 1          | 48.0022     |
| 33        | 714.03     | 0.0104     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1333     | 1          | 0.3453      |
| 35        | 395.08     | 0.0061     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0909     | 1          | 0.0767      |
| 41        | 1870.00    | 0.0184     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1405     | 1          | 1.6788      |
| 51        | 103.55     | 0.0014     | 0.9511     | 2.1734     | 0.2222     | 1          | 0.0109      |
| 59        | 9288.89    | 0.0484     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1076     | 1          | 16.8286     |
| 61        | 427.25     | 0.0020     | 0.9511     | 2.1734     | 0.2692     | 1          | 0.0786      |
| Total A   |            |            |            |            |            |            | 88.9915     |
| Average A |            |            |            |            |            |            | 4.2377      |

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

## แปลงป่าเต็งรังแคระ

| storm     | R - factor | K - factor | L - factor | S - factor | C - factor | P - factor | A (ton/rai) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1         | 4421.68    | 0.0031     | 0.9649     | 2.5003     | 0.0902     | 1          | 0.4999      |
| 4         | 378.55     | 0.0004     | 0.9649     | 2.5003     | 0.3333     | 1          | 0.0209      |
| 5         | 308.93     | 0.0007     | 0.9649     | 2.5003     | 0.0588     | 1          | 0.0049      |
| 6         | 32.26      | 0.0003     | 0.9649     | 2.5003     | 0.5000     | 1          | 0.0022      |
| 10        | 34.24      | 0.0047     | 0.9649     | 2.5003     | 0.1111     | 1          | 0.0071      |
| 12        | 973.07     | 0.0004     | 0.9649     | 2.5003     | 0.1333     | 1          | 0.0224      |
| 13        | 753.38     | 0.0003     | 0.9649     | 2.5003     | 0.1667     | 1          | 0.0174      |
| 14        | 1171.73    | 0.0005     | 0.9649     | 2.5003     | 0.3889     | 1          | 0.0944      |
| 15        | 10096.67   | 0.0010     | 0.9649     | 2.5003     | 0.1548     | 1          | 0.6046      |
| 16        | 7757.18    | 0.0006     | 0.9649     | 2.5003     | 0.8286     | 1          | 1.5041      |
| 17        | 158.07     | 0.0003     | 0.9649     | 2.5003     | 1.5000     | 1          | 0.0246      |
| 25        | 579.33     | 0.0009     | 0.9649     | 2.5003     | 0.0667     | 1          | 0.0133      |
| 26        | 396.03     | 0.0009     | 0.9649     | 2.5003     | 0.0526     | 1          | 0.0075      |
| 28        | 5265.96    | 0.0005     | 0.9649     | 2.5003     | 0.1282     | 1          | 0.1399      |
| 32        | 28469.23   | 0.0032     | 0.9649     | 2.5003     | 0.0706     | 1          | 2.5749      |
| 33        | 714.03     | 0.0005     | 0.9649     | 2.5003     | 0.3500     | 1          | 0.0518      |
| 35        | 395.08     | 0.0011     | 0.9649     | 2.5003     | 0.0741     | 1          | 0.0126      |
| 41        | 1870.00    | 0.0004     | 0.9649     | 2.5003     | 0.4286     | 1          | 0.1342      |
| 51        | 103.55     | 0.0010     | 0.9649     | 2.5003     | 0.5000     | 1          | 0.0215      |
| 59        | 9288.89    | 0.0051     | 0.9649     | 2.5003     | 0.0892     | 1          | 1.6883      |
| 61        | 427.25     | 0.0009     | 0.9649     | 2.5003     | 0.1429     | 1          | 0.0221      |
| Total A   |            |            |            |            |            |            | 7.4686      |
| Average A |            |            |            |            |            |            | 0.3556      |



ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

แปลงป่าเต็งรังรุ่น 2

| storm     | R - factor | K - factor | L - factor | S - factor | C - factor | P - factor | A (ton/rai) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1         | 4421.68    | 0.0240     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0650     | 1          | 1.2443      |
| 4         | 378.55     | 0.0018     | 0.9530     | 1.1282     | 0.2609     | 1          | 0.0318      |
| 5         | 308.93     | 0.0085     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0737     | 1          | 0.0349      |
| 6         | 32.26      | 0.0171     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0455     | 1          | 0.0045      |
| 10        | 34.24      | 0.0465     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1250     | 1          | 0.0359      |
| 12        | 973.07     | 0.0092     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0210     | 1          | 0.0340      |
| 13        | 753.38     | 0.0160     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0121     | 1          | 0.0264      |
| 14        | 1171.73    | 0.0171     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0491     | 1          | 0.1776      |
| 15        | 10096.67   | 0.0270     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0660     | 1          | 3.2489      |
| 16        | 7757.18    | 0.0167     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0831     | 1          | 1.9430      |
| 17        | 158.07     | 0.0160     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0182     | 1          | 0.0083      |
| 25        | 579.33     | 0.0074     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0351     | 1          | 0.0270      |
| 26        | 396.03     | 0.0031     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0690     | 1          | 0.0151      |
| 28        | 5265.96    | 0.0200     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0849     | 1          | 1.6151      |
| 32        | 28469.23   | 0.0245     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1120     | 1          | 14.1214     |
| 33        | 714.03     | 0.0243     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0383     | 1          | 0.1199      |
| 35        | 395.08     | 0.0067     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0533     | 1          | 0.0255      |
| 41        | 1870.00    | 0.0173     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0827     | 1          | 0.4830      |
| 51        | 103.55     | 0.0203     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0571     | 1          | 0.0217      |
| 59        | 9288.89    | 0.0244     | 0.9530     | 1.1282     | 0.2088     | 1          | 8.5471      |
| 61        | 427.25     | 0.0070     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1042     | 1          | 0.0560      |
| Total A   |            |            |            |            |            |            | 31.8215     |
| Average A |            |            |            |            |            |            | 1.5153      |

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

## แปลงป่าปลูก

| storm     | R - factor | K - factor | L - factor | S - factor | C - factor | P - factor | A (ton/rai) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1         | 4421.68    | 0.0033     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1214     | 1          | 0.3582      |
| 4         | 378.55     | 0.0010     | 0.9537     | 1.2494     | 0.5714     | 1          | 0.0423      |
| 5         | 308.93     | 0.0015     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1579     | 1          | 0.0149      |
| 6         | 32.26      | 0.0014     | 0.9537     | 1.2494     | 0.2500     | 1          | 0.0023      |
| 10        | 34.24      | 0.0073     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1429     | 1          | 0.0072      |
| 12        | 973.07     | 0.0013     | 0.9537     | 1.2494     | 0.0870     | 1          | 0.0227      |
| 13        | 753.38     | 0.0016     | 0.9537     | 1.2494     | 0.0357     | 1          | 0.0088      |
| 14        | 1171.73    | 0.0045     | 0.9537     | 1.2494     | 0.0513     | 1          | 0.0546      |
| 15        | 10096.67   | 0.0041     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1023     | 1          | 0.8469      |
| 16        | 7757.18    | 0.0041     | 0.9537     | 1.2494     | 0.0750     | 1          | 0.4723      |
| 17        | 158.07     | 0.0013     | 0.9537     | 1.2494     | 0.2000     | 1          | 0.0083      |
| 25        | 579.33     | 0.0009     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1250     | 1          | 0.0135      |
| 26        | 396.03     | 0.0010     | 0.9537     | 1.2494     | 0.2000     | 1          | 0.0151      |
| 28        | 5265.96    | 0.0029     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1698     | 1          | 0.5097      |
| 32        | 28469.23   | 0.0034     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1341     | 1          | 2.6051      |
| 33        | 714.03     | 0.0041     | 0.9537     | 1.2494     | 0.0256     | 1          | 0.0150      |
| 35        | 395.08     | 0.0021     | 0.9537     | 1.2494     | 0.0385     | 1          | 0.0064      |
| 41        | 1870.00    | 0.0036     | 0.9537     | 1.2494     | 0.0222     | 1          | 0.0302      |
| 51        | 103.55     | 0.0018     | 0.9537     | 1.2494     | 0.2857     | 1          | 0.0109      |
| 59        | 9288.89    | 0.0057     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1136     | 1          | 1.1987      |
| 61        | 427.25     | 0.0009     | 0.9537     | 1.2494     | 0.5714     | 1          | 0.0448      |
| Total A   |            |            |            |            |            |            | 6.2877      |
| Average A |            |            |            |            |            |            | 0.2994      |



## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

## แปลงสวนมะม่วง

| storm     | R - factor | K - factor | L - factor | S - factor | C - factor | P - factor | A (ton/rai) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1         | 4421.68    | 0.0034     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1550     | 1          | 0.4218      |
| 4         | 378.55     | 0.0002     | 0.9530     | 1.1282     | 0.3333     | 1          | 0.0053      |
| 5         | 308.93     | 0.0006     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1429     | 1          | 0.0050      |
| 6         | 32.26      | 0.0008     | 0.9530     | 1.1282     | 1.0000     | 1          | 0.0045      |
| 10        | 34.24      | 0.0035     | 0.9530     | 1.1282     | 0.3333     | 1          | 0.0072      |
| 12        | 973.07     | 0.0005     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1429     | 1          | 0.0113      |
| 13        | 753.38     | 0.0003     | 0.9530     | 1.1282     | 0.2000     | 1          | 0.0088      |
| 14        | 1171.73    | 0.0005     | 0.9530     | 1.1282     | 0.2500     | 1          | 0.0273      |
| 15        | 10096.67   | 0.0056     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1106     | 1          | 1.1301      |
| 16        | 7757.18    | 0.0023     | 0.9530     | 1.1282     | 0.2295     | 1          | 0.7352      |
| 17        | 158.07     | 0.0006     | 0.9530     | 1.1282     | 0.5000     | 1          | 0.0083      |
| 25        | 579.33     | 0.0003     | 0.9530     | 1.1282     | 1.0000     | 1          | 0.0270      |
| 26        | 396.03     | 0.0005     | 0.9530     | 1.1282     | 0.2000     | 1          | 0.0076      |
| 28        | 5265.96    | 0.0029     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1667     | 1          | 0.4534      |
| 32        | 28469.23   | 0.0077     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0795     | 1          | 3.1502      |
| 33        | 714.03     | 0.0016     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1111     | 1          | 0.0225      |
| 35        | 395.08     | 0.0007     | 0.9530     | 1.1282     | 0.2500     | 1          | 0.0128      |
| 41        | 1870.00    | 0.0006     | 0.9530     | 1.1282     | 0.2143     | 1          | 0.0453      |
| 51        | 103.55     | 0.0006     | 0.9530     | 1.1282     | 1.0000     | 1          | 0.0109      |
| 59        | 9288.89    | 0.0081     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0859     | 1          | 1.1696      |
| 61        | 427.25     | 0.0004     | 0.9530     | 1.1282     | 0.3333     | 1          | 0.0112      |
| Total A   |            |            |            |            |            |            | 7.2750      |
| Average A |            |            |            |            |            |            | 0.3464      |

ตารางผนวกที่ 2 ปริมาณการชะล้างพังทลายของดิน (erosion) จากแปลงศึกษา ปี 2545

แปลงป่าเบญจพรรณ

| storm     | R - factor | K - factor | L - factor | S - factor | C - factor | P - factor | A (ton/rai) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 2         | 1755.48    | 0.0209     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1132     | 1          | 1.4431      |
| 10        | 6161.94    | 0.0635     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0350     | 1          | 4.7600      |
| 14        | 273.44     | 0.0073     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1270     | 1          | 0.0876      |
| 21        | 1857.04    | 0.0086     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1082     | 1          | 0.5976      |
| 27        | 2382.40    | 0.0586     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0819     | 1          | 3.9801      |
| 28        | 2630.18    | 0.0372     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0369     | 1          | 1.2575      |
| 29        | 781.18     | 0.0133     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0462     | 1          | 0.1671      |
| 30        | 1957.69    | 0.0306     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0311     | 1          | 0.6482      |
| 31        | 289.26     | 0.0121     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0507     | 1          | 0.0615      |
| 33        | 622.90     | 0.0144     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0362     | 1          | 0.1129      |
| 42        | 279.74     | 0.0070     | 0.9511     | 2.1734     | 0.3448     | 1          | 0.2353      |
| 45        | 1738.29    | 0.0100     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1880     | 1          | 1.1375      |
| 46        | 406.64     | 0.0056     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0816     | 1          | 0.0644      |
| 48        | 2223.56    | 0.0246     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0295     | 1          | 0.5611      |
| 53        | 157.28     | 0.0107     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0261     | 1          | 0.0153      |
| 57        | 281.66     | 0.0139     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0349     | 1          | 0.0474      |
| 65        | 2007.09    | 0.0116     | 0.9511     | 2.1734     | 0.1171     | 1          | 0.9485      |
| 66        | 8621.14    | 0.0611     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0828     | 1          | 15.1778     |
| 68        | 2756.47    | 0.0637     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0720     | 1          | 4.3987      |
| 70        | 8136.42    | 0.1298     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0183     | 1          | 6.7013      |
| 83        | 2918.16    | 0.0096     | 0.9511     | 2.1734     | 0.0803     | 1          | 0.7855      |
| Total A   |            |            |            |            |            |            | 43.1882     |
| Average A |            |            |            |            |            |            | 2.0566      |



## ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

## แปลงป่าเต็งรังกระ

| storm     | R - factor | K - factor | L - factor | S - factor | C - factor | P - factor | A (ton/rai) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 2         | 1755.48    | 0.0028     | 0.9649     | 2.5003     | 0.9322     | 1          | 1.8193      |
| 10        | 6161.94    | 0.0071     | 0.9649     | 2.5003     | 0.3249     | 1          | 5.6941      |
| 14        | 273.44     | 0.0002     | 0.9649     | 2.5003     | 5.0000     | 1          | 0.1080      |
| 21        | 1857.04    | 0.0020     | 0.9649     | 2.5003     | 0.2055     | 1          | 0.3047      |
| 27        | 2382.40    | 0.0071     | 0.9649     | 2.5003     | 0.0043     | 1          | 0.0292      |
| 28        | 2630.18    | 0.0053     | 0.9649     | 2.5003     | 0.3488     | 1          | 1.9571      |
| 29        | 781.18     | 0.0011     | 0.9649     | 2.5003     | 0.0938     | 1          | 0.0329      |
| 30        | 1957.69    | 0.0023     | 0.9649     | 2.5003     | 0.7264     | 1          | 1.3295      |
| 31        | 289.26     | 0.0006     | 0.9649     | 2.5003     | 0.0769     | 1          | 0.0055      |
| 33        | 622.90     | 0.0017     | 0.9649     | 2.5003     | 0.0526     | 1          | 0.0223      |
| 42        | 279.74     | 0.0029     | 0.9649     | 2.5003     | 0.1786     | 1          | 0.0580      |
| 45        | 1738.29    | 0.0016     | 0.9649     | 2.5003     | 0.1791     | 1          | 0.2038      |
| 46        | 406.64     | 0.0008     | 0.9649     | 2.5003     | 0.1176     | 1          | 0.0159      |
| 48        | 2223.56    | 0.0080     | 0.9649     | 2.5003     | 0.1731     | 1          | 1.2351      |
| 53        | 157.28     | 0.0013     | 0.9649     | 2.5003     | 0.2727     | 1          | 0.0227      |
| 57        | 281.66     | 0.0001     | 0.9649     | 2.5003     | 1.5000     | 1          | 0.0234      |
| 65        | 2007.09    | 0.0016     | 0.9649     | 2.5003     | 2.1389     | 1          | 2.7686      |
| 66        | 8621.14    | 0.0092     | 0.9649     | 2.5003     | 1.0185     | 1          | 32.2175     |
| 68        | 2756.47    | 0.0071     | 0.9649     | 2.5003     | 0.0598     | 1          | 0.4687      |
| 70        | 8136.42    | 0.0219     | 0.9649     | 2.5003     | 0.1724     | 1          | 12.2967     |
| 83        | 2918.16    | 0.0008     | 0.9649     | 2.5003     | 1.1379     | 1          | 1.0645      |
| Total A   |            |            |            |            |            |            | 61.6773     |
| Average A |            |            |            |            |            |            | 2.9370      |

## ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

## แปลงป่าเต็งรังรุ่น 2

| storm     | R - factor | K - factor | L - factor | S - factor | C - factor | P - factor | A (ton/rai) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 2         | 1755.48    | 0.0180     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1235     | 1          | 0.7033      |
| 10        | 6161.94    | 0.0340     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1504     | 1          | 5.6841      |
| 14        | 273.44     | 0.0256     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0087     | 1          | 0.0109      |
| 21        | 1857.04    | 0.0160     | 0.9530     | 1.1282     | 1.2031     | 1          | 6.4575      |
| 27        | 2382.40    | 0.0311     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0210     | 1          | 0.2805      |
| 28        | 2630.18    | 0.0235     | 0.9530     | 1.1282     | 0.5483     | 1          | 6.1207      |
| 29        | 781.18     | 0.0081     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1748     | 1          | 0.2001      |
| 30        | 1957.69    | 0.0156     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0791     | 1          | 0.4371      |
| 31        | 289.26     | 0.0077     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0417     | 1          | 0.0167      |
| 33        | 622.90     | 0.0163     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0798     | 1          | 0.1465      |
| 42        | 279.74     | 0.0044     | 0.9530     | 1.1282     | 0.9474     | 1          | 0.2113      |
| 45        | 1738.29    | 0.0168     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0784     | 1          | 0.4128      |
| 46        | 406.64     | 0.0089     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0494     | 1          | 0.0321      |
| 48        | 2223.56    | 0.0166     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0782     | 1          | 0.5226      |
| 53        | 157.28     | 0.0051     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0526     | 1          | 0.0076      |
| 57        | 281.66     | 0.0020     | 0.9530     | 1.1282     | 0.4615     | 1          | 0.0473      |
| 65        | 2007.09    | 0.0141     | 0.9530     | 1.1282     | 0.8500     | 1          | 4.3321      |
| 66        | 8621.14    | 0.0490     | 0.9530     | 1.1282     | 0.2261     | 1          | 17.2258     |
| 68        | 2756.47    | 0.0323     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1257     | 1          | 2.0169      |
| 70        | 8136.42    | 0.0810     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1711     | 1          | 20.3475     |
| 83        | 2918.16    | 0.0127     | 0.9530     | 1.1282     | 1.4244     | 1          | 9.5370      |
| Total A   |            |            |            |            |            |            | 74.7505     |
| Average A |            |            |            |            |            |            | 3.5595      |



## ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

## แปลงป่าปลูก

| storm     | R - factor | K - factor | L - factor | S - factor | C - factor | P - factor | A (ton/rai) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 2         | 1755.48    | 0.0069     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1310     | 1          | 0.3179      |
| 10        | 6161.94    | 0.0078     | 0.9537     | 1.2494     | 0.4454     | 1          | 4.3004      |
| 14        | 273.44     | 0.0078     | 0.9537     | 1.2494     | 0.0256     | 1          | 0.0109      |
| 21        | 1857.04    | 0.0094     | 0.9537     | 1.2494     | 0.4059     | 1          | 1.4179      |
| 27        | 2382.40    | 0.0101     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1101     | 1          | 0.5312      |
| 28        | 2630.18    | 0.0154     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1332     | 1          | 1.0780      |
| 29        | 781.18     | 0.0072     | 0.9537     | 1.2494     | 0.0198     | 1          | 0.0222      |
| 30        | 1957.69    | 0.0098     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1682     | 1          | 0.6464      |
| 31        | 289.26     | 0.0036     | 0.9537     | 1.2494     | 0.4054     | 1          | 0.0836      |
| 33        | 622.90     | 0.0075     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1325     | 1          | 0.1239      |
| 42        | 279.74     | 0.0004     | 0.9537     | 1.2494     | 6.5000     | 1          | 0.1525      |
| 45        | 1738.29    | 0.0211     | 0.9537     | 1.2494     | 0.0423     | 1          | 0.3094      |
| 46        | 406.64     | 0.0018     | 0.9537     | 1.2494     | 0.2778     | 1          | 0.0401      |
| 48        | 2223.56    | 0.0107     | 0.9537     | 1.2494     | 0.1529     | 1          | 0.7274      |
| 53        | 157.28     | 0.0035     | 0.9537     | 1.2494     | 0.0345     | 1          | 0.0038      |
| 57        | 281.66     | 0.0064     | 0.9537     | 1.2494     | 0.2391     | 1          | 0.0866      |
| 65        | 2007.09    | 0.0074     | 0.9537     | 1.2494     | 0.8415     | 1          | 2.5100      |
| 66        | 8621.14    | 0.0204     | 0.9537     | 1.2494     | 0.7085     | 1          | 24.8796     |
| 68        | 2756.47    | 0.0170     | 0.9537     | 1.2494     | 0.0704     | 1          | 0.6605      |
| 70        | 8136.42    | 0.1380     | 0.9537     | 1.2494     | 0.0168     | 1          | 3.7679      |
| 83        | 2918.16    | 0.0076     | 0.9537     | 1.2494     | 0.4000     | 1          | 1.7624      |
| Total A   |            |            |            |            |            |            | 43.4328     |
| Average A |            |            |            |            |            |            | 2.0682      |

## ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

## แปลงสวนมะม่วง

| storm     | R - factor | K - factor | L - factor | S - factor | C - factor | P - factor | A (ton/rai) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 2         | 1755.48    | 0.0034     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0615     | 1          | 0.0670      |
| 10        | 6161.94    | 0.0076     | 0.9530     | 1.1282     | 0.2077     | 1          | 1.7458      |
| 14        | 273.44     | 0.0075     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0588     | 1          | 0.0219      |
| 21        | 1857.04    | 0.0052     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0824     | 1          | 0.1440      |
| 27        | 2382.40    | 0.0089     | 0.9530     | 1.1282     | 0.1192     | 1          | 0.4577      |
| 28        | 2630.18    | 0.0058     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0800     | 1          | 0.2202      |
| 29        | 781.18     | 0.0038     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0625     | 1          | 0.0333      |
| 30        | 1957.69    | 0.0064     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0154     | 1          | 0.0350      |
| 31        | 289.26     | 0.0029     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0370     | 1          | 0.0056      |
| 33        | 622.90     | 0.0051     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0588     | 1          | 0.0338      |
| 42        | 279.74     | 0.0033     | 0.9530     | 1.1282     | 0.3571     | 1          | 0.0587      |
| 45        | 1738.29    | 0.0047     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0235     | 1          | 0.0344      |
| 46        | 406.64     | 0.0016     | 0.9530     | 1.1282     | 0.3333     | 1          | 0.0402      |
| 48        | 2223.56    | 0.0046     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0714     | 1          | 0.1307      |
| 53        | 157.28     | 0.0007     | 0.9530     | 1.1282     | 0.4000     | 1          | 0.0076      |
| 57        | 281.66     | 0.0047     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0667     | 1          | 0.0158      |
| 65        | 2007.09    | 0.0075     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0267     | 1          | 0.0728      |
| 66        | 8621.14    | 0.0212     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0555     | 1          | 1.8315      |
| 68        | 2756.47    | 0.0163     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0438     | 1          | 0.3559      |
| 70        | 8136.42    | 0.0173     | 0.9530     | 1.1282     | 0.0294     | 1          | 0.7470      |
| 83        | 2918.16    | 0.0034     | 0.9530     | 1.1282     | 0.2545     | 1          | 0.4573      |
| Total A   |            |            |            |            |            |            | 6.5161      |
| Average A |            |            |            |            |            |            | 0.3103      |



ตารางผนวกที่ 3 การประเมินปัจจัยด้านความยากง่ายต่อการสูญเสียดิน (K - factor) แบบกริดของพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโจ

| Grid No | Landuse<br>type | Area ratio | Existing<br>K - factor | Weighted<br>K - factor | Total weight of<br>K - factor |
|---------|-----------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1       | DD              | 0.0625     | 0.0027                 | 0.00017                | 0.00017                       |
| 2       | DD              | 0.1875     | 0.0027                 | 0.00051                | 0.00051                       |
| 3       | DD              | 0.0781     | 0.0027                 | 0.00021                | 0.00021                       |
| 4       | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 5       | DD              | 0.1094     | 0.0027                 | 0.00030                | 0.00030                       |
| 6       | DD              | 0.0078     | 0.0027                 | 0.00002                | 0.00002                       |
| 7       | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 8       | DD              | 0.1437     | 0.0027                 | 0.00039                | 0.00039                       |
| 9       | DD              | 0.0390     | 0.0027                 | 0.00011                | 0.00011                       |
| 10      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 11      | DD              | 0.0600     | 0.0027                 | 0.00016                | 0.00016                       |
| 12      | DD              | 0.1875     | 0.0027                 | 0.00051                | 0.00177                       |
|         | MD              | 0.0625     | 0.0202                 | 0.00126                |                               |
| 13      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 14      | DD              | 0.2343     | 0.0027                 | 0.00063                | 0.00063                       |
| 15      | DD              | 0.0438     | 0.0027                 | 0.00012                | 0.00428                       |
|         | MD              | 0.2063     | 0.0202                 | 0.00417                |                               |
| 16      | DD              | 0.2188     | 0.0027                 | 0.00059                | 0.00122                       |
|         | MD              | 0.0313     | 0.0202                 | 0.00063                |                               |
| 17      | DD              | 0.1250     | 0.0027                 | 0.00034                | 0.00034                       |
| 18      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 19      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 20      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 21      | DD              | 0.1563     | 0.0027                 | 0.00042                | 0.00042                       |
| 22      | DD              | 0.1250     | 0.0027                 | 0.00034                | 0.00034                       |
| 23      | DD              | 0.0313     | 0.0027                 | 0.00008                | 0.00450                       |
|         | MD              | 0.2188     | 0.0202                 | 0.00442                |                               |
| 24      | DD              | 0.0313     | 0.0027                 | 0.00008                | 0.00450                       |
|         | MD              | 0.2188     | 0.0202                 | 0.00442                |                               |

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

| Grid No | Landuse<br>type | Area ratio | Existing<br>K - factor | Weighted<br>K - factor | Total weight of<br>K - factor |
|---------|-----------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 25      | DD              | 0.1200     | 0.0027                 | 0.00032                | 0.00295                       |
|         | MD              | 0.1300     | 0.0202                 | 0.00263                |                               |
| 26      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 27      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 28      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 29      | DD              | 0.0156     | 0.0027                 | 0.00004                | 0.00004                       |
| 30      | DD              | 0.1562     | 0.0027                 | 0.00042                | 0.00042                       |
| 31      | DD              | 0.1875     | 0.0027                 | 0.00051                | 0.00177                       |
|         | MD              | 0.0625     | 0.0202                 | 0.00126                |                               |
| 32      | MD              | 0.2500     | 0.0202                 | 0.00505                | 0.00505                       |
| 33      | DD              | 0.0313     | 0.0027                 | 0.00008                | 0.00450                       |
|         | MD              | 0.2188     | 0.0202                 | 0.00442                |                               |
| 34      | DD              | 0.1875     | 0.0027                 | 0.00051                | 0.00177                       |
|         | MD              | 0.0625     | 0.0202                 | 0.00126                |                               |
| 35      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 36      | DD              | 0.1250     | 0.0027                 | 0.00034                | 0.00034                       |
| 37      | DD              | 0.0156     | 0.0027                 | 0.00004                | 0.00004                       |
| 38      | DD              | 0.0625     | 0.0027                 | 0.00017                | 0.00396                       |
|         | MD              | 0.1875     | 0.0202                 | 0.00379                |                               |
| 39      | MD              | 0.2500     | 0.0202                 | 0.00505                | 0.00505                       |
| 40      | DD              | 0.1750     | 0.0027                 | 0.00047                | 0.00199                       |
|         | MD              | 0.0750     | 0.0202                 | 0.00152                |                               |
| 41      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 42      | DD              | 0.2343     | 0.0027                 | 0.00063                | 0.00063                       |
| 43      | DD              | 0.0625     | 0.0027                 | 0.00017                | 0.00017                       |
| 44      | MD              | 0.0156     | 0.0202                 | 0.00032                | 0.00032                       |
| 45      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 46      | DD              | 0.0813     | 0.0027                 | 0.00022                | 0.00022                       |
| 47      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |



## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

| Grid No | Landuse<br>type | Area ratio | Existing<br>K - factor | Weighted<br>K - factor | Total weight of<br>K - factor |
|---------|-----------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 48      | DD              | 0.1250     | 0.0027                 | 0.00034                | 0.00160                       |
|         | MD              | 0.0625     | 0.0202                 | 0.00126                |                               |
| 49      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 50      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 51      | DD              | 0.1094     | 0.0027                 | 0.00030                | 0.00030                       |
| 52      | MD              | 0.0625     | 0.0202                 | 0.00126                | 0.00126                       |
| 53      | MD              | 0.2500     | 0.0202                 | 0.00505                | 0.00505                       |
| 54      | DD              | 0.1250     | 0.0027                 | 0.00034                | 0.00286                       |
|         | MD              | 0.1250     | 0.0202                 | 0.00253                |                               |
| 55      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 56      | DD              | 0.0625     | 0.0027                 | 0.00017                | 0.00017                       |
| 57      | DD              | 0.2188     | 0.0027                 | 0.00059                | 0.00059                       |
| 58      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 59      | DD              | 0.2500     | 0.0027                 | 0.00068                | 0.00068                       |
| 60      | DD              | 0.0625     | 0.0027                 | 0.00017                | 0.00017                       |
| 61      | MD              | 0.0625     | 0.0202                 | 0.00126                | 0.00159                       |
|         | OR              | 0.0742     | 0.0044                 | 0.00033                |                               |
| 62      | MD              | 0.0156     | 0.0202                 | 0.00032                | 0.00114                       |
|         | OR              | 0.1875     | 0.0044                 | 0.00083                |                               |
| 63      | MD              | 0.1563     | 0.0202                 | 0.00316                | 0.00357                       |
|         | OR              | 0.0938     | 0.0044                 | 0.00041                |                               |
| 64      | DD              | 0.0938     | 0.0027                 | 0.00025                | 0.00341                       |
|         | MD              | 0.1563     | 0.0202                 | 0.00316                |                               |
| 65      | DD              | 0.0781     | 0.0027                 | 0.00021                | 0.00055                       |
|         | OR              | 0.0781     | 0.0044                 | 0.00034                |                               |
| 66      | DD              | 0.1563     | 0.0027                 | 0.00042                | 0.00042                       |
| 67      | DD              | 0.0156     | 0.0027                 | 0.00004                | 0.00004                       |
| 68      | OR              | 0.1563     | 0.0044                 | 0.00069                | 0.00069                       |
| 69      | MD              | 0.1563     | 0.0202                 | 0.00316                | 0.00357                       |
|         | OR              | 0.0938     | 0.0044                 | 0.00041                |                               |

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

| Grid No | Landuse<br>type | Area ratio | Existing<br>K - factor | Weighted<br>K - factor | Total weight of<br>K - factor |
|---------|-----------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 70      | MD              | 0.2188     | 0.0202                 | 0.00442                | 0.00456                       |
|         | OR              | 0.0313     | 0.0044                 | 0.00014                |                               |
| 71      | MD              | 0.1250     | 0.0202                 | 0.00253                | 0.00308                       |
|         | OR              | 0.1250     | 0.0044                 | 0.00055                |                               |
| 72      | MD              | 0.1250     | 0.0202                 | 0.00253                | 0.00253                       |
| 73      | MD              | 0.0469     | 0.0202                 | 0.00095                | 0.00150                       |
|         | OR              | 0.1250     | 0.0044                 | 0.00055                |                               |
| 74      | MD              | 0.1563     | 0.0202                 | 0.00316                | 0.00329                       |
|         | OR              | 0.0313     | 0.0044                 | 0.00014                |                               |
| 75      | MD              | 0.0390     | 0.0202                 | 0.00079                | 0.00096                       |
|         | OR              | 0.0390     | 0.0044                 | 0.00017                |                               |
| 76      | OR              | 0.0625     | 0.0044                 | 0.00028                | 0.00028                       |
| 77      | OR              | 0.1250     | 0.0044                 | 0.00055                | 0.00055                       |
| 78      | MD              | 0.0234     | 0.0202                 | 0.00047                | 0.00075                       |
|         | OR              | 0.0625     | 0.0044                 | 0.00028                |                               |
| 79      | MD              | 0.0313     | 0.0202                 | 0.00063                | 0.00063                       |
| 80      | OR              | 0.0156     | 0.0044                 | 0.00007                | 0.00007                       |
| 81      | OR              | 0.0156     | 0.0044                 | 0.00007                | 0.00007                       |

หมายเหตุ : DD = ป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest)  
 MD = ป่าเบญจพรรณ (Mixed dipterocarp forest)  
 OR = สวนไม้ผล (Orchard)



ตารางผนวกที่ 4 การหาค่าปัจจัยด้านสภาพความลาดชัน (LS - factor) ของพื้นที่รับน้ำ

| Grid No | Slope length<br>(km) | Area<br>(sq.km) | Area ratio<br>(= 0.25) | Weighted<br>slope length | Total<br>weight slope | % slope | LS - factor |
|---------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 1       | 0.300                | 62.50           | 0.0625                 | 0.0188                   | 0.0188                | 40      | 6.092       |
| 2       | 0.850                | 187.50          | 0.1875                 | 0.1594                   | 0.1594                | 50      | 17.222      |
| 3       | 0.325                | 78.13           | 0.0781                 | 0.0254                   | 0.0254                | 35      | 5.005       |
| 4       | 0.250                | 93.75           | 0.0938                 | 0.0234                   | 0.0703                | 38      | 4.850       |
|         | 0.300                | 156.25          | 0.1563                 | 0.0469                   |                       |         |             |
| 5       | 0.350                | 109.40          | 0.1094                 | 0.0383                   | 0.0383                | 83      | 26.453      |
| 6       | 0.100                | 7.80            | 0.0078                 | 0.0008                   | 0.0008                | 27      | 1.507       |
| 7       | 0.600                | 250.00          | 0.2500                 | 0.1500                   | 0.1500                | 57      | 17.874      |
| 8       | 0.150                | 50.00           | 0.0500                 | 0.0075                   | 0.0403                | 45      | 4.933       |
|         | 0.350                | 93.75           | 0.0938                 | 0.0328                   |                       |         |             |
| 9       | 0.450                | 39.00           | 0.0390                 | 0.0176                   | 0.0176                | 29      | 4.200       |
| 10      | 0.220                | 62.50           | 0.0625                 | 0.0138                   | 0.1244                | 20      | 1.512       |
|         | 0.590                | 187.50          | 0.1875                 | 0.1106                   |                       |         |             |
| 11      | 0.550                | 64.50           | 0.0645                 | 0.0355                   | 0.0355                | 27      | 4.190       |
| 12      | 0.450                | 156.25          | 0.1563                 | 0.0703                   | 0.0867                | 34      | 5.888       |
|         | 0.175                | 93.75           | 0.0938                 | 0.0164                   |                       |         |             |
| 13      | 0.800                | 125.00          | 0.1250                 | 0.1000                   | 0.1375                | 39      | 10.302      |
|         | 0.300                | 125.00          | 0.1250                 | 0.0375                   |                       |         |             |
| 14      | 0.800                | 234.30          | 0.2343                 | 0.1874                   | 0.1874                | 40      | 10.973      |
| 15      | 0.175                | 62.50           | 0.0625                 | 0.0109                   | 0.1516                | 18      | 1.023       |
|         | 0.750                | 187.50          | 0.1875                 | 0.1406                   |                       |         |             |
| 16      | 0.460                | 156.25          | 0.1563                 | 0.0719                   | 0.0944                | 49      | 11.638      |
|         | 0.240                | 93.75           | 0.0938                 | 0.0225                   |                       |         |             |
| 17      | 0.275                | 125.00          | 0.1250                 | 0.0344                   | 0.0344                | 60      | 12.331      |
| 18      | 0.225                | 78.13           | 0.0781                 | 0.0176                   | 0.1040                | 44      | 6.109       |
|         | 0.503                | 171.88          | 0.1719                 | 0.0865                   |                       |         |             |
| 19      | 0.270                | 93.75           | 0.0938                 | 0.0253                   | 0.1113                | 30      | 3.338       |
|         | 0.550                | 156.25          | 0.1563                 | 0.0859                   |                       |         |             |
| 20      | 0.180                | 87.50           | 0.0875                 | 0.0158                   | 0.0970                | 38      | 4.007       |
|         | 0.500                | 162.50          | 0.1625                 | 0.0813                   |                       |         |             |

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

| Grid No | Slope length<br>(km) | Area<br>(sq.km) | Area ratio<br>(= 0.25) | Weighted<br>slope length | Total<br>weight slope | % slope | LS - factor |
|---------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 21      | 0.375                | 156.25          | 0.1563                 | 0.0586                   | 0.0586                | 40      | 6.965       |
| 22      | 0.325                | 125.00          | 0.1250                 | 0.0406                   | 0.0406                | 40      | 6.392       |
| 23      | 0.180                | 109.40          | 0.1094                 | 0.0197                   | 0.0956                | 31      | 2.737       |
|         | 0.540                | 140.63          | 0.1406                 | 0.0759                   |                       |         |             |
| 24      | 0.100                | 15.63           | 0.0156                 | 0.0016                   | 0.0445                | 42      | 3.499       |
|         | 0.200                | 78.13           | 0.0781                 | 0.0156                   |                       |         |             |
|         | 0.175                | 156.25          | 0.1563                 | 0.0273                   |                       |         |             |
| 25      | 0.275                | 156.25          | 0.1563                 | 0.0430                   | 0.0992                | 45      | 7.190       |
|         | 0.600                | 93.75           | 0.0938                 | 0.0563                   |                       |         |             |
| 26      | 0.275                | 141.00          | 0.1410                 | 0.0388                   | 0.0998                | 33      | 4.165       |
|         | 0.560                | 109.00          | 0.1090                 | 0.0610                   |                       |         |             |
| 27      | 0.200                | 62.50           | 0.0625                 | 0.0125                   | 0.1484                | 36      | 3.902       |
|         | 0.725                | 187.50          | 0.1875                 | 0.1359                   |                       |         |             |
| 28      | 0.375                | 156.25          | 0.1563                 | 0.0586                   | 0.0961                | 11      | 1.016       |
|         | 0.400                | 93.75           | 0.0938                 | 0.0375                   |                       |         |             |
| 29      | 0.050                | 15.63           | 0.0156                 | 0.0008                   | 0.0008                | 40      | 2.079       |
| 30      | 0.400                | 156.20          | 0.1562                 | 0.0625                   | 0.0625                | 53      | 12.351      |
| 31      | 0.300                | 84.40           | 0.0844                 | 0.0253                   | 0.1909                | 17      | 1.322       |
|         | 1.000                | 165.60          | 0.1656                 | 0.1656                   |                       |         |             |
| 32      | 0.240                | 46.88           | 0.0469                 | 0.0113                   | 0.1179                | 12      | 0.659       |
|         | 0.525                | 203.13          | 0.2031                 | 0.1066                   |                       |         |             |
| 33      | 0.600                | 250.00          | 0.2500                 | 0.1500                   | 0.1500                | 53      | 15.753      |
| 34      | 0.275                | 250.00          | 0.2500                 | 0.0688                   | 0.0688                | 48      | 8.108       |
| 35      | 1.050                | 62.50           | 0.0625                 | 0.0656                   | 0.0891                | 41      | 13.520      |
|         | 0.125                | 187.50          | 0.1875                 | 0.0234                   |                       |         |             |
| 36      | 0.650                | 125.00          | 0.1250                 | 0.0813                   | 0.0813                | 40      | 9.688       |
| 37      | 0.075                | 15.63           | 0.0156                 | 0.0012                   | 0.0012                | 53      | 4.476       |
| 38      | 0.575                | 125.00          | 0.1250                 | 0.0719                   | 0.1094                | 36      | 7.419       |
|         | 0.300                | 125.00          | 0.1250                 | 0.0375                   |                       |         |             |



ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

| Grid No | Slope length<br>(km) | Area<br>(sq.km) | Area ratio<br>(= 0.25) | Weighted<br>slope length | Total<br>weight slope | % slope | LS - factor |
|---------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 39      | 0.160                | 62.50           | 0.0625                 | 0.0100                   | 0.2069                | 20      | 1.255       |
|         | 1.050                | 187.50          | 0.1875                 | 0.1969                   |                       |         |             |
| 40      | 0.400                | 140.63          | 0.1406                 | 0.0563                   | 0.1109                | 30      | 4.346       |
|         | 0.500                | 109.38          | 0.1094                 | 0.0547                   |                       |         |             |
| 41      | 0.430                | 25.00           | 0.0250                 | 0.0108                   | 0.1120                | 15      | 1.389       |
|         | 0.450                | 225.00          | 0.2250                 | 0.1013                   |                       |         |             |
| 42      | 0.550                | 234.30          | 0.2343                 | 0.1289                   | 0.1289                | 45      | 10.897      |
| 43      | 0.150                | 62.50           | 0.0625                 | 0.0094                   | 0.0094                | 45      | 4.998       |
| 44      | 0.075                | 15.63           | 0.0156                 | 0.0012                   | 0.0012                | 22      | 0.909       |
| 45      | 0.150                | 93.75           | 0.0938                 | 0.0141                   | 0.0727                | 35      | 3.147       |
|         | 0.375                | 156.25          | 0.1563                 | 0.0586                   |                       |         |             |
| 46      | 0.200                | 62.50           | 0.0625                 | 0.0125                   | 0.0158                | 43      | 5.441       |
|         | 0.175                | 18.75           | 0.0188                 | 0.0033                   |                       |         |             |
| 47      | 0.150                | 93.75           | 0.0938                 | 0.0141                   | 0.1039                | 42      | 4.321       |
|         | 0.575                | 156.25          | 0.1563                 | 0.0898                   |                       |         |             |
| 48      | 0.100                | 62.50           | 0.0625                 | 0.0063                   | 0.0500                | 23      | 1.167       |
|         | 0.350                | 125.00          | 0.1250                 | 0.0438                   |                       |         |             |
| 49      | 0.175                | 62.50           | 0.0625                 | 0.0109                   | 0.1094                | 36      | 3.657       |
|         | 0.525                | 187.50          | 0.1875                 | 0.0984                   |                       |         |             |
| 50      | 0.160                | 93.75           | 0.0938                 | 0.0150                   | 0.0994                | 40      | 4.190       |
|         | 0.540                | 156.25          | 0.1563                 | 0.0844                   |                       |         |             |
| 51      | 0.200                | 109.40          | 0.1094                 | 0.0219                   | 0.0219                | 40      | 4.776       |
| 52      | 0.700                | 62.50           | 0.0625                 | 0.0438                   | 0.0438                | 11      | 1.430       |
| 53      | 0.650                | 250.00          | 0.2500                 | 0.1625                   | 0.1625                | 20      | 2.818       |
| 54      | 0.400                | 250.00          | 0.2500                 | 0.1000                   | 0.1000                | 27      | 3.461       |
| 55      | 0.200                | 93.75           | 0.0938                 | 0.0188                   | 0.0891                | 35      | 3.667       |
|         | 0.450                | 156.25          | 0.1563                 | 0.0703                   |                       |         |             |
| 56      | 0.175                | 78.13           | 0.0781                 | 0.0137                   | 0.0953                | 29      | 2.420       |
|         | 0.475                | 171.88          | 0.1719                 | 0.0816                   |                       |         |             |

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

| Grid No | Slope length<br>(km) | Area<br>(sq.km) | Area ratio<br>(= 0.25) | Weighted<br>slope length | Total<br>weight slope | % slope | LS - factor |
|---------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 57      | 0.200                | 168.75          | 0.1688                 | 0.0338                   | 0.0663                | 41      | 4.948       |
|         | 0.400                | 81.25           | 0.0813                 | 0.0325                   |                       |         |             |
| 58      | 0.500                | 250.00          | 0.2500                 | 0.1250                   | 0.1250                | 48      | 11.426      |
| 59      | 0.300                | 125.00          | 0.1250                 | 0.0375                   | 0.1094                | 46      | 7.891       |
|         | 0.575                | 125.00          | 0.1250                 | 0.0719                   |                       |         |             |
| 60      | 0.200                | 62.50           | 0.0625                 | 0.0125                   | 0.0125                | 40      | 4.776       |
| 61      | 0.575                | 210.94          | 0.2109                 | 0.1213                   | 0.1213                | 13      | 1.208       |
| 62      | 0.725                | 250.00          | 0.2500                 | 0.1813                   | 0.1813                | 6       | 0.580       |
| 63      | 0.450                | 250.00          | 0.2500                 | 0.1125                   | 0.1125                | 7       | 0.518       |
| 64      | 0.500                | 250.00          | 0.2500                 | 0.1250                   | 0.1250                | 6       | 0.482       |
| 65      | 0.900                | 250.00          | 0.2500                 | 0.2250                   | 0.2250                | 6       | 0.646       |
| 66      | 0.175                | 62.50           | 0.0625                 | 0.0109                   | 0.0353                | 35      | 3.452       |
|         | 0.260                | 93.75           | 0.0938                 | 0.0244                   |                       |         |             |
| 67      | 0.075                | 15.63           | 0.0156                 | 0.0012                   | 0.0012                | 60      | 5.655       |
| 68      | 0.550                | 250.00          | 0.2500                 | 0.1375                   | 0.1375                | 6       | 0.452       |
| 69      | 0.400                | 250.00          | 0.2500                 | 0.1000                   | 0.1000                | 5       | 0.343       |
| 70      | 0.600                | 250.00          | 0.2500                 | 0.1500                   | 0.1500                | 4       | 0.324       |
| 71      | 0.650                | 250.00          | 0.2500                 | 0.1625                   | 0.1625                | 7       | 0.623       |
| 72      | 0.650                | 125.00          | 0.1250                 | 0.0813                   | 0.0813                | 7       | 0.623       |
| 73      | 0.700                | 250.00          | 0.2500                 | 0.1750                   | 0.1750                | 3       | 0.259       |
| 74      | 0.600                | 187.50          | 0.1875                 | 0.1125                   | 0.1125                | 5       | 0.420       |
| 75      | 0.150                | 78.00           | 0.0780                 | 0.0117                   | 0.0117                | 7       | 0.299       |
| 76      | 0.625                | 218.75          | 0.2188                 | 0.1367                   | 0.1367                | 5       | 0.428       |
| 77      | 1.350                | 187.50          | 0.1875                 | 0.2531                   | 0.2531                | 5       | 0.629       |
| 78      | 0.150                | 125.00          | 0.1250                 | 0.0188                   | 0.0188                | 5       | 0.210       |
| 79      | 0.175                | 31.25           | 0.0313                 | 0.0055                   | 0.0055                | 5       | 0.227       |
| 80      | 0.600                | 187.50          | 0.1875                 | 0.1125                   | 0.1125                | 5       | 0.420       |
| 81      | 0.075                | 15.63           | 0.0156                 | 0.0012                   | 0.0012                | 5       | 0.148       |



ตารางผนวกที่ 5 การประเมินปัจจัยด้านพืชพรรณปกคลุมดิน (C - factor)

| Grid No | Landuse<br>type | Area ratio | Existing<br>C - factor | Weighted<br>C - factor | Total weight of<br>C - factor |
|---------|-----------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1       | DD              | 0.0625     | 0.4972                 | 0.03108                | 0.03108                       |
| 2       | DD              | 0.1875     | 0.4972                 | 0.09323                | 0.09323                       |
| 3       | DD              | 0.0781     | 0.4972                 | 0.03885                | 0.03885                       |
| 4       | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 5       | DD              | 0.1094     | 0.4972                 | 0.05439                | 0.05439                       |
| 6       | DD              | 0.0078     | 0.4972                 | 0.00388                | 0.00388                       |
| 7       | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 8       | DD              | 0.1437     | 0.4972                 | 0.07145                | 0.07145                       |
| 9       | DD              | 0.0390     | 0.4972                 | 0.01939                | 0.01939                       |
| 10      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 11      | DD              | 0.0600     | 0.4972                 | 0.02983                | 0.02983                       |
| 12      | DD              | 0.1875     | 0.4972                 | 0.09323                | 0.10156                       |
|         | MD              | 0.0625     | 0.1334                 | 0.00834                |                               |
| 13      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 14      | DD              | 0.2343     | 0.4972                 | 0.11649                | 0.11649                       |
| 15      | DD              | 0.0438     | 0.4972                 | 0.02175                | 0.04927                       |
|         | MD              | 0.2063     | 0.1334                 | 0.02751                |                               |
| 16      | DD              | 0.2188     | 0.4972                 | 0.10876                | 0.11293                       |
|         | MD              | 0.0313     | 0.1334                 | 0.00417                |                               |
| 17      | DD              | 0.1250     | 0.4972                 | 0.06215                | 0.06215                       |
| 18      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 19      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 20      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

| Grid No | Landuse<br>type | Area ratio | Existing<br>C - factor | Weighted<br>G - factor | Total weight of<br>C - factor |
|---------|-----------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 21      | DD              | 0.1563     | 0.4972                 | 0.07769                | 0.07769                       |
| 22      | DD              | 0.1250     | 0.4972                 | 0.06215                | 0.06215                       |
| 23      | DD              | 0.0313     | 0.4972                 | 0.01554                | 0.04472                       |
|         | MD              | 0.2188     | 0.1334                 | 0.02918                |                               |
| 24      | DD              | 0.0313     | 0.4972                 | 0.01554                | 0.04472                       |
|         | MD              | 0.2188     | 0.1334                 | 0.02918                |                               |
| 25      | DD              | 0.1200     | 0.4972                 | 0.05966                | 0.07701                       |
|         | MD              | 0.1300     | 0.1334                 | 0.01734                |                               |
| 26      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 27      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 28      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 29      | DD              | 0.0156     | 0.4972                 | 0.00777                | 0.00777                       |
| 30      | DD              | 0.1562     | 0.4972                 | 0.07766                | 0.07766                       |
| 31      | DD              | 0.1875     | 0.4972                 | 0.09323                | 0.10156                       |
|         | MD              | 0.0625     | 0.1334                 | 0.00834                |                               |
| 32      | MD              | 0.2500     | 0.1334                 | 0.03335                | 0.03335                       |
| 33      | DD              | 0.0313     | 0.4972                 | 0.01554                | 0.04472                       |
|         | MD              | 0.2188     | 0.1334                 | 0.02918                |                               |
| 34      | DD              | 0.1875     | 0.4972                 | 0.09323                | 0.10156                       |
|         | MD              | 0.0625     | 0.1334                 | 0.00834                |                               |
| 35      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 36      | DD              | 0.1250     | 0.4972                 | 0.06215                | 0.06215                       |
| 37      | DD              | 0.0156     | 0.4972                 | 0.00777                | 0.00777                       |



ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

| Grid No | Landuse<br>type | Area ratio | Existing<br>C - factor | Weighted<br>C - factor | Total weight of<br>C - factor |
|---------|-----------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 38      | DD              | 0.0625     | 0.4972                 | 0.03108                | 0.05609                       |
|         | MD              | 0.1875     | 0.1334                 | 0.02501                |                               |
| 39      | MD              | 0.2500     | 0.1334                 | 0.03335                | 0.03335                       |
| 40      | DD              | 0.1750     | 0.4972                 | 0.08701                | 0.09702                       |
|         | MD              | 0.0750     | 0.1334                 | 0.01001                |                               |
| 41      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 42      | DD              | 0.2343     | 0.4972                 | 0.11649                | 0.11649                       |
| 43      | DD              | 0.0625     | 0.4972                 | 0.03108                | 0.03108                       |
| 44      | MD              | 0.0156     | 0.1334                 | 0.00208                | 0.00208                       |
| 45      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 46      | DD              | 0.0813     | 0.4972                 | 0.04040                | 0.04040                       |
| 47      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 48      | DD              | 0.1250     | 0.4972                 | 0.06215                | 0.07049                       |
|         | MD              | 0.0625     | 0.1334                 | 0.00834                |                               |
| 49      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 50      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 51      | DD              | 0.1094     | 0.4972                 | 0.05439                | 0.05439                       |
| 52      | MD              | 0.0625     | 0.1334                 | 0.00834                | 0.00834                       |
| 53      | MD              | 0.2500     | 0.1334                 | 0.03335                | 0.03335                       |
| 54      | DD              | 0.1250     | 0.4972                 | 0.06215                | 0.07883                       |
|         | MD              | 0.1250     | 0.1334                 | 0.01668                |                               |
| 55      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 56      | DD              | 0.0625     | 0.4972                 | 0.03108                | 0.03108                       |

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

| Grid No | Landuse<br>type | Area ratio | Existing<br>C - factor | Weighted<br>C - factor | Total weight of<br>C - factor |
|---------|-----------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 57      | DD              | 0.2188     | 0.4972                 | 0.10876                | 0.10876                       |
| 58      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 59      | DD              | 0.2500     | 0.4972                 | 0.12430                | 0.12430                       |
| 60      | DD              | 0.0625     | 0.4972                 | 0.03108                | 0.03108                       |
| 61      | MD              | 0.0625     | 0.1334                 | 0.00834                | 0.02474                       |
|         | OR              | 0.0742     | 0.2210                 | 0.01640                |                               |
| 62      | MD              | 0.0156     | 0.1334                 | 0.00208                | 0.04352                       |
|         | OR              | 0.1875     | 0.2210                 | 0.04144                |                               |
| 63      | MD              | 0.1563     | 0.1334                 | 0.02084                | 0.04156                       |
|         | OR              | 0.0938     | 0.2210                 | 0.02072                |                               |
| 64      | DD              | 0.0938     | 0.4972                 | 0.04661                | 0.06746                       |
|         | MD              | 0.1563     | 0.1334                 | 0.02084                |                               |
| 65      | DD              | 0.0781     | 0.4972                 | 0.03884                | 0.05611                       |
|         | OR              | 0.0781     | 0.2210                 | 0.01727                |                               |
| 66      | DD              | 0.1563     | 0.4972                 | 0.07769                | 0.07769                       |
| 67      | DD              | 0.0156     | 0.4972                 | 0.00777                | 0.00777                       |
| 68      | OR              | 0.1563     | 0.2210                 | 0.03453                | 0.03453                       |
| 69      | MD              | 0.1563     | 0.1334                 | 0.02084                | 0.04156                       |
|         | OR              | 0.0938     | 0.2210                 | 0.02072                |                               |
| 70      | MD              | 0.2188     | 0.1334                 | 0.02918                | 0.03609                       |
|         | OR              | 0.0313     | 0.2210                 | 0.00691                |                               |
| 71      | MD              | 0.1250     | 0.1334                 | 0.01668                | 0.04430                       |
|         | OR              | 0.1250     | 0.2210                 | 0.02763                |                               |



ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

| Grid No | Landuse type | Area ratio | Existing C - factor | Weighted C - factor | Total weight of C - factor |
|---------|--------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 72      | MD           | 0.1250     | 0.1334              | 0.01668             | 0.01668                    |
| 73      | MD           | 0.0469     | 0.1334              | 0.00625             | 0.03388                    |
|         | OR           | 0.1250     | 0.2210              | 0.02763             |                            |
| 74      | MD           | 0.1563     | 0.1334              | 0.02084             | 0.02775                    |
|         | OR           | 0.0313     | 0.2210              | 0.00691             |                            |
| 75      | MD           | 0.0390     | 0.1334              | 0.00520             | 0.01382                    |
|         | OR           | 0.0390     | 0.2210              | 0.00862             |                            |
| 76      | OR           | 0.0625     | 0.2210              | 0.01381             | 0.01381                    |
| 77      | OR           | 0.1250     | 0.2210              | 0.02763             | 0.02763                    |
| 78      | MD           | 0.0234     | 0.1334              | 0.00313             | 0.01694                    |
|         | OR           | 0.0625     | 0.2210              | 0.01381             |                            |
| 79      | MD           | 0.0313     | 0.1334              | 0.00417             | 0.00417                    |
| 80      | OR           | 0.0156     | 0.2210              | 0.00345             | 0.00345                    |
| 81      | OR           | 0.0156     | 0.2210              | 0.00345             | 0.00345                    |

หมายเหตุ : DD = ป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest)

MD = ป่าเบญจพรรณ (Mixed dipterocarp forest)

OR = สวนไม้ผล (Orchard)

ตารางผนวกที่ 6 ผลการประเมินการชะล้างพังทลายและการสูญเสียดิน (erosion) แบบกริดของพื้นที่

ลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ

| Grid No | Area<br>(sq.km) | R - factor | K - factor | LS - factor | C - factor | P - factor | On - site erosion |              | Total erosion<br>(ton/yr) |
|---------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|--------------|---------------------------|
|         |                 |            |            |             |            |            | (ton/ha/yr)       | (ton/rai/yr) |                           |
| 1       | 0.0625          | 829.21     | 0.00017    | 6.0919      | 0.03108    | 1          | 0.02649           | 0.00424      | 0.16556                   |
| 2       | 0.1875          | 829.21     | 0.00051    | 17.2217     | 0.09323    | 1          | 0.67397           | 0.10783      | 12.63687                  |
| 3       | 0.0781          | 829.21     | 0.00021    | 5.0047      | 0.03885    | 1          | 0.03401           | 0.00544      | 0.26570                   |
| 4       | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 4.8501      | 0.12430    | 1          | 0.33744           | 0.05399      | 8.43593                   |
| 5       | 0.1094          | 829.21     | 0.00030    | 26.4530     | 0.05439    | 1          | 0.35243           | 0.05639      | 3.85554                   |
| 6       | 0.0078          | 829.21     | 0.00002    | 1.5065      | 0.00388    | 1          | 0.00010           | 0.00002      | 0.00008                   |
| 7       | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 17.8737     | 0.12430    | 1          | 1.24352           | 0.19896      | 31.08812                  |
| 8       | 0.1437          | 829.21     | 0.00039    | 4.9332      | 0.07145    | 1          | 0.11340           | 0.01814      | 1.62952                   |
| 9       | 0.0390          | 829.21     | 0.00011    | 4.1996      | 0.01939    | 1          | 0.00711           | 0.00114      | 0.02773                   |
| 10      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 1.5123      | 0.12430    | 1          | 0.10522           | 0.01683      | 2.63040                   |
| 11      | 0.0600          | 829.21     | 0.00016    | 4.1898      | 0.02983    | 1          | 0.01679           | 0.00269      | 0.10074                   |
| 12      | 0.2500          | 829.21     | 0.00177    | 5.8876      | 0.10156    | 1          | 0.87700           | 0.14032      | 21.92501                  |
| 13      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 10.3017     | 0.12430    | 1          | 0.71672           | 0.11467      | 17.91793                  |
| 14      | 0.2343          | 829.21     | 0.00063    | 10.9732     | 0.11649    | 1          | 0.67056           | 0.10729      | 15.71118                  |
| 15      | 0.2500          | 829.21     | 0.00428    | 1.0229      | 0.04927    | 1          | 0.17904           | 0.02865      | 4.47594                   |
| 16      | 0.2500          | 829.21     | 0.00122    | 11.6376     | 0.11293    | 1          | 1.33158           | 0.21305      | 33.28955                  |
| 17      | 0.1250          | 829.21     | 0.00034    | 12.3309     | 0.06215    | 1          | 0.21447           | 0.03432      | 2.68091                   |
| 18      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 6.1089      | 0.12430    | 1          | 0.42501           | 0.06800      | 10.62531                  |
| 19      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 3.3379      | 0.12430    | 1          | 0.23222           | 0.03716      | 5.80559                   |
| 20      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 4.0068      | 0.12430    | 1          | 0.27877           | 0.04460      | 6.96916                   |
| 21      | 0.1563          | 829.21     | 0.00042    | 6.9646      | 0.07769    | 1          | 0.18928           | 0.03028      | 2.95745                   |
| 22      | 0.1250          | 829.21     | 0.00034    | 6.3916      | 0.06215    | 1          | 0.11117           | 0.01779      | 1.38963                   |
| 23      | 0.2500          | 829.21     | 0.00450    | 2.7369      | 0.04472    | 1          | 0.45702           | 0.07312      | 11.42548                  |
| 24      | 0.2500          | 829.21     | 0.00450    | 3.4989      | 0.04472    | 1          | 0.58424           | 0.09348      | 14.60608                  |
| 25      | 0.2500          | 829.21     | 0.00295    | 7.1897      | 0.07701    | 1          | 1.35431           | 0.21669      | 33.85777                  |
| 26      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 4.1649      | 0.12430    | 1          | 0.28976           | 0.04636      | 7.24402                   |
| 27      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 3.9023      | 0.12430    | 1          | 0.27149           | 0.04344      | 6.78728                   |

## ตารางผนวกที่ 6 (ต่อ)

| Grid No | Area<br>(sq.km) | R - factor | K - factor | LS - factor | C - factor | P - factor | On - site erosion |              | Total erosion<br>(ton/yr) |
|---------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|--------------|---------------------------|
|         |                 |            |            |             |            |            | (ton/ha/yr)       | (ton/rai/yr) |                           |
| 28      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 1.0157      | 0.12430    | 1          | 0.07067           | 0.01131      | 1.76663                   |
| 29      | 0.0156          | 829.21     | 0.00004    | 2.0790      | 0.00777    | 1          | 0.00057           | 0.00009      | 0.00088                   |
| 30      | 0.1562          | 829.21     | 0.00042    | 12.3509     | 0.07766    | 1          | 0.33544           | 0.05367      | 5.23965                   |
| 31      | 0.2500          | 829.21     | 0.00177    | 1.3224      | 0.10156    | 1          | 0.19698           | 0.03152      | 4.92459                   |
| 32      | 0.2500          | 829.21     | 0.00505    | 0.6585      | 0.03335    | 1          | 0.09196           | 0.01471      | 2.29911                   |
| 33      | 0.2500          | 829.21     | 0.00450    | 15.7527     | 0.04472    | 1          | 2.63040           | 0.42086      | 65.76008                  |
| 34      | 0.2500          | 829.21     | 0.00177    | 8.1077      | 0.10156    | 1          | 1.20771           | 0.19323      | 30.19267                  |
| 35      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 13.5195     | 0.12430    | 1          | 0.94059           | 0.15049      | 23.51479                  |
| 36      | 0.1250          | 829.21     | 0.00034    | 9.6878      | 0.06215    | 1          | 0.16850           | 0.02696      | 2.10628                   |
| 37      | 0.0156          | 829.21     | 0.00004    | 4.4761      | 0.00777    | 1          | 0.00122           | 0.00019      | 0.00190                   |
| 38      | 0.2500          | 829.21     | 0.00396    | 7.4193      | 0.05609    | 1          | 1.36514           | 0.21842      | 34.12849                  |
| 39      | 0.2500          | 829.21     | 0.00505    | 1.2546      | 0.03335    | 1          | 0.17520           | 0.02803      | 4.38007                   |
| 40      | 0.2500          | 829.21     | 0.00199    | 4.3458      | 0.09702    | 1          | 0.69484           | 0.11117      | 17.37094                  |
| 41      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 1.3891      | 0.12430    | 1          | 0.09664           | 0.01546      | 2.41601                   |
| 42      | 0.2343          | 829.21     | 0.00063    | 10.8975     | 0.11649    | 1          | 0.66593           | 0.10655      | 15.60276                  |
| 43      | 0.0625          | 829.21     | 0.00017    | 4.9976      | 0.03108    | 1          | 0.02173           | 0.00348      | 0.13582                   |
| 44      | 0.0156          | 829.21     | 0.00032    | 0.9088      | 0.00208    | 1          | 0.00050           | 0.00008      | 0.00077                   |
| 45      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 3.1471      | 0.12430    | 1          | 0.21895           | 0.03503      | 5.47374                   |
| 46      | 0.0813          | 829.21     | 0.00022    | 5.4408      | 0.04040    | 1          | 0.03998           | 0.00640      | 0.32486                   |
| 47      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 4.3207      | 0.12430    | 1          | 0.30060           | 0.04810      | 7.51504                   |
| 48      | 0.1875          | 829.21     | 0.00160    | 1.1668      | 0.07049    | 1          | 0.10911           | 0.01746      | 2.04587                   |
| 49      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 3.6571      | 0.12430    | 1          | 0.25443           | 0.04071      | 6.36082                   |
| 50      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 4.1899      | 0.12430    | 1          | 0.29150           | 0.04664      | 7.28750                   |
| 51      | 0.1094          | 829.21     | 0.00030    | 4.7764      | 0.05439    | 1          | 0.06363           | 0.01018      | 0.69616                   |
| 52      | 0.0625          | 829.21     | 0.00126    | 1.4295      | 0.00834    | 1          | 0.01248           | 0.00200      | 0.07798                   |
| 53      | 0.2500          | 829.21     | 0.00505    | 2.8181      | 0.03335    | 1          | 0.39355           | 0.06297      | 9.83887                   |
| 54      | 0.2500          | 829.21     | 0.00286    | 3.4611      | 0.07883    | 1          | 0.64757           | 0.10361      | 16.18920                  |



## ตารางผนวกที่ 6 (ต่อ)

| Grid No | Area<br>(sq.km) | R - factor | K - factor | LS - factor | C - factor | P - factor | On - site erosion |              | Total erosion<br>(ton/yr) |
|---------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|--------------|---------------------------|
|         |                 |            |            |             |            |            | (ton/ha/yr)       | (ton/rai/yr) |                           |
| 55      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 3.6673      | 0.12430    | 1          | 0.25515           | 0.04082      | 6.37867                   |
| 56      | 0.0625          | 829.21     | 0.00017    | 2.4204      | 0.03108    | 1          | 0.01052           | 0.00168      | 0.06578                   |
| 57      | 0.2188          | 829.21     | 0.00059    | 4.9483      | 0.10876    | 1          | 0.26358           | 0.04217      | 5.76581                   |
| 58      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 11.4262     | 0.12430    | 1          | 0.79495           | 0.12719      | 19.87371                  |
| 59      | 0.2500          | 829.21     | 0.00068    | 7.8909      | 0.12430    | 1          | 0.54899           | 0.08784      | 13.72485                  |
| 60      | 0.0625          | 829.21     | 0.00017    | 4.7764      | 0.03108    | 1          | 0.02077           | 0.00332      | 0.12981                   |
| 61      | 0.2109          | 829.21     | 0.01940    | 1.2075      | 0.04552    | 1          | 0.88436           | 0.14150      | 18.65114                  |
| 62      | 0.2500          | 829.21     | 0.01239    | 0.5799      | 0.05665    | 1          | 0.33754           | 0.05401      | 8.43840                   |
| 63      | 0.2500          | 829.21     | 0.00357    | 0.5180      | 0.04156    | 1          | 0.06371           | 0.01019      | 1.59273                   |
| 64      | 0.2500          | 829.21     | 0.00341    | 0.4816      | 0.06746    | 1          | 0.09185           | 0.01470      | 2.29617                   |
| 65      | 0.1562          | 829.21     | 0.00055    | 0.6462      | 0.05611    | 1          | 0.01668           | 0.00267      | 0.26048                   |
| 66      | 0.1563          | 829.21     | 0.00042    | 3.4520      | 0.07769    | 1          | 0.09382           | 0.01501      | 1.46586                   |
| 67      | 0.0156          | 829.21     | 0.00004    | 5.6550      | 0.00777    | 1          | 0.00154           | 0.00025      | 0.00240                   |
| 68      | 0.2251          | 829.21     | 0.01719    | 0.4520      | 0.05378    | 1          | 0.34646           | 0.05543      | 7.79886                   |
| 69      | 0.2500          | 829.21     | 0.00357    | 0.3426      | 0.04156    | 1          | 0.04214           | 0.00674      | 1.05353                   |
| 70      | 0.2500          | 829.21     | 0.00456    | 0.3237      | 0.03609    | 1          | 0.04413           | 0.00706      | 1.10333                   |
| 71      | 0.2500          | 829.21     | 0.00308    | 0.6225      | 0.04430    | 1          | 0.07032           | 0.01125      | 1.75802                   |
| 72      | 0.1250          | 829.21     | 0.00253    | 0.6225      | 0.01668    | 1          | 0.02174           | 0.00348      | 0.27169                   |
| 73      | 0.2344          | 829.21     | 0.01650    | 0.2590      | 0.05138    | 1          | 0.18202           | 0.02912      | 4.26646                   |
| 74      | 0.1876          | 829.21     | 0.00329    | 0.4196      | 0.02775    | 1          | 0.03180           | 0.00509      | 0.59665                   |
| 75      | 0.0780          | 829.21     | 0.00096    | 0.2991      | 0.01382    | 1          | 0.00329           | 0.00053      | 0.02565                   |
| 76      | 0.2188          | 829.21     | 0.03778    | 0.4283      | 0.05756    | 1          | 0.77223           | 0.12356      | 16.89630                  |
| 77      | 0.1875          | 829.21     | 0.01555    | 0.6295      | 0.04513    | 1          | 0.36625           | 0.05860      | 6.86714                   |
| 78      | 0.1250          | 829.21     | 0.01012    | 0.2098      | 0.02788    | 1          | 0.04910           | 0.00786      | 0.61370                   |

ตารางผนวกที่ 6 (ต่อ)

| Grid No                                                        | Area<br>(sq.km) | R - factor | K - factor | LS - factor | C - factor | P - factor | On - site erosion |              | Total erosion<br>(ton/yr) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------------|--------------|---------------------------|
|                                                                |                 |            |            |             |            |            | (ton/ha/yr)       | (ton/rai/yr) |                           |
| 79                                                             | 0.0313          | 829.21     | 0.00063    | 0.2266      | 0.00417    | 1          | 0.00049           | 0.00008      | 0.00155                   |
| 80                                                             | 0.0906          | 829.21     | 0.01807    | 0.4196      | 0.02445    | 1          | 0.15374           | 0.02460      | 1.39292                   |
| 81                                                             | 0.0156          | 829.21     | 0.00007    | 0.1484      | 0.00345    | 1          | 0.00003           | 0.00000      | 0.00005                   |
| ปริมาณการสูญเสียดินในพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมด (ตันต่อปี)          |                 |            |            |             |            |            |                   |              | 645.44762                 |
| ปริมาณการสูญเสียดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ คิดเป็น ต้นต่อไร่ต่อปี     |                 |            |            |             |            |            |                   |              | 4.40898                   |
| ปริมาณการสูญเสียดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ คิดเป็น ต้นต่อเฮกแตร์ต่อปี |                 |            |            |             |            |            |                   |              | 27.55613                  |

ตารางผนวกที่ 7 การสูญเสียหน้าดินและปริมาณธาตุอาหารจากการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ำเชิงเขาห้วยโจ

| พื้นที่                             | เนื้อที่<br>(ตารางกิโลเมตร) | ปริมาณตะกอน<br>(ตันต่อปี) | ปริมาณธาตุอาหารจากการชะล้าง (กิโลกรัมต่อปี) |         |        |         |         |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
|                                     |                             |                           | N                                           | P       | K      | Ca      | Mg      |
| 1. ป่าเบญจพรรณ                      | 3.8018                      | 85.61106                  | 175.65                                      | 6.1632  | 22.085 | 228.98  | 16.264  |
| 2. ป่าเต็งรัง                       | 9.0922                      | 294.9216                  | 115.6                                       | 7.373   | 12.387 | 175.477 | 7.963   |
| 3. สวนไม้ผล                         | 1.3163                      | 0.82306                   | 1.067                                       | 0.2354  | 0.393  | 0.156   | 0.0625  |
| รวม                                 | 14.2103                     | 381.35572                 | 292.317                                     | 13.7716 | 34.865 | 404.613 | 24.2895 |
| คิดเป็นมูลค่าตามราคาปุ๋ย (บาทต่อปี) |                             |                           | 5330                                        | 1560    | 840    | 22680   | 1360    |
| คิดเป็นมูลค่าความสูญเสีย (บาทต่อปี) |                             |                           |                                             |         |        |         | 31770   |