



รายงานผลการวิจัย

เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกนิกอุบลร่วมกับปลานิลในบ่อพลาสติกแบบเครื่องดูแลเพียง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

A mixed Culture of Hybrid Walking Catfish (*Clarias macrocephalus x C. gariepinus*) / Nile Tilapia in Plastic Pond of Applying The Sufficiency Economy for Sustainable Development

โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ : การผลิตสัตว์น้ำเครื่องดูแลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม¹
ความปลอดภัยด้านอาหาร

ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจำปี 2555
จำนวน 200,000 บาท

หัวหน้าโครงการ นายชรนารถ ศรีนวนาน
ผู้ร่วมโครงการ นายนัญญา มนเทียรอาสา

งานวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์

31 มีนาคม 2556

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยเรื่อง “การเดี่ยวปลาคุกบีกอุบร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ได้สำเร็จอุ่ล่วงเป็นอย่างดี คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณสำนักวิจัย และส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยแห่งชาติ ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555 ในภาระดำเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ คุณกฤษณะ ม่วงทอง คุณภาลัย ม่วงทอง และคุณเทพพิทักษ์ บุญทา ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการทำวิจัยและร่วมมือร่วมใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่ งานงานวิจัยนี้ สำเร็จอุ่ล่วง ได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณาจารย์ในโลหิตการประเมินและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ที่อนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยให้เสริมสืบสานบูรณา

คณะผู้วิจัย

สารบัญ

สารบัญตาราง	๗
สารบัญภาพ	๙
บทคัดย่อ	๑
Abstract	๒
คำนำ	๔
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	๖
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๖
การตรวจสอบสาร	๘
อุปกรณ์และวิธีการ	๑๗
ผลการวิจัย	๓๓
วิเคราะห์ผลการวิจัย	๗๖
สรุปผลการวิจัย	๘๐
เอกสารอ้างอิง	๘๑

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ข้อเด็กต่างระหว่างปลาคุกอุบ ปลาคุกด้าน และปลาคุกขักษ์	10
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการเดิน โดยของปลาคุกบึกอุบแต่ละทรีเมนต์ในการทดลองชั้นที่ 1	35
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการเดิน โดยของปลาคุกบึกอุบในแต่ละทรีเมนต์ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	37
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการเดิน โดยของปลา尼ลแต่ละทรีเมนต์ในการทดลองชั้นที่ 1	38
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการเดิน โดยของปลา尼ลในแต่ละทรีเมนต์ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	40
ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพการเดิน โดยของปลาคุกบึกอุบแต่ละทรีเมนต์ในการทดลองชั้นที่ 2	41
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการเดิน โดยของปลาคุกบึกอุบในแต่ละทรีเมนต์ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)	43
ตารางที่ 8 ประสิทธิภาพการเดิน โดยของปลา尼ลแต่ละทรีเมนต์ในการทดลองชั้นที่ 2	44
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการเดิน โดยของปลา尼ลในแต่ละทรีเมนต์ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)	45
ตารางที่ 10 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเดิน โดยของปลาคุกบึกอุบ กับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	46
ตารางที่ 11 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเดิน โดยของปลาคุกบึกอุบ กับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)	47
ตารางที่ 12 คุณภาพน้ำทางกายภาพในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบึกอุบร่วมกับปลานิล แต่ละทรีเมนต์ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	48
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำทางกายภาพในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบึกอุบ ร่วมกับปลานิลแต่ละทรีเมนต์ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	49
ตารางที่ 14 คุณภาพน้ำทางเคมีในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบึกอุบร่วมกับปลานิล แต่ละทรีเมนต์ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	50
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำทางเคมีในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบึกอุบร่วมกับปลานิล แต่ละทรีเมนต์ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	52
ตารางที่ 16 คุณภาพน้ำทางกายภาพในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบึกอุบร่วมกับปลานิล แต่ละทรีเมนต์ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)	54

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำทางกายภาพในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกนึ่กอุบร่วมกับปานิลแต่ละทรีเมนต์ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)	55
ตารางที่ 18 คุณภาพน้ำทางเคมีในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกนึ่กอุบร่วมกับปานิลแต่ละทรีเมนต์ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)	56
ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำทางเคมีในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกนึ่กอุบร่วมกับปานิลแต่ละทรีเมนต์ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)	58
ตารางที่ 20 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	61
ตารางที่ 21 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกนึ่กอุบ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	62
ตารางที่ 22 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับประสิทธิภาพการเติบโตของปานิล (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	63
ตารางที่ 23 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)	66
ตารางที่ 24 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกนึ่กอุบ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)	67
ตารางที่ 25 จำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกแต่ละทรีเมนต์ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	69
ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ยจำนวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกแต่ละทรีเมนต์ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	70
ตารางที่ 27 จำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกแต่ละทรีเมนต์ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)	71
ตารางที่ 28 ค่าเฉลี่ยจำนวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกแต่ละทรีเมนต์ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)	72
ตารางที่ 29 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชกับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	73
ตารางที่ 30 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชกับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)	74

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 ปลาดุกนิกอุย (<i>Clarias macrocephalus × C. gariepinus</i>)	9
ภาพที่ 2 ปลานิล (<i>Oreochromis niloticus</i>)	11
ภาพที่ 3 ตักษณะตั้งเพศของปลานิลเพศผู้ (ด้านขวา) และปลานิลเพศเมีย (ด้านซ้าย)	12
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการบุคบ่อทคลองพร้อมปูพลาสติกสีดำที่พื้นบ่อในการทดลองที่ 1	19
ภาพที่ 5 การเติมน้ำจากคลองชลประทานผ่านผ้ากรองลงบ่อทคลองแต่ละบ่อ ในการทดลองที่ 1	20
ภาพที่ 6 การสุ่มนับจำนวนและปล่อยถูกปลาทดลองลงในแต่ละบ่อทคลอง ในการทดลองที่ 1	21
ภาพที่ 7 การตรวจวัดประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกนิกอุยและปลานิล ในการทดลองที่ 1	23
ภาพที่ 8 การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้ำในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ ในการทดลองที่ 1	24
ภาพที่ 9 ขั้นตอนการเตรียมบ่อ/ปรับปรุงช่องแซนบ่อทคลองเพื่อใช้ในการทดลองที่ 2	25
ภาพที่ 10 การเติมน้ำจากคลองชลประทานผ่านผ้ากรองลงบ่อทคลองแต่ละบ่อ ในการทดลองที่ 2	27
ภาพที่ 11 การสุ่มนับจำนวนและปล่อยถูกปลาทดลองลงในแต่ละบ่อทคลอง ในการทดลองที่ 2	27
ภาพที่ 12 การตรวจวัดประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกนิกอุยและปลานิล ในการทดลองที่ 2	30
ภาพที่ 13 การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้ำในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ ในการทดลองที่ 2	31
ภาพที่ 14 การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชในบ่อทคลองในการทดลองที่ 2	31
ภาพที่ 15 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกนิกอุยในแต่ละทรีตเมนต์ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	36
ภาพที่ 16 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการเติบโตของปลานิลในแต่ละทรีตเมนต์ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)	39
ภาพที่ 17 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกนิกอุยในแต่ละทรีตเมนต์ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)	42

สารบัญภาค (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 18 องค์ประกอบชนิคของแพลงก์ตอนพืชคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละดิวิชันในปี พลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกับปลานิล (เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2555)	68
ภาพที่ 19 Mr.Jonard Cabading จาก Collage of fisheries, Central Luzon State University ประเทศไทยปีนี้	75

การเลี้ยงปลาดุกน้ำก้ออยร่วมกับปลานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

A mixed culture of Hybrid Walking Catfish (*Clarias macrocephalus x C. gariepinus*) /
Nile Tilapia in plastic pond of applying the sufficiency economy for sustainable
development

ชจารเกียรติ ศรีนวاذสน¹ และ บัญญัติ มนเทียรอาษา¹
Khajornkiat Srinuansom¹ and Bunyat Montien-Art¹

¹คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ

การวิจัยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 (ปีที่ 1) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาดุกน้ำก้ออยและปลานิลในระบบการเลี้ยงปลาดุกน้ำก้ออยร่วมกับปลานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำสูตรปลาดุกน้ำก้ออยที่มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 3 - 4 กรัม มาเลี้ยงในบ่อพลาสติกขนาด $2 \times 3 \times 0.8$ เมตร จำนวน 12 บ่อ (4 ทรีเมนต์ฯ ละ 3 ชั้น) คือ ทรีเมนต์ที่ 1, 2, 3 และ 4 เลี้ยงปลาดุกน้ำก้ออยที่ระดับความหนาแน่น 30, 25, 20 และ 15 ตัว/ตารางเมตร ตามลำดับ และในทรีเมนต์ที่ 2, 3 และ 4 ทำการปล่อยสูตรปลา尼ลแปลงเพศ ที่มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 30 กรัม เลี้ยงร่วมกับปลาดุกน้ำก้ออย ที่ระดับความหนาแน่น 3, 4 และ 5 ตัว/ตารางเมตร ตามลำดับ ทำการเลี้ยงปลาเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยสุ่มตรวจวัดประสิทธิภาพ การเติบโตของปลาดุกน้ำก้ออยและปลานิล ทุก 1 เดือน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชทุก 2 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าการเลี้ยงปลาดุกน้ำก้ออยร่วมกับเลี้ยงปลานิลที่ระดับความหนาแน่น 15:5 ตัว/ตารางเมตร (หรืออัตราส่วน 3:1) มีความเหมาะสมที่สุด ในการเลี้ยงปลาดุกน้ำก้ออยร่วมกับปลานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยปลาดุกน้ำก้ออย มีประสิทธิภาพการเติบโตเพิ่มขึ้นและปัจจัยคุณภาพน้ำที่สะท้อนถึงปริมาณธาตุอาหารมีปริมาณลดลง เมื่ออัตราการปล่อยปลาดุกน้ำก้ออยน้อยลงและอัตราการปล่อยปลานิลมากขึ้น

หลังจากนั้นทำการทดลองที่ 2 (ปีที่ 2) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลดอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป โดยปล่อยสูตรปลาดุกน้ำก้ออยที่มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 9 – 10 กรัม ที่ระดับความหนาแน่น 15 ตัว/ตารางเมตร เลี้ยงร่วมกับสูตรปลา尼ลแปลงเพศที่มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 25 – 30 กรัม ที่ระดับความหนาแน่น 5 ตัว/ตารางเมตร ในบ่อพลาสติกขนาด $2 \times 3 \times 0.8$ เมตร

จำนวน 12 บ่อ ให้ปลาคุกนิ่กอุยกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปขนาดเม็ดอยู่ใน 30% ในอัตราส่วนที่ แಡกต่างกันไปในแต่ละทรีเม้นต์ (4 ทรีเม้นต์ ละ 3 ชั้น) คือ ทรีเม้นต์ที่ 1, 2 และ 3 มีการสร้างอาหารธรรมชาติและให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปปริมาณ 5, 4 และ 3% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน ตามลำดับ ส่วนทรีเม้นต์ที่ 4 ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ และให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปปริมาณ 4% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน ทำการเลี้ยงปลาเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยสุ่มตรวจปะรังสีทึบกากเพื่อติดตามผลของการเพาะเลี้ยง ของปลาคุกนิ่กอุยและปลานิล ทุก 1 เดือน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่าง แพลงก์ตอนพืชทุก 2 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปได้ในการลดอัตราการให้อาหารเม็ด สำเร็จรูปแก่ปลาคุกนิ่กอุยจากปริมาณ 5% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน ลดลงเหลือ 4% ของน้ำหนักตัว ปลา/วัน โดยปลาคุกนิ่กอุยบังคงมีประสิทธิภาพการเติบโตที่ค่อนข้างต่ำ ($P>0.05$) อีกทั้ง ยังมีผลต่อการลดลงของปัจจัยคุณภาพน้ำที่สะท้อนถึงปริมาณธาตุอาหารในบ่อพลาสติกให้มีค่า เหมาะสมต่อการเติบโตของปลาคุกนิ่กอุยและปลานิล

ดังนั้น โดยสรุปเมื่อพิจารณาผลการศึกษาทั้งหมดจะสามารถสรุปได้ว่า การเลี้ยงปลาคุกนิ่ก อุยร่วมกับเลี้ยงปลานิลที่ระดับความหนาแน่น 15:5 ตัว/ตารางเมตร (หรืออัตราส่วน 3:1) มีความ เหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยร่วมกับปลานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ สามารถลดอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปแก่ปลาคุกนิ่กอุย เหลือ 4% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นด้านการเลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยในบ่อพลาสติก และสามารถ นำข้อมูลที่ได้ไปส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: ปลาคุกนิ่กอุย, ปลานิล, บ่อพลาสติก

Abstract

This research was divided into 2 experiments: The objectives of the first experiments (year 1) were to investigate the appropriate stocking ratio of hybrid walking catfish (*Clarias macrocephalus* x *Clarias gariepinus*) to Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) cultured in plastic ponds and the effects of stocking ratio on the growth performance of both hybrid walking catfish and Nile tilapia, water quality and species composition of phytoplankton. Hybrid catfish fry with average initial weight of 3-4 g and Nile tilapia fry weighing an average of 30 g were used in this study. The experiment was divided into four treatments. Twelve plastic ponds were stocked with hybrid walking catfish at 30, 25, 20 and 15 fish/m² and with Nile tilapia at 0, 3, 4 and 5 fish/m²

for T1, T2, T3 and T4, respectively. This study was conducted for four months. Fish growth performance was evaluated every month, whilst the analyses of water quality factors and species composition of phytoplankton were determined every 2 weeks. Results showed that hybrid walking catfish-Nile tilapia combination at 15:5 fish/m² or 3:1 stocking ratio in plastic pond was found to be the most appropriate. Moreover, the mixed culture of hybrid walking catfish and Nile tilapia had resulted to a more improved growth performance than the control (hybrid walking catfish monoculture).

The objectives of the first experiments (year 2) were to investigate the possibility of reducing the rate of commercial feed. Hybrid catfish fry with average initial weight of 9-10 g and Nile tilapia fry weighing an average of 25 - 30 g were used in this study. Twelve plastic ponds were stocked with hybrid walking catfish-Nile tilapia combination at 15:5 fish/m². The experiment was divided into four treatments; T1 – T3 were natural food establishment + commercial feed at 5, 4 and 3% of body weight, respectively. T4 was non natural food establishment + commercial feed at 4% of body weight. This study was conducted for three months. Fish growth performance was evaluated every month, whilst the analyses of water quality factors and species composition of phytoplankton were determined every 2 weeks. Results showed that able to reduce the rate of commercial feed was 4% of body weight.

The experiment showed the technical feasibility and practicality of growing mixed culture of hybrid walking catfish and Nile tilapia in plastic ponds especially at the appropriate stocking ratio of 3:1 and able to reduce the rate of commercial feed was 4% of body weight. The information obtained from this study can be used as basis for the development of guidelines in the culture of hybrid walking catfish and Nile tilapia in plastic ponds adhering to the principles of sufficiency economy for sustainable development and creating added value and impact to food security.

Keywords: Hybrid walking catfish (*C. macrocephalus* x *C. gariepinus*), Nile Tilapia, plastic pond

คำนำ

ปลาคุกนึ่กอุยหรือปลาคุกอุยเกศ เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเริญเดิน รวดเร็ว ทนทานต่อ โรคและสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อคิน บ่อชีเมนต์หรือบ่อพลาสติก ซึ่งปลาคุกนึ่ก อุยเป็นปลาที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างแม่พันธุ์ปลาคุกอุย (*Clarias macrocephalus*) กับพ่อ พันธุ์ปลาคุกเกศ (*C. gariepinus*) โดยถูกปลามีลักษณะใกล้เคียงกับปลาคุกอุย มีอัตราการ เจริญเดินโดยสูงและมีความทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกร และ เป็นปลาที่ได้รับความนิยมในการบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเนื้อปลาคุกนึ่กอุยมีรสชาติดี และราคาถูก

ทั้งนี้ในปัจจุบันการเลี้ยงปลาคุกนิ่กอยู่ในป่าพลาสติกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเลี้ยงในรูปแบบเกษตรอินทร์หรือเกษตรพอเพียงตามแนวทางลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการเลี้ยงปลาคุกนิ่กอยู่ในลักษณะนี้มักเป็นที่นิยม เพราะใช้พื้นที่น้อย สามารถเลี้ยงได้ทุกสภาพพื้นที่ ก่อสร้างบ่อได้ง่าย ใช้เวลาในการดูแลน้อย

แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีเกษตรกรบางรายที่ทำการเลี้ยงปลาดุกน้ำกับอุบในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ประสบกับปัญหาคุณภาพน้ำในบ่อพลาสติกมีคุณภาพที่ไม่ดี ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำมีค่าต่ำกว่าข้างต่อไปโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ปริมาณสารอาหารจำพวกแอมโมเนียมในไตรเจนหรืออัตราฟอสเฟตฟอสฟอรัสมีปริมาณต่ำกว่าข้างสูง อีกทั้งปลาดุกน้ำกับอุบที่เลี้ยงด้วยระบบแบบนี้มักมีกลิ่นโคลนในเนื้อ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเกิดมาจากการหล่ายสารเคมี เช่น การเหลือของเศษอาหารที่พื้นก้นบ่อ การขับถ่ายของเสียของปลาดุกน้ำกับอุบ หรือจากผลของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอนินทรีย์เพื่อการสร้างอาหารธรรมชาติที่มากเกินไป การเกิดคราบแบคทีเรียและสาหร่ายที่ก่อให้เกิดกลิ่นโคลนในสัตว์น้ำได้ และนอกจากนี้หากสังเกตการเลี้ยงปลาดุกน้ำกับอุบในบ่อพลาสติกตามแนวหดกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พบว่าส่วนใหญ่จะเลี้ยงในลักษณะ “การเลี้ยงปลาแบบชนิดเดียว” ซึ่งทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกน้ำกับอุบในบ่อพลาสติกร่วมกับสัตว์น้ำชนิดอื่นในลักษณะ “การเลี้ยงปลาหลายชนิดหรือแบบรวม” คือ การเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมในบ่อเดียวกัน หรือชนิดเดียวแต่มีขนาดต่างกันและไม่มีอันตรายต่อกัน ข้อดีของการเลี้ยงปลาแบบรวม สามารถใช้ประโยชน์ได้จากการที่มีในบ่อปลาอย่างเดือนที่และชนิดปลาที่แตกต่างกันนั้นช่วยต่อรองกันและกัน

ดังนั้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยให้มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดการพัฒนาของระบบการเลี้ยงปลาดุกน้ำอุบในน่องพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะนำปานิล ซึ่งเป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพการณ์ เเละสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายชนิด เช่น ไข่ กระเพาะ แพลงก์ตอน สารร้าย แทน

คัวอ่อนแมลงน้ำ และสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในน้ำ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตและสิ่งเน่าเปื่อยตามกันพื้นบ่อ นาเลี้ยงร่วมกับปลาดุกบึงอุย เพื่อให้ปานิลที่เลี้ยงน้ำช่วยส่งเสริมเกื้อกูลให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศภายในบ่อพลาสติก โดยปานิลกินเศษอาหารที่เหลือพื้นกันบ่อหรืออาหารธรรมชาติที่สร้างมากกินไป ทำให้ในบ่อ มีคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาดุกบึงอุย อีกทั้งเมื่อสิ่งสุดการเลี้ยงบังได้ผลผลิตของปานิลเพิ่มอีกด้วย

ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิจัย “การเลี้ยงปลาดุกบึงอุยร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นด้านการเลี้ยง และสามารถนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงปลาดุกบึงอุยในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเริ่มต้นโครงการฯในการเดี่ยวร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อศึกษาอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาดุกบึงอุบยและปานิลในระบบการเลี้ยงปลาดุกบึงอุบยร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีบางประการ ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืช ตลอดจนความสันติธรรมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในระบบการเลี้ยงปลาดุกบึงอุบยร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยทั้งหมดไปเป็นส่วนสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเดี่ยวปลาดุกบึงอุบยในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเริ่มต้นโครงการฯและผลผลิตของปลาดุกบึงอุบยในการเดี่ยวร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. ทราบอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาดุกบึงอุบยและปานิลในระบบการเลี้ยงปลาดุกบึงอุบยร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. ทราบข้อมูลปัจจัยคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีบางประการ ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืช ตลอดจนความสันติธรรมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในระบบการเลี้ยงปลาดุกบึงอุบยร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง
4. สามารถนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเดี่ยวปลาดุกบึงอุบยในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ขอบเขต/แนวทางการดำเนินการวิจัย

ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) เพื่อศึกษาหาอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาดุกบึงอุบยและปานิลในระบบการเลี้ยงดุกบึงอุบยร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้องค์ประกอบชนิดแพลงก์ตอนในบ่อเพาะเลี้ยงเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดโทษหรือมีปริมาณแพลงก์ตอนไม่นากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ตลอดจนมีปัจจัย

คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาและผลผลิตของปลาคุกนึ่กอุยและปานิล โดยวางแผนการทดลองเดี่ยวปลาคุกนึ่กอุยและปานิลในบ่อพลาสติกในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จะเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอน และข้อมูลด้านตรวจสอบประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสม

ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของ โครงการวิจัย

กรอบแนวความคิดในการศึกษา




การตรวจสอบเอกสาร

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และพุคลังอย่างชัดเจนใน วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540) เพื่อให้พสกนิกรสามารถยืนหยัด ในการพึ่งตนเองและเลี้ยงชีพได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง อิกทั้งเพื่อเป็นแนวทางการ แก้ไขเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ค่าแรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว สถาปัตย์และ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งปัจจุบันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ถูกใช้เป็นกรอบแนวความคิด และทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหาชนของไทย ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เพื่อนudge การพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อความ อยู่ดีมีสุข มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2556)

สำหรับในภาคเกษตรกรรม ก็มีเกณฑ์การตรวจรายที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตภายในกิจกรรมหลากหลายด้านเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในระดับ ครัวเรือน เช่น การทำไร่นาสวนผักสวนผลไม้ การปลูกผักสวนครัวรายจ่ายด้านอาหารในครอบครัว การใช้ปุ๋ยคอก และทำปุ๋ยหมักใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดรายจ่ายและช่วยปรับปรุงบำรุงดิน การเพาะ เห็ดฟางจากฟางข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา การทำก้าชชีวภาพจากมูลสุกร หรือวัว เพื่อใช้เป็น พลังงานในครัวเรือน การทำสารสกัดชีวภาพจากเศษพืชผักผลไม้และพืชสมุนไพร การเลี้ยงปลา หรือสตัวน้ำในร่องสวน นาข้าว สารน้ำ น่องซีเมนต์หรือบ่อพลาสติกเพื่อเป็นอาหารโปรดีนและ รายได้เสริม เป็นต้น

ปลาคุกที่เลี้ยงเพื่อการค้าในประเทศไทย มีอยู่หลายชนิดที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายในยุคแรก (ก่อนปีพ.ศ. 2529) คือปลาคุกค้าน หลังจากราคากماกในหลายปีนั้น เกษตรกรก็หันมาเลี้ยงปลา คุกอุยแทน แต่ปลาคุกอุยเจริญเติบโตช้าและมีปัญหารื่องโรคมาก แต่เนื่องมีรากติดตื้นง่ายได้ราคา ดีกว่าปลาคุกชนิดอื่น จนกระทั่งปลายปี 2530 เกษตร ได้นำปลาคุกขักษ์ (ปลาคุกเทศ หรือปลาคุก รัสเซีย) จากประเทศลากวามาพัฒนาและพัฒนาจนได้ดี ทั้งยังเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชน เนื่องจากมีรากติดตื้นง่ายและราคาถูก เกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงปลาคุกพสมที่มีรากติดตื้นง่ายกับปลาคุกอุย เจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี ทั้งยังเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชน นีองจากมีรากติดตื้นง่ายและราคาถูก เกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงปลาคุกพสมหรือเรียกกันว่า “ปลาคุกนึกอุย” ซึ่งในปัจจุบันประมาณกันว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาคุกประมาณ 90% เลี้ยงปลาคุกนึกอุย มีเพียง 10% ที่เหลือเท่านั้นที่เลี้ยงปลาคุกขักษ์ ปลาคุกอุย หรือปลาคุกค้านแท้ (กรมประมง, 2556; อุทัยรัตน์, 2544)

ปลาดุกบิ๊กอุย



ภาพที่ 1 ปลาดุกบึงกุฎี (*Clarias macrocephalus* × *C. gariepinus*)
(ที่มา: Jean, 2013)

ปลาคุกนิ่กอุยหรือปลาคุกอุยเทศ (ภาพที่ 1) เป็นปลานำ้ำจืดซึ่งเกิดจากการเพาะพสูตเมียน
ข้ามพันธุ์ระหว่างพ่อพันธุ์ปลาคุกยักษ์ (*C. gariepinus*) กับแม่พันธุ์ปลาคุกอุย (*C. macrocephalus*)
โดยลูกปลาที่ได้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับปลาคุกอุย มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและมีความทนทาน
ต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกร และเป็นปลาที่ได้รับความนิยมในการ
บริโภคกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเดิมที่เดียวนั้นปลาคุกยักษ์ที่นำมาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ได้ถูกเกษตรกร
นำเข้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะเห็นว่าเป็นปลาที่โตเร็ว
สามารถกินอาหารได้แบบทุกชนิด และทนทานต่อโรคพยาธิและสภาพแวดล้อมได้ดี ทางราชการได้
ให้ความสนใจกับปลาตัวนี้มาก จึงมอบให้กรมประมงทำการศึกษาทางอนุกรมวิธานและชีวประวัติ
พบว่าเป็นปลาตรรกะแพทฟิช (catfish) เช่นเดียวกับปลาคุกอุยมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา มีเชื้อว่า
C.gariepinus (African sharpooth-catfish) เป็นปลาที่มีการเจริญเติบโตเร็วมาก สามารถกินอาหาร
ได้ทุกชนิด มีความทนทานต่อ โรคและสภาพแวดล้อมสูง และเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่เมื่อ
เจริญเติบโตเต็มที่ แต่ข้อเสียของปลาคุกชนิดนี้คือ มีเนื้อเหลวสีขาวซีดและไม่น่ารับประทาน
นอกจากนี้ยังพบว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาที่นิสัยก้าวร้าวและกินปลาชนิดอื่นเป็นอาหาร กรมประมงได้
ให้เชื้อว่าปลาคุกเทศแต่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า “ปลาคุกยักษ์” เนื่องจากมีขนาด
ใหญ่มากเมื่อเทียบกับปลาคุกอุยและปลาคุกค้าน (ทิพย์สุคานะกุณ, 2549; สันต์, 2548 ถึง โดย อิส
รพงศ์, 2554)

ตารางที่ 1 ข้อแตกต่างระหว่างปลาดุกอุบ ปลาดุกค้าน และปลาดุกขักน้ำ

ลักษณะ	ปลาดุกอุบ	ปลาดุกค้าน	ปลาดุกขักน้ำ
กะโหลกท้ายทอย	โค้งมน	แหลมเป็นหยัก 1 หยัก	แหลมเป็นหยัก 3 หยัก
กระดูกกะโหลก	เรียบลื่น	เรียบลื่น เข้าเดียวกับปลาดุกอุบ	ตะปุ่มตะป่า
ครีบหู	มีจังหวะสั้นแหลมคม มาก ครีบแข็งยืดยาวเกิน หรือเท่ากับครีบอ่อน		มีจังหวะสั้นนิ่มไม่ แหลมคมและส่วนของ ครีบอ่อนหุ้มถึงปลาย ครีบแข็ง
สีของลำตัว	เหลือง หรือน้ำตาลปัน ^{คำ} ที่บริเวณด้านบนของ ลำตัว	เทาหรือเทาดำ	เทาหรือเทาอมเหลือง บางครั้งดกกระหน่ำใน ตาข่ายหินอ่อน
โคนครีบหาง	ไม่มีแอบขาว	ไม่มีแอบขาว	มีแอบขาวเห็นได้ชัด
สีของหนังท้อง	มีสีขาวถึงเหลืองเฉพาะ บริเวณอกถึง ครีบท้อง	มีสีขาวจากออกถึงครีบ ท้อง	หนังท้อง มีสีขาว ตลอดจนถึงโคนหาง

ที่มา: กรมประมง (2556) และ อุทัยรัตน์ (2544)

ปลา尼ล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Oreochromis niloticus* (Linn.) จัดลำดับลักษณะทางอนุกรมวิธานได้ดังนี้ (Nelson, 1994)

Phylum Chordata

Class Actinopterygii

Subclass Neopterygii

Order Perciformes

Suborder Labroidei

Family Cichlidae

Genus *Oreochromis*

Species *Oreochromis niloticus*



ภาพที่ 2 ปลา尼ล (*Oreochromis niloticus*)

ชีววิทยาบางประการของปลา尼ล

ปลา尼ล (ภาพที่ 2) เป็นพันธุ์ปลาที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมแถบบริเวณอุ่มน้ำในลagoon ในแอฟริกาตะวันออกและบริเวณแถบน้ำเซเนกัล ในแอฟริกาตะวันตก ปลา尼ลมีลักษณะตัวแบนข้าง มีริมฝีปากบนและล่างเสมอ กันหลัง โถงขึ้นเล็กน้อย จนถูกน้ำข้างละຽบ ปากขนาดปานกลาง นูนปากอยู่ระหว่างตา กับจมูก มีลายพาดขวาง 9-10 แฉบ ครึ่งหลังมีอันเดียวมีฐานยาว ประกอบด้วยก้านครึ่งอ่อน 9-10 อัน ก้านครึ่งแข็ง 16-18 ก้าน เกล็ดเป็นชนิดเรียบ ลำตัวจะมีสีต่างๆ เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม คือ มีสีน้ำตาลปนเหลือง สีเขียวเข้มหรือสีน้ำเงิน ตรงกลางเกล็ดมีสีเข้ม บริเวณ ส่วนอ่อนของครึ่งหลัง ครึ่งก้น และครึ่งหางนั้นมีจุดสีขาวและดำตัดขาว และคุกคลายลายข้าวตอกอยู่โดยทั่วไป มีเกล็ดบนเส้นข้างลำตัว 33 เกล็ด เกล็ดข้างลำตัวจากครึ่งหลังถึงเส้นข้างลำตัว 5 เกล็ด และจากเส้นข้างลำตัวลงมาถึงส่วนหน้าของครึ่งก้น 13 เกล็ด ที่แก้มมีจุดเข้ม 1 จุด ปลา尼ลมีฟันขนาดเล็กบนขากรรไกรและบริเวณคอหอย ไม่มีกระเพาะแท้เหมือนปลา กินเนื้อ ขนาดของปลา尼ล มีความยาวเกือบ 50 เซนติเมตร น้ำหนัก 3 - 4 กิโลกรัม เป็นปลาที่วางไข่ตลอดปี แม่ปลาจะวางไข่ ปีละ 3 - 4 ครั้ง มีทางเดินอาหารส่วนที่ต่อจากหลอดคอพัฒนามีโครงสร้างคล้ายกระเพาะหรืออาจเรียกว่า กระเพาะดัดแปลง (modified stomach) ซึ่งสามารถหลบนำ้ำย่อยอาหารได้ ท่อทางเดินอาหารมีความยาว 5-8 เท่าของความยาวลำตัว ซึ่งมีประโยชน์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมอาหารรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์บางชนิดที่สามารถสังเคราะห์สารอาหารประเภทวิตามินได้ด้วย (สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง, 2556)

ลักษณะเพศของปลา尼ล

ตามปกติปลา尼ลเพศผู้และเพศเมียหากดูจากรูปร่างภายนอกจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่ มีลักษณะรูปร่างเริ่มแตกต่างกันไปเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ปลานิลเพศผู้มักจะมีขนาดใหญ่กว่า และ ในตุคสมพันธุ์จะมีสีสันสดใสกว่าตัวเมีย ทั้งนี้การแยกลักษณะเพศของปลา尼ล สามารถสังเกตจาก อวัยวะเพศและลักษณะอื่นๆ ประกอบดังนี้ (ภาพที่ 3)

ปลา尼ลเพศผู้ อวัยวะเพศที่บริเวณโกลักกับช่องทวารจะมีลักษณะเรียวยาวยื่นออกมา ปลาเพศผู้จะมีรูเปิด 2 รู คือ รูก้น (anus) และรูเปิดรวมของท่อน้ำเชื้อและปัสสาวะ (urogenital pore) สีของตัวปลาจะเข้มสดใส ขอบขาวข้างลำตัวมองเห็นไม่ชัดเจน ครีบจะมีสีชมพูอุ่นๆ และ ใต้ครีบจะมีสีแดง

ปลา尼ลเพศเมีย อวัยวะเพศจะมีลักษณะเป็นรูค่อนข้างใหญ่และกลม ปลาเพศเมียจะมีรูเปิด 3 รู คือ รูก้น (anus) รูท่อน้ำไข่ (oviduct) และรูท่อปัสสาวะ (ureter) อวัยวะเพศจะมีลักษณะค่อนข้าง กลมใหญ่ และช่องเปิดเป็นจุดของอวัยวะเพศ สีของตัวปลาจะซีดกว่าปลาเพศผู้ มองเห็นandan ขาวข้างลำตัวได้ชัดเจน ใต้ครีบจะมีสีเหลือง และขนาดตัวปลาโดยทั่วไปจะเล็กกว่าปลาเพศผู้



ภาพที่ 3 ลักษณะต่างเพศของปลา尼ลเพศผู้ (ด้านขวา) และปลา尼ลเพศเมีย (ด้านซ้าย)

อุปนิสัยการกินอาหารและคุณสมบัติทางประการของปลา尼ล

ปลา尼ลกินอาหารได้ทุกชนิด เช่น ไวน้ำ ตะไคร่น้ำ สาหร่าย แหน ตัวอ่อนของแมลง และ สัตว์เล็กๆ ที่อยู่ในแหล่งน้ำ แต่การเลี้ยงจะให้อาหารสมทบเป็นหลัก เช่น ปลายข้าว มันสำปะหลัง รำข้าว ปลาปืน และพืชผักต่างๆ ให้มีส่วนผสมของโปรตีนประมาณ 20 %

ปลา尼ลเป็นปลาที่กินอาหารตลอดเวลา กลางวันไม่ค่อยกินอาหาร จะกินอาหารในเวลา กลางคืน แต่การย่อยจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปลา尼ลกินอาหารได้ทั้งบนผิวน้ำ กลางน้ำ และ พื้นท้องน้ำ ทำให้สามารถกินอาหารได้หลากหลายประเภท โดยอาหารที่กินแตกต่างกันเดือน้อย

ตามขนาด ปานิลขนาด 1 - 2 นิ้ว กินแพลงก์ตอนและตัวอ่อนของกุ้ง ญี่ร่วมทั้งสาหร่ายเส้นสาย ปานิลขนาด 3 – 5 นิ้ว กินแพลงก์ตอนและตัวอ่อนของกุ้งและญี่ แต่อารส่วนใหญ่เป็นแพลงก์ตอนพืช จำพวกไครอตอน สาหร่ายสีเขียว และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน รวมทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งเน่าเสื่อมตามกันบ่อ มีทางเดินอาหารยาวประมาณ 5 – 7 เท่าของลำตัว ทำให้มีประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมอาหาร ปานิลไม่มีกระเพาะแท้ แต่มีเนื้อเยื่อชั้น มีโครงสร้างคล้ายกระเพาะที่สามารถหลบหนีขับออกเพื่อลดความเป็นกรด-ค่าง ระหว่างการย่อยได้ จึงสามารถย่อยโปรตีนจากสาหร่ายและแพลงก์ตอนได้ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสารอาหารทั้งโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นิวัฒนิ, 2547; พากศรีชัย, 2536)

การเลี้ยงปลาคุกนิกอยู่ในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก กำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากใช้พื้นที่น้อย วัสดุมีอาชีวิ่างานประมาณ 2 - 3 ปี สามารถลดปัญหาภัยพาหะไม่เหมาะสมยังเกิดจากสภาพของพื้นดิน โดยเฉพาะพื้นที่ดินเบร์ช ซึ่งปัจจุบันการเลี้ยงปลาคุกนิกอยู่ในบ่อพลาสติกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเลี้ยงในรูปแบบเกษตรบังคับหรือเกษตรเพียงคนแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการเลี้ยงปลาคุกนิกอยู่ในลักษณะนี้ก็เป็นที่นิยม เพราะสามารถเลี้ยงได้ทุกสภาพพื้นที่ ก่อสร้างบ่อได้ง่าย ใช้วงเวลาในการดูแลน้อย (กลุ่มส่งเสริมการผลิตประมง, 2556; ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2556) ซึ่งอาจสรุปข้อดีของการเลี้ยงปลาคุกนิกอยู่ในบ่อพลาสติก ได้ดังต่อไปนี้

1. ใช้พื้นที่เลี้ยงน้อย และสามารถเลี้ยงได้ทุกพื้นที่
2. การก่อสร้างบ่อเลี้ยงง่าย สะดวกและรวดเร็ว
3. ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น แต่ละรุ่นใช้เวลาเลี้ยงเพียง 90 – 120 วัน
4. ปลาคุกเป็นปลาที่อุดหนาต่อสภาพน้ำได้ดี
5. ปลาคุกสามารถเลี้ยงและดูแลรักษาได้สะดวก นอกจากขั้นนำบริโภคในครัวเรือนแล้ว ส่วนที่เหลือก็นำไปขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว

ตัวอย่างของเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงปลาคุกนิกอยู่ในบ่อพลาสติก ได้แก่

นายอนันน พูปาน อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลสมหวัง อำเภอองครักษ์ จังหวัดพัทลุง ทำการเลี้ยงปลาคุกในบ่อพลาสติก โดยเริ่มจากการขุดบ่อกว้าง 2x4 เมตร ลึกประมาณ 80 เซนติเมตร จากนั้นนำกระสอบอาหารมาถมให้ทั่วบ่อ และนำพลาสติกที่เตรียมไว้มารองชั้นอีกชั้น แล้วก่อสูบน้ำเข้าบ่อประมาณ 5 เซนติเมตร และใช้ดินผสมกับดินบ่อ และสูบน้ำเข้าบ่ออีกไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร แล้วปิดผิวปลาคุกลงบ่อได้ บ่อละ 1,000 ตัว สำหรับขั้นตอนการดูแลและการให้อาหารนั้น

ปลาขนาดเล็กให้อาหารถูกปลาครุกอ่อนเป็นอาหารพง เมื่อปลาโตกว่า 2 นิ้ว ก็ให้อาหารเม็ดพอถูกปลาอยู่ได้ประมาณ 1 เดือนก็ให้อาหารปลาครุกเล็กและปลาครุกรุ่นตามระยะเวลาและขนาดของปลาที่เหมาะสม “หัวใจสำคัญของการเลี้ยงปลาครุกในบ่อพลาสติก คือ การสังเกต้น้ำในบ่อว่ามีกลิ่นเน่าหรือไม่ และมีปลาตายหรือไม่” จากนั้นเมื่อเลี้ยงปลาได้ประมาณ 4 เดือน ก็จะนำไปขายเป็นปลาสด หรือนำไปแปรรูปได้ (เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2554)

นายนิรันดร์ เจริญยิ่ง เกษตรกร หมู่ที่ 10 บ้านท่าแซะ ตำบลท่าเคย อำเภอท่าจ้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รวมกุ่นสมาร์ทเครย์สูกิจพอเพียงชุมชน จำนวน 20 ราย โดยระดมทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อนำค่าเนินการเลี้ยงปลาครุกอยู่ในบ่อพลาสติก โดยเริ่มน้ำในบ่อพลาสติกประมาณ 70 ถูกบาศก์เมตร และนำ EM จำนวน 40 ซีซี พร้อมน้ำเปล่า 30 ลิตร ผสมกากน้ำตาล 40 ซีซี หมักไว้ 1 อาทิตย์ แล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 15 วัน โดยนำ EM ขยายใช้แล้วจำนวน 8 ลิตร ใส่ลงไปในบ่อพลาสติกทิ้งเอาไว้ประมาณ 4 - 5 วัน แล้วนำปลามาปล่อยในบ่อที่เตรียมไว้ โดยอัตราการเลี้ยง 1 บ่อ เลี้ยงปลาได้ 1,000 ตัว การขยาย EM ใช้ 2 ลิตร/สัปดาห์ เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย โดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำตลอดจนถึงจันจาน่าย (กระบวนการเรียนรู้, 2556)

นายสุเมธ มีอ่อง ได้ทำการเลี้ยงปลาครุกบึกอยู่ในบ่อพลาสติกมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งทำการเลี้ยงทั้งหมด 3 บ่อฯ ละ 500 ตัว สาเหตุที่เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกเนื่องจากในหมู่บ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและไม่มีบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ โดยการเลี้ยงปลาครุกเริ่มจากการขุดบ่อปลาขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 60 -70 เซนติเมตร ปูร่องพื้นด้วยพลาสติกคำ น้ำที่ใส่ในบ่อควรใส่ให้มีความลึก 30 เซนติเมตร ให้อาหารวันละ 1 ครั้ง ช่วงเวลาประมาณ 1 ทุ่ม ให้ปลากินให้อิ่ม อีกครึ่งชั่วโมงให้อาหารเหลือในบ่อ เพราะจะทำให้น้ำเสีย การเปลี่ยนน้ำควรเปลี่ยนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เลี้ยง 4 เดือน ก็สามารถขายได้ (เกษตรกิจพน, 2556)

นางผ่องศรี ทุชรุ่ง อายุ 57 ปี เกษตรกรอยู่บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 10 ตำบลปันแผล อำเภอควบคุม บุน จังหวัดพัทลุง มีอาชีพทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้เลี้ยงปลาครุกในบ่อพลาสติกไว้บริโภคในครัวเรือน จำนวน 2 บ่อ บ่อกว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร ปล่อยปลาครุกบ่อละ 1,000 ตัว เลี้ยงเป็นเวลา 3 เดือนครึ่ง จับปลาได้ 150 กิโลกรัม หากเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปจะมีต้นทุนการผลิตไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ต่อบ่อ นางผ่องศรีจึงทดลองทำผลไม้หมักซึ่งประกอบด้วยพอกกลวยน้ำว้า มะม่วง 30 กิโลกรัม กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม น้ำ 10 กิโลกรัม และสารเร่ง พค.6 1 ช่อง หมักจนย่อยสลายคึก แล้วจึงตักให้ปลากิน วันละครึ่งๆ ละประมาณ 3 ลิตร ทั้งนี้ผลไม้ที่หมักเป็นผลไม้บ้าน แล้วนำไปต้มกับน้ำ นำไปต้มกับน้ำในพลาสติก การใช้ผลไม้หมักเลี้ยงปลาจากคลังต้นทุนการผลิตแล้วยังช่วยรักษาน้ำในบ่อไม่ให้เน่าเสียด้วย หลังจากเลี้ยงปลาได้

เดือนครรช จนถึงจันได้จะได้ปลาคุกขนาด 3 - 4 ตัวต่อ กิโลกรัม ปลาเจริญเติบโตดีตัวปลาสะอาท สีเหลือง สวยงาม ไม่มีกลิ่น เมื่อคิดต้นทุนการผลิตกับละ 4,000 บาท เท่ากับคิดต้นทุนได้มีละ 1,000 บาท ปลาที่เดี๋ยงใช้บริโภคในครัวเรือน เหลือจากบริโภคแล้วขายเป็นปลาสด ปลาคุกแฉะ เดียว และปลาร้า มีรายได้บ่อละ 6,500 บาท (สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์, 2552)

ทั้งนี้หากพิจารณาการเลี้ยงปลาคุกนึ่กอุขในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร พนวณมีเกษตรกรบางรายได้ประสบกับปัญหาคุณภาพน้ำในบ่อพลาสติกมีคุณภาพที่ไม่ดี ปริมาณออกซิเจนลดลงหน้ามีค่าต่ำกว่าต้องการ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ปริมาณสารอาหารจำพวกแอนโนมีเนียในโครงสร้างหรือออร์ไนฟอสเฟตฟอฟอรัสมีปริมาณค่อนข้างสูง อีกทั้งปลาคุกนึ่กอุข ที่เลี้ยงด้วยระบบแบบนี้มักมีกลิ่นโคลนในเนื้อ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเกิดมาจากการหลายสาเหตุ เช่น การเหลือของเศษอาหารที่พื้นกันบ่อ การขับถ่ายของเสื้อของปลาคุกนึ่กอุข หรือขาดหลังของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ย อนินทรีย์เพื่อการสร้างอาหารธรรมชาติที่มากเกินไป การเกิดครุ่นแพลงก์ตอนพืชหรือสาหร่ายที่ก่อให้เกิดกลิ่นโคลนในสัตว์น้ำได อันมีสาเหตุเนื่องจากในบ่อ มีสารอาหารส่วนเกินมากเกินไป เป็นต้น

และนอกจากนี้หากสังเกตการเลี้ยงปลาคุกนึ่กอุขในบ่อพลาสติกตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พนวณส่วนใหญ่จะเลี้ยงในลักษณะ “การเลี้ยงปลาแบบชนิดเดียว” ซึ่งทั้งนี้นี้ ความเป็นไปได้ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงปลาคุกนึ่กอุขในบ่อพลาสติกร่วมกับสัตว์น้ำชนิดอื่นในลักษณะ “การเลี้ยงปลาหลายชนิดหรือแบบรวม” คือ การเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมในบ่อเดียวกัน หรือชนิดเดียว แต่มีขนาดต่างกัน และไม่มีอันตรายต่อกัน ข้อดีของการเลี้ยงปลาแบบรวมสามารถใช้ประโยชน์ได้จากอาหารที่มีในบ่อปลาอย่างเต็มที่ และชนิดปลาที่แตกต่างกันนั้นซึ่งจะส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552)

Yong-Sulem *et al.* (2006) ทำการศึกษาทดลองอนุบาลสุกปลากุ้งปลาคุกเทศร่วมกับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ปลานิลในบ่อเดียวกัน เพื่อให้สุกปลาคุกเทศได้กินสุกปลานิลที่จะเกิดขึ้นในบ่อ โดยสุกปลาคุกเทศที่นำมากลองมีน้ำหนักประมาณ 2.4 – 3.5 กรัม ส่วนพ่อแม่พันธุ์สุกปลานิลต้องมีความสมบูรณ์เพศ มีน้ำหนักประมาณ 67 – 70 กรัม แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ทรีดเมนต์ ๆ ละ 2 ชั้้า คือ ทรีดเมนต์ที่ 1 เลี้ยงปลาคุกเทศเพียงชนิดอย่างเดียวในอัตรา 3 ตัว/ตารางเมตร ทรีดเมนต์ที่ 2 และ 3 เลี้ยงปลาคุกเทศในอัตรา 3 และ 4 ตัว/ตารางเมตร ร่วมกับพ่อแม่พันธุ์สุกปลานิล ตามลำดับ โดยทรีดเมนต์ที่ 2 และ 3 อัตราส่วนจำนวนสุกปลาคุกเทศต่อพ่อแม่พันธุ์สุกปลานิล เท่ากับ 6:1 และพ่อแม่พันธุ์สุกปลานิลในแต่ละบ่อจะใส่พ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์ ในอัตราส่วน 1:3 ผลการศึกษาพบว่า สุกปลาคุกเทศที่เลี้ยงในอัตรา 3 ตัว/ตารางเมตร ร่วมกับพ่อแม่พันธุ์สุกปลานิลมีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตค่อนข้างดีกว่าทรีดเมนต์อื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P \leq 0.05$)

ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยให้มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดการพัฒนาของระบบการเลี้ยงปลาดุกน้ำกุญแจในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะนำปลา尼ล ซึ่งเป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพการเพาะเลี้ยง กินอาหาร ได้หลากหลายชนิด มาเลี้ยงร่วมกับปลาดุกน้ำกุญแจ เพื่อให้ปลา尼ลที่เลี้ยงนั้นช่วยส่งเสริมเกื้อกูลให้เกิดความสมดุลของระบบในเวศภายนในบ่อพลาสติก โดยปลานิลกินเศษอาหารที่เหลือที่กินไม่หมดของอาหารธรรมชาติ ทำให้ในบ่อ มีคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาดุกน้ำกุญแจ อีกทั้งเมื่อสิ้นฤดูกาลการเลี้ยงยัง ได้ผลผลิตของปลานิลเพิ่มอีกด้วย

ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิจัย “การเลี้ยงปลาดุกน้ำกุญแจร่วมกับปลานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นข้อมูลเบื้องต้นด้านการเลี้ยง และสามารถนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงปลาดุกน้ำกุญแจในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างยั่งยืนคือไปในอนาคต

อุปกรณ์และวิธีการ

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

1. วัสดุอุปกรณ์ในการทดลองเลี้ยงปลาดุกบีกอุบร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกและการวัดประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบีกอุยและปานิล
 - 1.1 บ่อคิน ขนาด $2 \times 3 \times 0.8$ เมตร ชั้นปูนบ่อด้วยพลาสติกสีดำที่มีความหนา 0.15 มิลลิเมตร จำนวน 12 บ่อ
 - 1.2 คอกราพลาสติก ขนาด 2 ตารางเมตร จำนวน 9 คอก (ขั้วที่ 1 ในการทดลองที่ 1 และ 2)
 - 1.3 ถุงปลาดุกบีกอุย ที่มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 3 – 4 กรัม (การทดลองที่ 1) และน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 9 – 10 กรัม (การทดลองที่ 2)
 - 1.4 ถุงปานิลแปลงเพศ ที่มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 25 - 30 กรัม (การทดลองที่ 1 และ 2)
 - 1.5 กระถาง
 - 1.6 เครื่องซึ้ง
2. วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีวิเคราะห์ปัจจัยพันธุ์และตรวจวินิจฉัยนิคแพลงก์ตอนพืช
 - 2.1 กระบอกเก็บน้ำด้วยข่างขนาด 1 ลิตร
 - 2.2 ถุงกรองแพลงก์ตอน 10 ไมครอน
 - 2.3 ถังตวงน้ำหนัก 5 ลิตร
 - 2.4 ขวดเก็บน้ำด้วยข่างแพลงก์ตอน
 - 2.5 หลอดหยด (Dropper)
 - 2.6 แผ่นกระดาษไลต์ และ Cover glass
 - 2.7 กล่องชุดทรรศน์พร้อมกล้องดิจิตอล
 - 2.8 บีกเกอร์ (Beaker)
 - 2.9 ขวดรูปชنمผู้ (Erlenmeyer flask)
 - 2.10 กรวยกรอง (Funnel)
 - 2.11 กระบอกตวง (Cylinder)
 - 2.12 Reduction Column
 - 2.13 ขวด BOD
 - 2.14 กระดาษกรอง

- 2.15 แผ่น Secchi Disk
- 2.16 เครื่อง pH-EC-TDS METER ยี่ห้อ HANNA instruments รุ่น HI 9812
- 2.17 เครื่อง Spectrophotometer พร้อม Cuvette
- 2.18 เทอร์โมมิเตอร์
- 2.19 น้ำกลั่น
- 2.20 Oxidizing Solution
- 2.21 Rochelle salt Solution
- 2.22 Phenate Solution
- 2.23 Standard Ammonium Chloride Solution
- 2.24 Diazotizing Reagent
- 2.25 Coupling Reagent
- 2.26 Standard Nitrite Solution
- 2.27 Standard Nitrate Solution
- 2.28 Stock Nitrate Solution
- 2.29 NH₄Cl-EDTA Solution (เข้มข้น)
- 2.30 NH₄Cl-EDTA Solution (เจือจาง)
- 2.31 ผงแคนเมี่ยน
- 2.32 Ammonia Molybdate Solution
- 2.33 Stannous Chloride Solution
- 2.34 Standard Phosphate Solution
- 2.35 แมงกานีสชัลเฟต์เตตราไซเดรต (MnSO₄)
- 2.36 กรดซัลฟูริกเข้มข้น (H₂SO₄)
- 2.37 น้ำเปล่า
- 2.38 สารละลายน้ำ Na₂S₂O₃.5H₂O
- 2.39 Lugol's solution

วิธีการดำเนินการวิจัย

การทดลองที่ 1 (ปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2554)

ศึกษาอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาคุกนิกอุยและปลานิลในระบบการเลี้ยงปลาคุกนิกอุยร่วมกับปลานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง

1. การเตรียมบ่อทดลอง

1.1 ดำเนินการเตรียมบ่อคิด ขนาด $2 \times 3 \times 0.8$ เมตร ชั้งญี่ปุ่นบ่อด้วยพลาสติกสีดำที่มีความหนา 0.15 มิลลิเมตร จำนวน 12 บ่อ และทำการติดตั้งหลังคาบริเวณบ่อทดลองที่ทำด้วยตาข่ายพรางแสง 50% เพื่อลดความเข้มของแสงแดด (ภาพที่ 4)



ภาพที่ 4 ขั้นตอนการบุคบ่อทดลองพร้อมปูพลาสติกสีดำที่พื้นบ่อในการทดลองที่ 1

1.2 ทำการเติมน้ำในบ่อทดลองแต่ละบ่อ โดยนำน้ำจากคลองชลประทานกรองผ่านด้วยผ้ากรองเพื่อป้องกันศัตรุของลูกปลาดุกน้ำกุยและลูกปลา尼ล ทำการพักน้ำไว้ 2 - 3 วัน ก่อนที่จะนำลูกปลาดุกน้ำกุยและลูกปลา尼ลมาปล่อยในแต่ละบ่อ รักษาระดับน้ำให้มีความลึกไม่ต่ำกว่า 0.5 เมตร ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำตลอดการทดลอง (ภาพที่ 5)



ภาพที่ 5 การเติมน้ำจากคลองชลประทานผ่านผ้ากรองลงบ่อทดลองแต่ละบ่อในการทดลองที่ 1

2. การเตรียมปลาทดลอง

เตรียมลูกปลาดุกน้ำกุยที่มีขนาดความยาวประมาณ 2 - 3 นิ้ว มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 3 - 4 กรัม และลูกปลา尼ลแปลงเพศ ที่มีขนาดความยาวประมาณ 4 – 5 นิ้ว มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 25 - 30 กรัม จากฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาของเอกชน มาพักให้ปรับตัวในบ่อพลาสติกประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนทำการสุ่มนับและซึ่งน้ำหนักลูกปลาเริ่มต้น แล้วปล่อยลงในบ่อทดลองแต่ละบ่อ

3. การวางแผนการทดลอง

การทดลองที่ 1 (ปีที่ 1) ศึกษาอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาดุกน้ำกุยและปลา尼ลในระบบการเดี้ยงปลาดุกน้ำกุยร่วมกับปลา尼ลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตกลอต (Complete Randomized Design; CRD) โดยสุ่มนับลูกปลาดุกน้ำกุยและลูกปลา尼ล และปล่อยลงในบ่อพลาสติกทั้ง 12 บ่อ (4 ทรีตเมนต์ ละ 3 ชั้น) โดย

ทรีตเมนต์ที่ 1 (บ่อที่ 1 – 3) เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยที่ระดับความหนาแน่น 30 ตัว/ตารางเมตร (บ่อควบคุม)


ทรีตเมนต์ที่ 2 (บ่อที่ 4 – 6) เลี้ยงปลาคุกบิกอุยที่ระดับความหนาแน่น 25 ตัว/ตารางเมตร ร่วมกับเลี้ยงปานิลที่ระดับความหนาแน่น 3 ตัว/ตารางเมตร

ทรีตเมนต์ที่ 3 (บ่อที่ 7 – 9) เลี้ยงปลาคุกบิกอุยที่ระดับความหนาแน่น 20 ตัว/ตารางเมตร ร่วมกับเลี้ยงปานิลที่ระดับความหนาแน่น 4 ตัว/ตารางเมตร

ทรีตเมนต์ที่ 4 (บ่อที่ 10 – 12) เลี้ยงปลาคุกบิกอุยที่ระดับความหนาแน่น 15 ตัว/ตารางเมตร ร่วมกับเลี้ยงปานิลที่ระดับความหนาแน่น 5 ตัว/ตารางเมตร

ทุกบ่อ มีการสร้างอาหารธรรมชาติ โดยใส่ปูไข่มุลไก่แห้ง ในอัตรา 20 กก./ไร่ / 2 สัปดาห์

3.2 ทำการสุ่มนับและซึ้งน้ำหนักเริ่มต้นของลูกปลาคุกบิกอุยที่มีขนาดความยาวประมาณ 2 – 3 นิว มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 3 – 4 กรัม และปานิลแปลงเพศ ที่มีขนาดความยาวประมาณ 3 – 4 นิว มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 25 - 30 กรัม แล้วนำไปปล่อยลงในบ่อทดลอง แต่ละบ่อตามระดับความหนาแน่นที่กำหนดไว้ (ภาพที่ 6)



ภาพที่ 6 การสุ่มนับจำนวนและปล่อยลูกปลาทดลองในแต่ละบ่อทดลองในการทดลองที่ 1

ให้ปลาครุกบีกอุยกินอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดกลอยน้ำโปรตีน 30% ในอัตรา 5% ของน้ำหนักตัวปลา ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง (08.00 – 09.00 น. และ 15.00 – 16.00 น.) ส่วนปานิลไม่มีการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป ทำการทดลองเดี่ยงปลาเป็นระยะเวลา 4 เดือน

หมายเหตุ :

การทดลองที่ 1 (ปีที่ 1) ศึกษาอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาครุกบีกอุยและปานิลในระบบการเดี่ยงปลาครุกบีกอุยร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ได้ทำการทดลอง 2 ครั้ง (2 ชั้น) เกี่ยวกับลักษณะการเดี่ยงปานิลในบ่อพลาสติกสำหรับทริตรเมนต์ ที่ออกแบบการทดลองให้เลี้ยงปลาครุกบีกอุยร่วมกับปานิล เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ มากยิ่งขึ้น โดยทำการเดี่ยงปานิลในลักษณะดังต่อไปนี้

การทดลองชั้นที่ 1 ทำการเดี่ยงปานิลในคอกพลาสติก ขนาด 2 ตารางเมตร ที่วางในบ่อพลาสติก บ่อละ 1 คอก เพื่อป้องกันปานิลกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ให้แก่ปลาครุกบีกอุย

การทดลองชั้นที่ 2 ทำการเดี่ยงปานิลร่วมกับปลาครุกบีกอุยโดยปล่อยให้สามารถอาศัยและว่ายน้ำกินอาหารตามพื้นได้ทั่วบ่อ

ทั้งนี้ในการทดลองชั้นที่ 1 และ 2 อัตราความหนาแน่นของปลาครุกบีกอุยและปานิลที่เดี่ยงในบ่อพลาสติกนั้น ยังคงคำนวณจำนวนปลาและอัตราความหนาแน่นของปลาตามระดับความหนาแน่นเดิมเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ทำการเดี่ยง (ตัว/ตารางเมตร) ตามที่ได้วางแผนการทดลองไว้

4. การตรวจสอบประสิทธิภาพการเติบโตของปลาครุกบีกอุยและปานิล

ทำการสุ่มนับปลาครุกบีกอุยในแต่ละบ่อ จำนวน 20% ของจำนวนปลาครุกทั้งหมดและปานิล (การทดลองชั้นที่ 1 สุ่มนับปานิลทุกดัวในแต่ละบ่อของแต่ละทริตรเมนต์) มาซึ่งน้ำหนักปลา เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการเติบโตของปลาครุกบีกอุยและปานิลทุก 1 เดือน (ภาพที่ 7) (การทดลองชั้นที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2554; การทดลองชั้นที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2554) โดยนำข้อมูลประสิทธิภาพการเติบโตที่ได้ไปปรับปรุงอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ให้แก่ปลาครุกบีกอุยดังต่อไปนี้



ภาพที่ 7 การตรวจสอบประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบีกอุยและปานิลในการทดลองที่ 1

หันนี้นำข้อมูลน้ำหนักปลาดุกบีกอุยและปานิลในแต่ละบ่อ ทุก 1 เดือน ไปคำนวณหาค่าประสิทธิภาพการเติบโตต่างๆ ดังนี้

1. น้ำหนักเฉลี่ย (Average weight) (กรัม)

$$= (\text{น้ำหนักปลาทั้งหมด} / \text{จำนวนปลาทั้งหมด})$$

2. น้ำหนักเพิ่ม (Weight gain) (กรัม)

$$= (\text{น้ำหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง} - \text{น้ำหนักปลาเริ่มต้น})$$

3. น้ำหนักเพิ่มต่อวัน (Average diary growth; ADG) (กรัม/วัน)

$$= (\text{น้ำหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง} - \text{น้ำหนักปลาเริ่มต้น}) / \text{จำนวนวันที่เลี้ยง}$$

4. อัตราการเติบโตจำเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) (%/วัน)

$$= 100 \times (\ln \text{น้ำหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง} - \ln \text{น้ำหนักปลาเมื่อเริ่มต้นการเลี้ยง}) / \text{จำนวนวันที่เลี้ยง}$$

5. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio: FCR)

$$= \text{น้ำหนักของอาหารที่ปากิน (ก.)} / \text{น้ำหนักปลาที่เพิ่มขึ้น (ก.)}$$

6. อัตราการรอด (Survival rate) (%)

$$= (\text{จำนวนปลาที่เหลือเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง} / \text{จำนวนปลาที่เริ่มต้นการเลี้ยง}) \times 100$$

5. การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้ำทางกายภาพ และเคมี

ทำการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีในบ่อทดลองทั้ง 12 บ่อ ทุก 15 วัน (ภาพที่ 8) จนเสร็จสิ้นการทดลอง ได้แก่

- อุณหภูมิอากาศและน้ำ โดยใช้ Thermometer
- ค่าความโปร่งแสงของน้ำ โดยใช้ Secchi disc
- ค่าความเป็นกรด – ด่าง โดยใช้ pH meter (ยี่ห้อ HANNA instruments รุ่น HI 9812)
- ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด โดยใช้ TDS meter
- ค่าความนำไฟฟ้า โดยใช้ Conductivity meter
- ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ และบีโอดี โดยวิธี Azide modification หรือ Winkler method
- ปริมาณแอมโนเนียมในไตรเจน โดยวิธี Indophenol method หรือ Phenate method
- ปริมาณไนโตรทีนในไตรเจน โดยวิธีการวัดสี (Reddish purple azo dye method)
- ปริมาณไนเตรตในไตรเจน โดยวิธี Copper-cadmium reduction column method
- ปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส โดยวิธี Stannous chloride



ภาพที่ 8 การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้ำในภาคสนามและห้องปฏิบัติการในการทดลองที่ 1

6. วิเคราะห์ความหลากหลายของชินิดและองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืช

เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช ทุก 15 วัน ในบ่อทดลองทั้ง 12 บ่อ โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่าง แพลงก์ตอนพืชที่ระดับผิวน้ำ ใช้ถังน้ำขนาด 5 ลิตร ตักน้ำปริมาตร 30 ลิตร กรองผ่านถุงกรอง แพลงก์ตอน (Plankton net) ขนาดตา 10 ไมโครเมตร แล้วเก็บตัวอย่างน้ำที่เหลือป้ายกระบกของ ถุงกรองแพลงก์ตอน เทใส่ในขวดพลาสติกเก็บตัวอย่าง เติมน้ำยาดอง Lugol's solution (อัตรา 1:100) แล้วนำไปตรวจวิเคราะห์จัดจำแนกชนิดและนับปริมาณภายใต้กล้องชุลทรรศน์ต่อไป

การทดลองที่ 2 (ปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2555)

สรุปผลการทดลองที่ 1 (ปีงบประมาณ 2554) ในส่วนของการศึกษาอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาดุกนึ่กอุยและปานิลในระบบการเลี้ยงปลาดุกนึ่กอุยร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลการทดลองพบว่าการเลี้ยงปลาดุกนึ่กอุยที่ระดับความหนาแน่น 15 ตัว/ตารางเมตร ร่วมกับเลี้ยงปานิลที่ระดับความหนาแน่น 5 ตัว/ตารางเมตร มีความเหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงปลาดุกนึ่กอุยร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ นำผลการทดลองที่ได้มาประยุกต์วางแผนการทดลองที่ 2 (ปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2555) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลดอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ให้แก่ปลาดุกนึ่กอุยที่เลี้ยงร่วมกับปานิลในอัตราความหนาแน่นที่ได้เลือกไว้จากผลการทดลองที่ 1 ดังนี้

1. การเตรียมบ่อทดลอง

1.1 ทำการรื้อข้ามกระสอบทรายที่ชำรุดเสียหายรอบบริเวณบ่อทดลอง แล้วทำการซ่อมแซมและปูพลาสติกสำหรับความหนา 0.15 มิลลิเมตร ที่พื้นบ่อของบ่อทดลองขนาด $2 \times 3 \times 0.6$ เมตร จำนวน 12 บ่อ จากนั้นทำการบรรกรุทรายในกระสอบปูย จำนวน 50 ใบ นำไปจัดวางรอบขอบบ่อทดลอง ทำการซ่อมแซมและติดตั้งไม้ไfl สำหรับทำเสาและคานหลังคา พร้อมติดตั้งหลังคาที่ทำด้วยตาข่ายพรางแสง 80% ครอบคลุมบริเวณบ่อทดลอง (ภาพที่ 9)



(ก) สภาพบ่อทดลองก่อนทำการปรับปรุงซ่อมแซม



(ข) ทำการรื้อข้ามกระสอบทรายที่ชำรุดเสียหายรอบบริเวณบ่อทดลอง

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการเตรียมบ่อ/ปรับปรุงซ่อมแซมน้ำบ่อทดลองเพื่อใช้ในการทดลองที่ 2



(ก) ทำการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นบ่อ รองพื้นบ่อด้วยแกلنและทำการปูพลาสติกศีกำที่พื้นบ่อทดลอง



(ง) ทำการบรรจุหินในกระสอบปูย และนำไปใช้ความร้อนอบบ่อทดลอง



(จ) ซ่อมแซมและติดตั้งไม้ไผ่เพื่อทำเสาและคานหลังคา พร้อมติดตั้งหลังคาที่ทำด้วยตาข่ายพาราแสช 80%

1.2 ทำการเติมน้ำในบ่อทคลองแต่ละบ่อ โดยนำน้ำจากคลองชลประทานกรองผ่านตัวขึ้น้ำกรองเพื่อป้องกันศัตรูของลูกปลาดุกน้ำกีอุยและลูกปลาโนนิล ทำการพักน้ำไว้ 2 - 3 วัน ก่อนที่จะนำลูกปลาดุกน้ำกีอุยและลูกปลาโนนิลมาปล่อยในแต่ละบ่อ รักษาระดับน้ำให้มีความลึกไม่ต่ำกว่า 0.5 เมตร ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำคาดตลอดการทดลอง (ภาพที่ 10)



ภาพที่ 10 การเติมน้ำจากคลองชลประทานผ่านผ้ากรองลงบ่อทคลองแต่ละบ่อในการทดลองที่ 2

2. การเตรียมปลาทคลอง

เตรียมลูกปลาดุกน้ำกีอุยที่มีขนาดความยาวประมาณ 2 - 3 นิ้ว มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 9 – 10 กรัม และลูกปลาโนนิลแปลงเพศ ที่มีขนาดความยาวประมาณ 4 – 5 นิ้ว มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 25 - 30 กรัม จากฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาของเอกชน นาพักให้ปรับตัวในบ่อพลาสติก ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนทำการสุ่มน้ำและซั่งน้ำหนักลูกปลาเริ่มต้น แล้วปล่อยลงในบ่อทคลองแต่ละบ่อ (ภาพที่ 11)



ภาพที่ 11 การสุ่มน้ำจำนวนและปล่อยลูกปลาทคลองลงในแต่ละบ่อทคลองในการทดลองที่ 2

3. การวางแผนการทดลอง

การทดลองที่ 2 (ปีที่ 2) สึกษาความเป็นไปได้ในการลดอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป

จากผลการทดลองที่ 1 (ปีที่ 1 ปีงบประมาณปี 2554) สามารถสรุปได้ว่าการเลี้ยงปลาคุกนิ่กอุย ที่ระดับความหนาแน่น 15 ตัว/ตารางเมตร ร่วมกับเลี้ยงปลานิลที่ระดับความหนาแน่น 5 ตัว/ตารางเมตร มีความเหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยร่วมกับปลานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจ พอยเพียง ทั้งนี้นำผลการทดลองที่ได้ มาประยุกต์วางแผนการทดลองที่ 2 (ปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2555) ดังนี้

3.1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตัดตัด (Complete Randomized Design; CRD) โดยสุ่มนับ ฉุกปลาคุกนิ่กอุยและฉุกปลานิล และปล่อยลงในบ่อพลาสติกทั้ง 12 บ่อ โดยให้ปลาคุกนิ่กอุย กินอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดคลอยน้ำ โปรตีน 30% ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ไปในแต่ละทรีเมนต์ (4 ทรีเมนต์ฯ ละ 3 ชั้้า) ดังนี้

ทรีเมนต์ที่ 1 (บ่อที่ 1 – 3) มีการสร้างอาหารธรรมชาติและให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดคลอยน้ำ แก่ปลาคุกนิ่กอุย ปริมาณ 5% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน (บ่อควบคุม)

ทรีเมนต์ที่ 2 (บ่อที่ 4 - 6) มีการสร้างอาหารธรรมชาติและให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดคลอยน้ำ แก่ปลาคุกนิ่กอุย ปริมาณ 4% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน

ทรีเมนต์ที่ 3 (บ่อที่ 7 – 9) มีการสร้างอาหารธรรมชาติและให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดคลอยน้ำ แก่ปลาคุกนิ่กอุย ปริมาณ 3% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน

ทรีเมนต์ที่ 4 (บ่อที่ 10 – 12) ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติและให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป ชนิดคลอยน้ำแก่ปลาคุกนิ่กอุย ปริมาณ 4% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน

โดยให้ปลาคุกนิ่กอุยกินอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดคลอยน้ำ วันละ 2 ครั้ง (08.00 – 09.00 น. และ 15.00 – 16.00 น.) ส่วนปลานิล ไม่ต้องมีการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป ทำการทดลองเลี้ยงปลาเป็นระยะเวลา 3 เดือน

นอกจากนี้ทรีเมนต์/บ่อ (ทรีเมนต์ที่ 1 – 3 /บ่อที่ 1 – 9) ที่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ โดยใส่ปูไขมูลไก่แห้ง ในอัตรา 20 กก./ไร่/2 สัปดาห์ นั้น กำหนดให้มีการสร้างอาหารธรรมชาติ โดยใส่ปูไขมูลไก่แห้งในอัตราดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 เดือน 15 วัน ตั้งแต่เริ่มต้นของการเลี้ยงปลา (ทำการเลี้ยงปลา 3 เดือน) ทั้งนี้เนื่องจากการสังเกตในการทดลองที่ 1 (ปีที่ 1) พบว่าเมื่อทำการเลี้ยงปลา เป็นระยะเวลา 1 – 2 เดือนแรกของการเลี้ยง ปัจจัยคุณภาพน้ำที่สะท้อนถึงปริมาณชาตุอาหารมีปริมาณมาก จึงสามารถเป็นแหล่งอาหารเบื้องต้นสำหรับในการสร้างอาหารธรรมชาติให้เกิดขึ้น ในบ่อทดลอง ได้โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ปูไขมูลไก่แห้ง

3.2 ทำการสุ่มนับและซั่งน้ำหนักเริ่มต้นของปลาคุกบีกอุยที่มีขนาดความยาวประมาณ 2 – 3 นิ้ว มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 9 – 10 กรัม และปานีลแปลงเพศ ที่มีขนาดความยาวประมาณ 4 – 5 นิ้ว มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 25 – 30 กรัม แล้วนำไปปล่อยลงในบ่อทดลอง แต่ละบ่อ ในอัตราปลาคุกบีกอุยที่ระดับความหนาแน่น 15 ตัว/ตารางเมตร ร่วมกับเด็กปานีลที่ระดับความหนาแน่น 5 ตัว/ตารางเมตร (จากผลการทดลองที่ 1 ปีงบประมาณ 2554)

หมายเหตุ :

การทดลองที่ 2 (ปีที่ 2) สืบเนื่องความเป็นไปได้ในการลดอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปในระบบการเลี้ยงปลาคุกบีกอุยร่วมกับปานีลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ได้ทำการทดลอง 2 ครั้ง (2 ชั้้า) เกี่ยวกับลักษณะการเลี้ยงปานีลในบ่อพลาสติก เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยทำการเลี้ยงปานีลในลักษณะดังต่อไปนี้

การทดลองชั้้าที่ 1 ทำการเลี้ยงปานีลในคอกพลาสติก ขนาด 2 ตารางเมตร ทั่วไปในบ่อพลาสติก บ่อละ 1 คอก เพื่อป้องกันปานีลกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ให้แก่ปลาคุกบีกอุย

การทดลองชั้้าที่ 2 ทำการเลี้ยงปานีลร่วมกับปลาคุกบีกอุยโดยปล่อยให้สามารถหาอาหารได้ทั่วบ่อ

ทั้งนี้ในการทดลองชั้้าที่ 1 และ 2 อัตราความหนาแน่นของปลาคุกบีกอุยและปานีลที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกนั้น ยังคงคำนวณจำนวนปลาและอัตราความหนาแน่นของปลาตามระดับความหนาแน่นเดิมเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ทำการเลี้ยง (ตัว/ตารางเมตร) ตามที่ได้วางแผนการทดลองไว้

4. การตรวจสอบประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกบีกอุยและปานีล

ทำการสุ่มนับปลาคุกบีกอุยในแต่ละบ่อ จำนวน 20% ของจำนวนปลาคุกทั้งหมดและปานีล (การทดลองชั้้าที่ 1 สุ่มนับปานีลทุกด้วยในแต่ละห้องแต่ละทรีมเมนต์) มาซั่งน้ำหนักด้วย เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกบีกอุยและปานีลทุก 1 เดือน (ภาพที่ 12) (การทดลองชั้้าที่ 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555; การทดลองชั้้าที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555) โดยนำข้อมูลประสิทธิภาพการเติบโตที่ได้ไปปรับปรุงอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ให้แก่ปลาคุกบีกอุยต่อไป



ภาพที่ 12 การตรวจวัดประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบึงอุขและปานิลในการทดลองที่ 2

ทั้งนี้นำข้อมูลน้ำหนักปลาดุกบึงอุขและปานิลในแต่ละวัน ทุก 1 เดือน ไปคำนวณหาค่าประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบึงอุขและปานิล เมื่อเทียบกับการทดลองที่ 1 (ปีที่ 1) ดังนี้

1. น้ำหนักเฉลี่ย (Average weight)
2. น้ำหนักเพิ่ม (Weight gain)
3. น้ำหนักเพิ่มต่อวัน (Average diary growth; ADG)
4. อัตราการเติบโตจำเพาะ (Specific Growth Rate; SGR)
5. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio: FCR)
6. อัตราการรอด (Survival rate %)

5. การตรวจวัดที่ปัจจัยคุณภาพน้ำทางกายภาพ และเคมี

ทำการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีในบ่อทดลองทั้ง 12 บ่อ ทุก 15 วัน (ภาพที่ 13) จนเสร็จสิ้นการทดลอง เมื่อเทียบกับการทดลองที่ 1 (ปีที่ 1) ได้แก่

- อุณหภูมิอากาศและน้ำ โดยใช้ Thermometer
- ค่าความโปร่งแสงของน้ำ โดยใช้ Seechi disc
- ค่าความเป็นกรด – ด่าง โดยใช้ pH meter (ยี่ห้อ HANNA instruments รุ่น HI 9812)
- ปริมาณของแข็งที่ละลายในทั้งหมด โดยใช้ TDS meter

- ค่าความนำไฟฟ้า โดยใช้ Conductivity meter
- ปริมาณออกซิเจนคงคลายน้ำ และบีโอลี โดยวิธี Azide modification หรือ Winkler method
- ปริมาณแอมโมเนียในตอรเจน โดยวิธี Indophenol method หรือ Phenate method
- ปริมาณไนโตรทีนในตอรเจน โดยวิธีการวัดสี (Reddish purple azo dye method)
- ปริมาณไนเตรตในตอรเจน โดยวิธี Copper-cadmium reduction column method
- ปริมาณอร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส โดยวิธี Stannous chloride



ภาพที่ 13 การตรวจวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้ำในภาคสนามและห้องปฏิบัติการในการทดลองที่ 2

6. วิเคราะห์ความหลากหลายของชนิดและองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืช

เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช และวิเคราะห์ความหลากหลายของชนิดและองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชในบ่อทดลองที่ 12 บ่อ ในการทดลองที่ 2 (ปีที่ 2) (ภาพที่ 14) ใช้วิธีดำเนินการเหมือนกับการทดลองที่ 1 (ปีที่ 1)



ภาพที่ 14 การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชในบ่อทดลองในการทดลองที่ 2

การวิเคราะห์ทางสถิติ (การทดสอบที่ 1 และ 2)

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการเดิน โดยของปลาดุกน้ำกุยและปลา尼ล ปัจจัยคุณภาพ น้ำ ตลอดจนจำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช โดยนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95% และ 99% ด้วยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC 15.0.0 โดยวิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกต่างของแต่ละทรีเมนต์ จากนั้น เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีเมนต์ โดยวิธีของ Duncan Multiple Range Test (DMRT) และ วิเคราะห์ Correlation และ Regression เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่เกื้อกูลต่อการ เจริญเติบโตของปลาดุกน้ำกุยและปลา尼ล

สถานที่ทำการทดสอบ (การทดสอบที่ 1 และ 2)

1. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2. บ่อทดลองบริเวณพื้นที่บ้านเกยตรกร (เลขที่ 135 หมู่ 2 ตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่)

ผลการวิจัย

การทดลองที่ 1 (ปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2554)

จากการทดลองที่ 1 การศึกษาอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาคุกนิํกอุยและปานินิดต่อประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิํกอุยและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในระบบการเลี้ยงปลาคุกนิํกอุยร่วมกับปานินิดในบ่อพลาสติกแบบแหรดรูปิก็อกเพียง โดยนำสูญปลาคุกนิํกอุยที่มีน้ำหนักเริ่มนับต้นเฉลี่ย 3 - 4 กรัม มาเลี้ยงในบ่อพลาสติกขนาด $2 \times 3 \times 0.8$ เมตร จำนวน 12 บ่อ (4 ทรีเม็นต์ๆ ละ 3 ชิ้น) คือ ทรีเม็นต์ที่ 1, 2, 3 และ 4 เลี้ยงปลาคุกนิํกอุยที่ระดับความหนาแน่น 30, 25, 20 และ 15 ตัว/ตารางเมตร ตามลำดับ และในทรีเม็นต์ที่ 2, 3 และ 4 ทำการปล่อยสูญปานินิด แปลงเพศที่มีน้ำหนักเริ่มนับต้นเฉลี่ย 30 กรัม เลี้ยงร่วมกับปลาคุกนิํกอุย ที่ระดับความหนาแน่น 3, 4 และ 5 ตัว/ตารางเมตร ตามลำดับ โดยทำการทดลอง 2 ชั้ว ซึ่งในการทดลองแต่ละชั้วทำการเลี้ยงปลาเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยสุ่มตรวจวัดประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิํกอุยและปานินิด ทุก 1 เดือน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชทุก 2 สัปดาห์

ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่าประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิํกอุยที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกทั้ง 4 ทรีเม็นต์ เริ่มนิความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) เมื่อเริ่มเลี้ยงปลาคุกนิํกอุยเป็นระยะเวลา 3 เดือน และเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิํกอุย คือ น้ำหนักเฉลี่ย น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวัน และอัตราการเติบโต จำเพาะของปลาคุกนิํกอุยที่เลี้ยงในทรีเม็นต์ที่ 4 มีค่าสูงสุด ขณะที่ปลาคุกนิํกอุยที่เลี้ยงในทรีเม็นต์ที่ 1 มีค่าต่ำสุด เมื่อเปรียบเทียบกับปลาคุกนิํกอุยที่เลี้ยงในทรีเม็นต์อื่น นอกจากนี้เมื่อพิจารณา ระหว่างอัตราความหนาแน่นของปลาคุกนิํกอุยและปานินิด พบว่าปลาคุกนิํกอุยมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลาคุกนิํกอุยเพียงชนิดเดียว และประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิํกอุยจะเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราการปล่อยปลาคุกนิํกอุย น้อยลงและอัตราการปล่อยปานินิดมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ สถิติพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิํกอุยกับระดับความหนาแน่นของปานินิด ที่เลี้ยงร่วมกับปลาคุกนิํกอุย คือระดับความหนาแน่นของปานินิดที่เลี้ยงร่วมกับปลาคุกนิํกอุยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละทรีเม็นต์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวันและอัตราการเติบโต จำเพาะ และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาคุกนิํกอุย

ส่วนปัจจัยคุณภาพน้ำทางด้านกักษากาแฟและกรณีพิพากษาคุณภาพน้ำในบ่อพลาสติกทั้ง 4 ทรีเม็นต์ เริ่มนิความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) เมื่อเริ่มเลี้ยงปลาคุกนิํกอุยและปานินิด

เป็นระยะเวลา 2 เดือน นอกจากนี้พบว่าการเลี้ยงปลาคุกนิํกอุยร่วมกับป้านิลส่งผลให้ปัจจัยคุณภาพน้ำในบ่อ มีคุณภาพน้ำดีกว่าบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกนิํกอุยเพียงชนิดเดียว นอกจากนี้ปัจจัยคุณภาพน้ำที่สะท้อนถึงปริมาณชาต้อาหารมีปริมาณลดลง เมื่ออัตราการปล่อยปลาคุกนิํกอุยน้อยลงและอัตราการปล่อยป้านิลมากขึ้น สำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกพบว่าแพลงก์ตอนพืชที่เป็นชนิดเด่นส่วนใหญ่อยู่ในตัววิชัน Chlorophyta ได้แก่ *Ankistrodesmus* sp., *Dictyosphaerium* sp., *Eudorina* sp., *Pediastrum* sp., *Scenedesmus* sp. และ ตัววิชัน Chrysophyta ได้แก่ *Aulacoseira granulata*, *Cyclotella* sp., *Fragilaria* sp., *Nitzschia* sp., *Synedra* sp.

ดังนั้นสรุปได้ว่าการเลี้ยงปลาคุกนิํกอุยที่ระดับความหนาแน่น 15 ตัว/ตารางเมตร ร่วมกับเลี้ยงป้านิลที่ระดับความหนาแน่น 5 ตัว/ตารางเมตร มีความเหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงปลาคุกนิํกอุยร่วมกับป้านิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้นำผลการทดลองที่ได้ มาประยุกต์วางแผนการทดลองที่ 2 (ปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2555) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลดอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปค่อนไป

การทดลองที่ 2 (ปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2555)

การทดลองที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการลดอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงปลาคุกนิํกอุยร่วมกับป้านิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ระดับความหนาแน่นของปลาคุกนิํกอุย 15 ตัว/ตารางเมตร และป้านิล 5 ตัว/ตารางเมตร โดยให้ปลาคุกนิํกอุยกินอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดคลอยน้ำไปรดิน 30% ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปในแต่ละทรีเมนต์ (4 ทรีเมนต์ ละ 3 ชั้น) ดังนี้

ทรีเมนต์ที่ 1 (บ่อที่ 1 – 3) มีการสร้างอาหารธรรมชาติและให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดคลอยน้ำ แก่ปลาคุกนิํกอุย ปริมาณ 5% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน (บ่อควบคุม)

ทรีเมนต์ที่ 2 (บ่อที่ 4 - 6) มีการสร้างอาหารธรรมชาติและให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดคลอยน้ำ แก่ปลาคุกนิํกอุย ปริมาณ 4% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน

ทรีเมนต์ที่ 3 (บ่อที่ 7 – 9) มีการสร้างอาหารธรรมชาติและให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดคลอยน้ำ แก่ปลาคุกนิํกอุย ปริมาณ 3% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน

ทรีเมนต์ที่ 4 (บ่อที่ 10 – 12) ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติและให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปชนิดคลอยน้ำแก่ปลาคุกนิํกอุย ปริมาณ 4% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน

โดยให้ปลาคุกนิํกอุยกินอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดคลอยน้ำ วันละ 2 ครั้ง (08.00 – 09.00 น. และ 15.00 – 16.00 น.) ส่วนป้านิลไม่ต้องมีการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป ทั้งนี้ทำการทดลอง 2 ชั้น ซึ่งในการทดลองแต่ละชั้นทำการเลี้ยงปลาเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยทำการสุ่มจับปลาคุกนิํกอุย

ในแต่ละบ่อ จำนวน 20% ของจำนวนปลาครุกทั้งหมดและปลานิล มาชั้นน้ำหนักตัว เพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพการเติบโตของปลาครุกนิํกอุยและปลานิลทุก 1 เดือน

1. ประสิทธิภาพการเติบโตของปลาครุกนิํกอุยและปลานิล

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการเติบโตของปลาครุกนิํกอุยและปลานิลที่เลี้ยงในบ่อพลาสติก ทั้ง 12 บ่อ (4 ทรีเม็นต์ ละ 3 ชั้น) ตลอดระยะเวลาการทดลองทั้ง 2 ชั้น ปรากฏผลการศึกษาดังต่อไปนี้

การทดลองชั้นที่ 1: ทำการเลี้ยงปลานิลในคอกพลาสติก ขนาด 2 ตารางเมตร ที่วางในบ่อพลาสติก บ่อละ 1 คอก ผลการศึกษาประสิทธิภาพการเติบโตของปลาครุกนิํกอุยและปลานิล แสดงในตารางที่ 2 - 5 และภาพที่ 15 - 16


ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการเติบโตของปลาครุกนิํกอุยแต่ละทรีเม็นต์ในการทดลองชั้นที่ 1

(ค่าเฉลี่ย \pm ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)

เดือน	ทรีเม็นต์	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)	ADG (กรัม/วัน)	SGR (%/วัน)	FCR	อัตราอุด (%)
พ.ศ. 55 (เริ่มต้น)	1	10.04 \pm 0.34 ^a	-	-	-	-	
	2	10.72 \pm 0.15 ^a	-	-	-	-	
	3	10.67 \pm 0.10 ^a	-	-	-	-	
	4	10.94 \pm 0.20 ^a	-	-	-	-	
พ.ศ. 55	1	90.38 \pm 4.84 ^a	80.44 \pm 5.16 ^a	2.68 \pm 0.51 ^a	14.51 \pm 0.59 ^a	7.97 \pm 1.49 ^a	ไม่ได้ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ การเติบโต
	2	97.88 \pm 7.04 ^a	87.16 \pm 7.05 ^a	2.91 \pm 0.90 ^a	14.60 \pm 0.96 ^a	6.94 \pm 1.68 ^a	
	3	58.69 \pm 2.82 ^b	48.03 \pm 2.73 ^b	1.60 \pm 0.09 ^b	12.89 \pm 0.18 ^b	8.04 \pm 0.37 ^b	
	4	94.22 \pm 6.32 ^a	83.28 \pm 6.13 ^a	2.77 \pm 0.54 ^a	14.63 \pm 0.61 ^a	6.70 \pm 1.02 ^a	
ก.ศ. 55	1	183.33 \pm 13.48 ^a	173.39 \pm 13.64 ^a	3.10 \pm 0.34 ^a	15.07 \pm 0.35 ^a	8.60 \pm 0.41 ^{ab}	
	2	130.88 \pm 2.69 ^{bc}	120.15 \pm 2.62 ^{bc}	1.10 \pm 0.98 ^b	13.78 \pm 0.18 ^a	10.37 \pm 0.94 ^a	
	3	122.44 \pm 6.66 ^c	111.77 \pm 6.57 ^c	2.13 \pm 0.13 ^a	13.84 \pm 0.21 ^a	5.36 \pm 0.54 ^c	
	4	160.60 \pm 14.77 ^{ab}	149.66 \pm 14.96 ^{ab}	2.21 \pm 0.93 ^a	11.83 \pm 0.42 ^a	8.80 \pm 0.94 ^{ab}	
ส.ศ. 55	1	267.07 \pm 2.58 ^a	257.13 \pm 2.30 ^a	2.79 \pm 0.45 ^a	14.67 \pm 0.56 ^a	12.60 \pm 2.54 ^a	
	2	265.18 \pm 19.85 ^a	254.46 \pm 19.05 ^a	4.48 \pm 0.70 ^a	16.25 \pm 0.55 ^a	5.25 \pm 1.10 ^b	
	3	206.52 \pm 6.35 ^b	195.85 \pm 6.45 ^b	2.80 \pm 0.43 ^a	14.69 \pm 0.54 ^a	5.20 \pm 0.71 ^b	
	4	263.14 \pm 6.97 ^a	252.19 \pm 7.06 ^a	3.42 \pm 0.51 ^a	15.36 \pm 0.51 ^a	8.50 \pm 1.32 ^{ab}	

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวดังแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)



ภาพที่ 15 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบึกอุบในแต่ละทวีเดือน
(เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบีกอุยในแต่ละทรีเมนต์
(เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย ± ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)

ทรีเมนต์	ปัจจัยประสิทธิภาพการเติบโต					
	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)	ADG (กรัม/วัน)	SGR (%/วัน)	FCR	อัตราการ 成長 (%)
1: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับชูป 5%	137.68±29.46 ^a	170.32±26.19 ^a	2.86±0.23 ^a	14.75±0.27 ^a	9.73±1.12 ^a	ไม่ได้ ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ การเติบโต
2: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับชูป 4%	126.17±28.50 ^a	153.92±27.37 ^a	2.83±0.65 ^a	15.01±0.53 ^a	7.52±1.00 ^{ab}	
3: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับชูป 3%	99.58±22.22 ^a	118.55±21.58 ^a	2.18±0.22 ^a	13.81±0.31 ^a	6.20±0.54 ^b	
4: ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับชูป 4%	132.23±28.27 ^a	161.71±25.46 ^a	2.80±0.41 ^a	13.94±1.15 ^a	8.00±0.83 ^{ab}	
P-value	0.765	0.497	0.608	0.521	0.045	

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 2, 3 และภาพที่ 15 ประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบีกอุยที่ทำการเลี้ยงร่วมกับป้านิลในบ่อพลาสติก ทั้ง 12 บ่อ (4 ทรีเมนต์ฯ ละ 3 ตัว) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 พบว่าประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในบ่อพลาสติก ทั้ง 4 ทรีเมนต์ เริ่มนิความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ภายหลังเริ่มปล่อยปลาดุกบีกอุยในเดือนพฤษภาคม และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า

น้ำหนักเฉลี่ยของปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่าสูงสุด (137.68 ± 29.46 กรัม/ตัว) และปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่าต่ำสุด (99.58 ± 22.22 กรัม/ตัว)

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่าสูงสุด (170.32 ± 26.19 กรัม/ตัว) และปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่าต่ำสุด (118.55 ± 21.58 กรัม/ตัว)

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวัน (ADG) เฉลี่ยของปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่าสูงสุด (2.86 ± 0.23 กรัม/วัน) และปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่าต่ำสุด (2.18 ± 0.22 กรัม/วัน)

อัตราการเติบโตจำเพาะ (SGR) เฉลี่ยของปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 2 มีค่าสูงสุด ($15.01 \pm 0.53\% / \text{วัน}$) และปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่าต่ำสุด ($13.81 \pm 0.31\% / \text{วัน}$)

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) เฉลี่ยของปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่าสูงสุด (9.73 ± 1.12) และปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่าต่ำสุด (6.20 ± 0.54)


เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในแต่ละทรีเมนต์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการเติบโตของปลา尼ลแด่ละทรีเมนต์ในการทดลองชั้นที่ 1
(ค่าเฉลี่ย \pm ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

เดือน	ทรีเมนต์	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)	ADG (กรัม/วัน)	SGR (%/วัน)	FCR	อัตราอุด (%)
พ.ค. 55 (เริ่มต้น)	1	25.67 ± 0.34^a	-	-	-	-	100 ± 0.00^a
	2	28.00 ± 0.15^a	-	-	-	-	100 ± 0.00^a
	3	27.67 ± 0.10^a	-	-	-	-	100 ± 0.00^a
	4	29.00 ± 0.20^a	-	-	-	-	100 ± 0.00^a
มิ.ย. 55	1	25.63 ± 1.73^b	-0.04 ± 1.70^a	0.00 ± 0.06^a	3.54 ± 0.13^a	-	83.33 ± 12.02^a
	2	28.00 ± 0.83^b	-	-	-	-	33.33 ± 13.33^b
	3	29.63 ± 0.37^b	1.96 ± 1.52^a	0.07 ± 0.05^a	4.08 ± 0.54^a	-	93.33 ± 3.33^a
	4	37.04 ± 1.96^b	8.04 ± 2.92^a	0.27 ± 0.10^a	6.23 ± 1.72^a	-	93.33 ± 3.33^a
ก.ค. 55	1	100.00 ± 0.00	74.00 ± 0.00	2.37 ± 0.00	-	-	3.33 ± 3.33^a
	2	-	-	-	-	-	0
	3	28.57 ± 0.00	2.57 ± 0.00	-0.05 ± 0.00	-	-	23.33 ± 23.33^a
	4	30.00 ± 0.00	2.00 ± 0.00	-0.33 ± 0.00	-	-	3.33 ± 3.33^a
ส.ค. 55	1	-	-	-	-	-	0
	2	-	-	-	-	-	0
	3	30.00 ± 0.00	4.00 ± 0.00	0.05 ± 0.00	-	-	3.33 ± 3.33^a
	4	26.00 ± 0.00	-2.00 ± 0.00^a	-0.13 ± 0.00	-	-	3.33 ± 3.33^a

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)



ภาพที่ 16 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการเติบโตของป้านิลในแต่ละทรีเมนท์
(เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการเติบโตของปลา尼ลในแต่ละทรีเมนต์
(เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย \pm ค่าคาดเคลื่อนมาตรฐาน)

ทรีเมนต์	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)	ADG (กรัม/วัน)	SGR (%/วัน)	FCR	อัตราอุด (%)
1: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 5%	39.27 ± 10.66^a	18.47 ± 8.54^a	0.59 ± 0.19^a	8.88 ± 5.34^a	-	46.67 ± 13.94^a
2: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	28.00 ± 0.13^a	-	-	-	-	33.33 ± 14.21^a
3: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 3%	28.81 ± 0.67^a	2.49 ± 0.92^b	0.04 ± 0.02^b	3.12 ± 1.01^a	-	55.00 ± 13.73^a
4: ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	31.77 ± 1.75^a	4.82 ± 2.62^b	0.07 ± 0.13^b	6.23 ± 1.72^a	-	50.00 ± 14.14^a
P-value	0.746	0.029	0.049	0.358	-	0.727

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4, 5 และภาพที่ 16 ประสิทธิภาพการเติบโตของปลา尼ลที่ทำการเลี้ยงร่วมกับปลาดุกบึงอุบลในบ่อพลาสติกในแต่ละทรีเมนต์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 พบว่าประสิทธิภาพการเติบโตของปลา尼ลที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกแต่ละทรีเมนต์มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่เริ่มปล่อยบ่อปลา尼ล และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบร่วม

น้ำหนักเฉลี่ยของปลา尼ลที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่าสูงสุด (39.27 ± 10.66 กรัม/ตัว) และปลา尼ลที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 2 มีค่าต่ำสุด (28.00 ± 0.13 กรัม/ตัว)

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของปลา尼ลที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่าสูงสุด (18.47 ± 8.54 กรัม/ตัว) และปลา尼ลที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 2 มีค่าต่ำสุด (ไม่สามารถตรวจสอบได้)

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวัน (ADG) เฉลี่ยของปลา尼ลที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่าสูงสุด (0.59 ± 0.19 กรัม/วัน) และปลา尼ลที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 2 มีค่าต่ำสุด (ไม่สามารถตรวจสอบได้)

อัตราการเติบโตจำเพาะ (SGR) เฉลี่ยของปลา尼ลที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่าสูงสุด (8.88 ± 5.34 % / วัน) และปลา尼ลที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 2 มีค่าต่ำสุด (ไม่สามารถตรวจสอบได้)

อัตราอุดเฉลี่ยของปลา尼ลที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่าสูงสุด (55.00 ± 13.73 %) และปลา尼ลที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 2 มีค่าต่ำสุด (33.33 ± 14.21 %)

เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบร่วมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวันของปลา尼ลที่เลี้ยงในแต่ละทรีเมนต์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)


การทดลองชั้นที่ 2: ทำการเลี้ยงปลา尼ลร่วมกับปลาดุกน้ำกุญแจโดยปล่อยให้สามารถอาศัยและว่ายน้ำกินอาหารตามพื้นได้ทั่วบ่อ ผลการศึกษาประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกน้ำกุญแจและปลา尼ลแสดงในตารางที่ 6 - 9 และภาพที่ 17

ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกน้ำกุญแจและทรีเม็นต์ในการทดลองชั้นที่ 2
(ค่าเฉลี่ย \pm ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)

เดือน	ทรีเม็นต์	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)	ADG (กรัม/วัน)	SGR (%/วัน)	FCR	อัตราการ转化 (%)
ก.ย. 55 (เริ่นต้น)	1	$6.46 \pm 0.24^*$	-	-	-	-	
	2	$6.48 \pm 0.04^*$	-	-	-	-	
	3	$6.18 \pm 0.20^*$	-	-	-	-	
	4	$5.96 \pm 0.13^*$	-	-	-	-	
ต.ค. 55	1	$65.97 \pm 7.15^*$	$59.50 \pm 6.96^*$	$1.98 \pm 0.23^*$	$13.58 \pm 0.38^*$	$9.97 \pm 0.89^*$	ไม่ได้ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ การเติบโต
	2	$55.12 \pm 1.50^{**}$	$48.63 \pm 1.46^{**}$	$1.62 \pm 0.05^{**}$	$12.95 \pm 0.10^*$	$9.61 \pm 0.23^*$	
	3	45.12 ± 0.54^b	38.93 ± 0.43^b	1.30 ± 0.01^b	12.20 ± 0.04^b	$8.58 \pm 0.19^*$	
	4	$54.56 \pm 2.33^{**}$	$49.00 \pm 2.43^{**}$	$1.63 \pm 0.08^{**}$	$12.96 \pm 0.17^*$	$8.22 \pm 0.59^*$	
พ.ย. 55	1	$188.26 \pm 9.86^*$	$181.80 \pm 9.65^*$	$4.08 \pm 0.76^*$	$15.91 \pm 0.59^*$	$9.56 \pm 2.88^*$	
	2	$144.04 \pm 5.20^{**}$	$137.56 \pm 5.18^{**}$	$2.96 \pm 0.15^{**}$	$14.95 \pm 0.17^{**}$	$7.81 \pm 0.31^*$	
	3	119.88 ± 5.56^b	113.69 ± 5.72^b	2.49 ± 0.20^b	14.36 ± 0.26^b	$5.79 \pm 0.76^*$	
	4	$143.20 \pm 3.65^{**}$	$137.65 \pm 3.78^{**}$	$2.95 \pm 0.09^{**}$	$14.95 \pm 0.10^{**}$	$8.48 \pm 1.18^*$	
ธ.ค. 55	1	$209.26 \pm 6.33^*$	$202.80 \pm 6.23^*$	$1.05 \pm 0.96^*$	8.81 ± 5.81^b	$12.47 \pm 1.61^*$	
	2	$158.52 \pm 3.70^*$	$152.04 \pm 3.69^*$	$0.72 \pm 0.09^*$	$13.28 \pm 0.66^{**}$	$18.42 \pm 1.70^*$	
	3	$165.92 \pm 3.35^*$	$159.74 \pm 3.45^*$	$2.30 \pm 0.57^*$	$18.83 \pm 1.26^{**}$	$11.45 \pm 2.35^*$	
	4	$195.56 \pm 6.42^*$	$190.00 \pm 6.48^*$	$2.62 \pm 0.25^*$	$19.74 \pm 0.51^*$	$13.67 \pm 3.11^*$	

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)



ภาพที่ 17 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิ่วญี่ปุ่นแต่ละทรีตเมนต์ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบีกอุยในแต่ละทรีเมนต์
(เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย \pm ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)

ทรีเมนต์	ปัจจัยประสิทธิภาพการเติบโต					อัตรา (%) (%)
	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)	ADG (กรัม/วัน)	SGR (%/วัน)	FCR	
1 : มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับชูป 5%	117.49 \pm 26.83 *	148.03 \pm 25.17 *	2.37 \pm 0.57 *	12.77 \pm 1.99 *	10.66 \pm 1.09 *	ไม่ได้ ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ การเติบโต
2 : มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับชูป 4%	91.04 \pm 19.00 *	112.74 \pm 16.27 *	1.77 \pm 0.33 *	13.72 \pm 0.37 *	11.95 \pm 1.72 *	
3 : มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับชูป 3%	84.28 \pm 19.06 *	104.12 \pm 18.10 *	2.03 \pm 0.25 *	15.13 \pm 1.04 *	8.61 \pm 1.09 *	
4: ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับชูป 4%	99.72 \pm 22.41 *	125.55 \pm 20.70 *	2.40 \pm 0.21 *	15.88 \pm 1.02 *	10.12 \pm 1.32 *	
P-value	0.737	0.461	0.584	0.305	0.368	

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 6 , 7 และภาพที่ 17 ประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบีกอุย ที่ทำการเลี้ยงร่วมกับปลา尼ลในบ่อพลาสติกในแต่ละทรีเมนต์ ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 พบว่าประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกแต่ละทรีเมนต์ เริ่มนิ ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) ตั้งแต่เดือนตุลาคมภายหลังเริ่นปล่อยปลา ดุกบีกอุยในเดือนกันยายน และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า

น้ำหนักเฉลี่ยของปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่าสูงสุด (117.49 ± 26.83 กรัม/ตัว) และปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่าต่ำสุด (84.28 ± 19.06 กรัม/ตัว)

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่าสูงสุด (148.03 ± 25.17 กรัม/ตัว) และปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่าต่ำสุด (104.12 ± 18.10 กรัม/ตัว)

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวัน (ADG) เฉลี่ยของปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 4 มีค่าสูงสุด (2.40 ± 0.21 กรัม/วัน) และปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 2 มีค่าต่ำสุด (1.77 ± 0.33 กรัม/วัน)

อัตราการเติบโตจำเพาะ (SGR) เฉลี่ยของปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 4 มีค่าสูงสุด ($15.88 \pm 1.02\% / \text{วัน}$) และปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่าต่ำสุด ($12.77 \pm 1.99\% / \text{วัน}$)

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) เฉลี่ยของปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 2 มีค่าสูงสุด (11.95 ± 1.72) และปลาดุกบีกอุยที่เลี้ยงในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่าต่ำสุด (8.61 ± 1.09)

เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าประสิทธิภาพการเติบโตทุกปัจจัยของปลาดุกบึงอุยในแต่ละทรีเมนต์ ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ตารางที่ 8 ประสิทธิภาพการเติบโตของปลา尼ลแต่ละทรีเมนต์ในการทดลองชั้นที่ 2

(ค่าเฉลี่ย \pm ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)

เดือน	ทรีเมนต์	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)	ADG (กรัม/วัน)	SGR (%/วัน)	FCR	อัตราการ (%)
ก.ย. 55 (เริ่มต้น)	1	$2.00 \pm 0.00^*$	-	-	-	-	$100 \pm 0.00^*$
	2	$2.22 \pm 0.22^*$	-	-	-	-	$100 \pm 0.00^*$
	3	$2.11 \pm 0.06^*$	-	-	-	-	$100 \pm 0.00^*$
	4	$2.28 \pm 0.20^*$	-	-	-	-	$100 \pm 0.00^*$
ต.ค. 55	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	3	11.54 ± 3.13	9.46 ± 3.00	0.32 ± 0.10	$7.41 \pm 1.08^*$	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
พ.ย. 55	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
ธ.ค. 55	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการเติบโตของปลา尼ลในแต่ละทรีเมนต์
 (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย \pm ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)

ทรีเมนต์	น้ำหนักเฉลี่ย (กรัม)	น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม)	ADG (กรัม/วัน)	SGR (%/วัน)	FCR	อัตราอุด (%)
1: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 5%	$2.00 \pm 0.00^*$	-	-	-	-	-
2: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	$2.22 \pm 0.22^*$	-	-	-	-	-
3: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 3%	$5.88 \pm 2.41^*$	-	-	-	-	-
4: ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	$2.28 \pm 0.20^*$	-	-	-	-	-
P-value	0.337	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)
 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 8 และ 9 ประสิทธิภาพการเติบโตของปลา尼ลที่ทำการเลี้ยงร่วมกับปลาดุกบีกอุบในบ่อพลาสติกในแต่ละทรีเมนต์ ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 พบปลานิลที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกแต่ละทรีเมนต์ มีการขยายเกิดขึ้นภายหลังจากที่เริ่มปล่อยปลานิลในเดือนกันยายน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการเติบโตของปลา尼ล

ผลของอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปต่อการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกนิ่กอุช

จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปต่อการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกนิ่กอุชในระบบการเลี้ยงปลาดุกนิ่กอุชร่วมกับปานิชในบ่อพลาสติกแบบเหรอขูจิพอเพียง โดยทำการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ระหว่างประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกนิ่กอุชกับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่แตกต่างกัน ซึ่งการทดลองทั้ง 2 ขั้น ปรากฏผลการศึกษาดังต่อไปนี้

การทดสอบขั้นที่ 1: ทำการเลี้ยงปานิชในคอกพลาสติกขนาด 2 ตารางเมตร ที่วางในบ่อพลาสติกบ่อละ 1 คอก ผลของอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปต่อการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกนิ่กอุชแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกนิ่กอุช กับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)

Correlations								
	month	Treatment	avweightC	WeightGC	ADGC	SGRC	FCRC	
month	Pearson Correlation	1	.000	.950**	.899**	.320	.431*	.004
	Sig. (2-tailed)		1.000	.000	.000	.103	.028	.983
	N	36	36	36	27	27	26	27
Treatment	Pearson Correlation	.000	1	-.172	-.284	-.226	-.340	-.482*
	Sig. (2-tailed)	1.000		.317	.151	.256	.089	.011
	N	36	36	36	27	27	26	27
avweightC	Pearson Correlation	.950**	1	1.000**	.590**	.688**	-.005	
	Sig. (2-tailed)	.000	.317		.000	.001	.000	.981
	N	36	36	36	27	27	26	27
WeightGC	Pearson Correlation	.899**	-.284	1.000**	1	.590**	.688**	-.003
	Sig. (2-tailed)	.000	.151	.000		.001	.000	.989
	N	27	27	27	27	27	26	27
ADGC	Pearson Correlation	.320	-.226	.590**	.590**	1	.983**	-.558**
	Sig. (2-tailed)	.103	.256	.001	.001		.000	.003
	N	27	27	27	27	27	26	27
SGRC	Pearson Correlation	.431*	-.340	.688**	.688**	.983**	1	-.453*
	Sig. (2-tailed)	.028	.089	.000	.000	.000		.020
	N	26	26	26	26	26	26	26
FCRC	Pearson Correlation	.004	-.482*	-.005	-.003	-.558**	-.453*	1
	Sig. (2-tailed)	.983	.011	.981	.989	.003	.020	
	N	27	27	27	27	27	26	27

**: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*: Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกนิ่กอุชกับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 10) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 พบว่าอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ลดลงในแต่ละทรีเม็นต์มีความสัมพันธ์เชิงลบต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ($r = -0.482^*$) และมีแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงลบ

ต่อประสิทธิภาพการเติบโตปัจจัยอื่นของปลาคุกนิกอุย นอกจากนี้พบว่าระยะเวลาการเลี้ยงปลาคุกนิกอุยมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อน้ำหนักเฉลี่ย ($r = 0.950^{**}$) น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ($r = 0.899^{**}$) และอัตราการเติบโตจำเพาะ ($r = 0.431^*$)

การทดสอบข้อที่ 2: ทำการเลี้ยงปลานิลร่วมกับปลาคุกนิกอุยโดยปล่อยให้สามารถอาศัยและว่ายน้ำกินอาหารตามที่ได้ทิ้งไว้ ผลของอัตราการให้อาหารเม็ดสำาร์เจรูปต่อการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิกอุยแสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิกอุย กับอัตราการให้อาหารเม็ดสำาร์เจรูป (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)

Correlations								
	month	Treatment	avweightC	WeightGC	ADGC	SGRC	FCRC	
month	Pearson Correlation	1	.000	.919**	.830**	-.095	.078	.482*
	Sig. (2-tailed)		1.000	.000	.000	.639	.700	.011
	N	36	36	36	27	27	27	27
Treatment	Pearson Correlation	.000	1	-.183	-.298	-.117	.252	-.210
	Sig. (2-tailed)	1.000		.288	.132	.562	.205	.293
	N	36	36	36	27	27	27	27
avweightC	Pearson Correlation	.919**	-.183	1	1.000**	.301	.123	.222
	Sig. (2-tailed)	.000	.288		.000	.127	.541	.265
	N	36	36	36	27	27	27	27
WeightGC	Pearson Correlation	.830**	-.298	1.000**	1	.301	.125	.222
	Sig. (2-tailed)	.000	.132	.000		.127	.536	.266
	N	27	27	27	27	27	27	27
ADGC	Pearson Correlation	-.095	-.117	.301	.301	1	.885**	-.576**
	Sig. (2-tailed)	.639	.562	.127	.127		.000	.002
	N	27	27	27	27	27	27	27
SGRC	Pearson Correlation	.078	.252	.123	.125	.885**	1	-.260
	Sig. (2-tailed)	.700	.205	.541	.536	.000		.190
	N	27	27	27	27	27	27	27
FCRC	Pearson Correlation	.482*	-.210	.222	.222	-.576**	-.260	1
	Sig. (2-tailed)	.011	.293	.285	.286	.002	.190	
	N	27	27	27	27	27	27	27

**: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*: Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิกอุย กับอัตราการให้อาหารเม็ดสำาร์เจรูปที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 11) ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 พบว่าอัตราการให้อาหารเม็ดสำาร์เจรูปที่ลดลงในแต่ละตริมเม้นต์มีแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงลบต่อประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิกอุย นอกจากนี้พบว่าระยะเวลาการเลี้ยงปลาคุกนิกอุยมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อน้ำหนักเฉลี่ย ($r = 0.919^{**}$) น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ($r = 0.830^{**}$) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ($r = 0.482^*$)

2. คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพและเคมี

ผลการศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุบลร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกคลองระบะเวลาการทดลองทั้ง 2 ชั้น ปรากฏผลการศึกษาดังต่อไปนี้

การทดลองชั้นที่ 1: ผลการศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี แสดงในตารางที่ 12 - 15

ตารางที่ 12 คุณภาพน้ำทางกายภาพในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุบลร่วมกับปานิลแต่ละทรีเมนต์ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย \pm ค่าความแปรปรวนมาตรฐาน)

เดือน	ทรีเมนต์	Water depth (m)	Air temperature (°C)	Water temperature (°C)	Transparency (m)
พ.ค. 55 (เริ่มต้น)	1	0.60 ± 0.01^a	27.50 ± 0.00^a	27.17 ± 0.17^a	0.56 ± 0.03^a
	2	0.61 ± 0.02^a	27.50 ± 0.00^a	27.33 ± 0.17^a	0.48 ± 0.11^a
	3	0.60 ± 0.01^a	27.50 ± 0.00^a	27.33 ± 0.17^a	-
	4	0.58 ± 0.03^a	27.50 ± 0.00^a	27.17 ± 0.17^a	0.46 ± 0.01^a
มิ.ย. 55	1	0.63 ± 0.01^a	27.00 ± 0.00^a	27.50 ± 0.58^a	0.34 ± 0.01^{ab}
	2	0.62 ± 0.02^a	27.00 ± 0.00^a	28.00 ± 0.00^a	0.36 ± 0.05^{ab}
	3	0.62 ± 0.01^a	27.00 ± 0.00^a	28.00 ± 0.00^a	0.44 ± 0.03^a
	4	0.61 ± 0.02^a	27.00 ± 0.00^a	27.50 ± 0.29^a	0.32 ± 0.02^b
ก.ค. 55	1	0.62 ± 0.02^a	26.00 ± 0.00^a	26.00 ± 0.00^a	0.13 ± 0.01^b
	2	0.60 ± 0.02^a	26.00 ± 0.00^a	26.00 ± 0.00^a	0.17 ± 0.01^{ab}
	3	0.59 ± 0.01^a	26.00 ± 0.00^a	25.67 ± 0.33^a	0.20 ± 0.02^a
	4	0.57 ± 0.03^a	26.00 ± 0.00^a	25.50 ± 0.29^a	0.15 ± 0.01^{ab}
ส.ค. 55	1	0.65 ± 0.01^a	26.00 ± 0.00^a	25.00 ± 0.00^a	0.15 ± 0.01^a
	2	0.63 ± 0.01^{ab}	26.00 ± 0.00^a	25.00 ± 0.00^a	0.14 ± 0.01^{ab}
	3	0.61 ± 0.01^b	26.00 ± 0.00^a	25.00 ± 0.00^a	0.16 ± 0.01^a
	4	0.61 ± 0.02^b	26.00 ± 0.00^a	25.00 ± 0.00^a	0.11 ± 0.01^b

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำทางกายภาพในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยช่ายร่วมกับป้านิล แต่ละทรีเม็นต์ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย \pm ค่ากลางเกลือนมาตรฐาน)

ทรีเม็นต์	Water depth (m)	Air temperature (°C)	Water temperature (°C)	Transparency (m)
1 : มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 5%	$0.63 \pm 0.01^*$	$26.63 \pm 0.20^*$	$26.29 \pm 0.29^*$	$0.27 \pm 0.05^*$
2 : มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	$0.62 \pm 0.01^*$	$26.88 \pm 0.27^*$	$26.58 \pm 0.35^*$	$0.27 \pm 0.05^*$
3 : มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 3%	$0.61 \pm 0.01^*$	$27.13 \pm 0.38^*$	$26.50 \pm 0.37^*$	$0.27 \pm 0.05^*$
4: ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	$0.59 \pm 0.01^*$	$26.88 \pm 0.46^*$	$26.29 \pm 0.33^*$	$0.24 \pm 0.04^*$
P-value	0.088	0.781	0.902	0.973

หมายเหตุ: อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 12 และ 13 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทางกายภาพในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยช่ายร่วมกับป้านิล ทั้ง 12 บ่อ (4 ทรีเม็นต์ ละ 3 ชาม) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 พนว่าความไปร่องแสงของน้ำ ในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยช่ายร่วมกับป้านิล ทั้ง 4 ทรีเม็นต์ เริ่มน้ำมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) ดังเด่นที่เดือนมิถุนายน ภายหลังเริ่มปล่อยปลาดุกน้ำกุยช่ายและป้านิลในเดือนพฤษภาคม และเมื่อถึงสุดการทดลอง พบว่า

ระดับความลึกของน้ำเฉลี่ยของบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยช่ายร่วมกับป้านิล ในทรีเม็นต์ที่ 1 มีค่ามากที่สุด (0.63 ± 0.01 เมตร) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเม็นต์ที่ 4 (0.59 ± 0.01 เมตร)

อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยของบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยช่ายร่วมกับป้านิลในทรีเม็นต์ที่ 3 มีค่ามากที่สุด (27.13 ± 0.38 °C) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเม็นต์ที่ 1 (26.63 ± 0.20 °C)

อุณหภูมน้ำเฉลี่ยของบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยช่ายร่วมกับป้านิลในทรีเม็นต์ที่ 2 มีค่ามากที่สุด (26.58 ± 0.35 °C) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเม็นต์ที่ 4 (26.29 ± 0.33 °C)

ความโปร่งแสงของน้ำเฉลี่ยของบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุญแจร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 1, 2 และ 3 มีค่ามากที่สุด (0.27 ± 0.05 เมตร) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 4 (0.24 ± 0.04 เมตร)

เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าระดับความลึกของน้ำเฉลี่ย อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย อุณหภูมน้ำเฉลี่ย และความโปร่งแสงของน้ำเฉลี่ยในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุญแจร่วมกับปานิล แต่ละทรีเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

**ตารางที่ 14 คุณภาพน้ำทางเคมีในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุญแจร่วมกับปานิลแต่ละทรีเมนต์
(เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย \pm ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)**

เดือน	ทรีเมนต์	pH	TDS (mg/L)	Conductivity ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	Dissolved Oxygen (mg/L)	BOD (mg/L)
พ.ค. 55 (เริ่มต้น)	1	$7.47 \pm 0.15^{\text{a}}$	$233.33 \pm 13.33^{\text{a}}$	$463.33 \pm 28.48^{\text{a}}$	$2.82 \pm 0.12^{\text{a}}$	$10.13 \pm 0.35^{\text{a}}$
	2	$7.57 \pm 0.09^{\text{a}}$	$243.33 \pm 38.44^{\text{a}}$	$483.33 \pm 68.88^{\text{a}}$	$2.67 \pm 0.03^{\text{a}}$	$9.40 \pm 0.42^{\text{a}}$
	3	$7.57 \pm 0.19^{\text{a}}$	$263.33 \pm 54.57^{\text{a}}$	$520.00 \pm 67.39^{\text{a}}$	$2.67 \pm 0.18^{\text{a}}$	$9.07 \pm 0.35^{\text{a}}$
	4	$7.07 \pm 0.18^{\text{a}}$	$236.67 \pm 35.28^{\text{a}}$	$470.00 \pm 70.00^{\text{a}}$	$2.60 \pm 0.12^{\text{a}}$	$10.00 \pm 0.23^{\text{a}}$
มิ.ย. 55	1	$6.90 \pm 0.06^{\text{b}}$	$276.67 \pm 18.56^{\text{b}}$	$543.33 \pm 37.11^{\text{b}}$	$2.25 \pm 0.13^{\text{ab}}$	$13.66 \pm 0.85^{\text{a}}$
	2	$7.37 \pm 0.22^{\text{a}}$	$333.33 \pm 12.02^{\text{a}}$	$666.67 \pm 24.03^{\text{a}}$	$2.09 \pm 0.12^{\text{b}}$	$15.40 \pm 0.25^{\text{a}}$
	3	$7.43 \pm 0.07^{\text{a}}$	$283.33 \pm 54.57^{\text{a}}$	$566.67 \pm 49.13^{\text{a}}$	$2.44 \pm 0.25^{\text{ab}}$	$14.70 \pm 0.89^{\text{a}}$
	4	$7.60 \pm 0.15^{\text{a}}$	$320.00 \pm 25.17^{\text{a}}$	$640.00 \pm 50.33^{\text{a}}$	$2.82 \pm 0.23^{\text{a}}$	$15.07 \pm 0.53^{\text{a}}$
ก.ค. 55	1	$7.67 \pm 0.20^{\text{a}}$	$390.00 \pm 25.17^{\text{a}}$	$780.00 \pm 50.33^{\text{a}}$	$2.27 \pm 0.18^{\text{a}}$	$26.00 \pm 5.89^{\text{a}}$
	2	$7.27 \pm 0.03^{\text{a}}$	$356.67 \pm 14.53^{\text{a}}$	$713.33 \pm 29.06^{\text{a}}$	$1.67 \pm 0.18^{\text{a}}$	$22.60 \pm 1.31^{\text{a}}$
	3	$7.43 \pm 0.15^{\text{a}}$	$360.00 \pm 52.92^{\text{a}}$	$720.00 \pm 82.83^{\text{a}}$	$1.73 \pm 0.29^{\text{a}}$	$23.60 \pm 1.74^{\text{a}}$
	4	$7.23 \pm 0.03^{\text{a}}$	$410.00 \pm 32.15^{\text{a}}$	$820.00 \pm 64.29^{\text{b}}$	$2.10 \pm 0.32^{\text{a}}$	$28.60 \pm 1.11^{\text{a}}$
ส.ค. 55	1	$7.48 \pm 0.05^{\text{a}}$	$403.33 \pm 23.33^{\text{a}}$	$806.67 \pm 46.67^{\text{a}}$	$1.27 \pm 0.18^{\text{a}}$	$35.80 \pm 0.53^{\text{a}}$
	2	$7.45 \pm 0.03^{\text{a}}$	$366.67 \pm 18.56^{\text{b}}$	$733.33 \pm 37.12^{\text{a}}$	$1.07 \pm 0.03^{\text{a}}$	$34.80 \pm 0.60^{\text{ab}}$
	3	$7.45 \pm 0.09^{\text{a}}$	$370.00 \pm 52.92^{\text{a}}$	$740.00 \pm 50.83^{\text{a}}$	$1.00 \pm 0.01^{\text{a}}$	$36.20 \pm 0.40^{\text{a}}$
	4	$7.41 \pm 0.02^{\text{a}}$	$420.00 \pm 32.15^{\text{a}}$	$840.00 \pm 64.29^{\text{a}}$	$1.07 \pm 0.03^{\text{a}}$	$33.60 \pm 0.60^{\text{b}}$

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

ตารางที่ 14 (ต่อ)

เดือน	ทรีตเมนต์	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)
พ.ศ. 55 (เริ่มต้น)	1	0.092 ± 0.010 ^a	0.083 ± 0.007 ^a	0.058 ± 0.007 ^a	0.587 ± 0.150 ^a
	2	0.133 ± 0.028 ^a	0.115 ± 0.050 ^a	0.066 ± 0.043 ^a	0.664 ± 0.221 ^a
	3	0.109 ± 0.007 ^a	0.082 ± 0.022 ^a	0.046 ± 0.025 ^a	0.462 ± 0.071 ^a
	4	0.090 ± 0.012 ^a	0.110 ± 0.029 ^a	0.090 ± 0.038 ^a	0.542 ± 0.099 ^a
พ.ศ. 55	1	0.147 ± 0.022 ^a	0.101 ± 0.035 ^a	0.173 ± 0.066 ^a	6.146 ± 1.013 ^a
	2	0.605 ± 0.005 ^a	0.253 ± 0.180 ^a	0.308 ± 0.022 ^a	5.359 ± 2.315 ^a
	3	0.335 ± 0.239 ^a	0.471 ± 0.463 ^a	0.567 ± 0.115 ^a	3.071 ± 1.401 ^a
	4	0.191 ± 0.116 ^a	0.107 ± 0.014 ^a	0.138 ± 0.053 ^a	6.265 ± 0.872 ^a
ก.ค. 55	1	0.157 ± 0.020 ^a	0.104 ± 0.035 ^a	0.082 ± 0.005 ^b	6.254 ± 1.102 ^a
	2	0.613 ± 0.004 ^a	0.262 ± 0.179 ^a	0.314 ± 0.225 ^{ab}	5.386 ± 2.324 ^a
	3	0.344 ± 0.241 ^a	0.876 ± 0.465 ^a	0.998 ± 0.401 ^a	4.085 ± 1.396 ^a
	4	0.194 ± 0.117 ^a	0.107 ± 0.014 ^a	0.147 ± 0.053 ^b	6.288 ± 0.880 ^a
ส.ค. 55	1	0.398 ± 0.126 ^{ab}	0.372 ± 0.110 ^a	0.387 ± 0.172 ^b	1.990 ± 0.901 ^a
	2	0.351 ± 0.070 ^{ab}	0.261 ± 0.079 ^b	0.506 ± 0.150 ^b	2.451 ± 0.695 ^b
	3	0.232 ± 0.066 ^b	0.124 ± 0.052 ^b	1.949 ± 0.246 ^a	3.720 ± 1.453 ^a
	4	0.545 ± 0.061 ^a	0.390 ± 0.006 ^a	0.374 ± 0.020 ^b	1.993 ± 0.080 ^a

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำทางเคมีในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุบลร่วมกับป้านิลแต่ละทรีเมนต์ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย \pm ค่าคลาคเกตื่อนมาตรฐาน)

ทรีเมนต์	pH	TDS (mg/L)	Conductivity ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	Dissolved Oxygen (mg/L)	BOD (mg/L)
1: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับรูป 5%	7.38 ± 0.10^a	325.83 ± 23.60^a	648.33 ± 48.02^a	2.15 ± 0.18^a	21.40 ± 3.33^a
2: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับรูป 4%	7.41 ± 0.06^a	325.00 ± 17.73^a	649.17 ± 35.06^a	1.75 ± 0.14^a	20.55 ± 2.87^a
3: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับรูป 3%	7.47 ± 0.06^a	319.17 ± 26.87^a	636.67 ± 54.36^a	1.86 ± 0.19^a	20.89 ± 3.12^a
4: ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับรูป 4%	7.33 ± 0.08^a	346.67 ± 26.15^a	692.50 ± 52.59^a	2.15 ± 0.22^a	21.82 ± 2.92^a
P-value	0.614	0.857	0.853	0.318	0.992

หมายเหตุ: อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

ตารางที่ 15 (ต่อ)

ทรีเมนต์	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)
1: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับรูป 5%	0.183 ± 0.049^b	0.165 ± 0.044^b	0.150 ± 0.055^b	3.744 ± 0.843^a
2: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับรูป 4%	0.425 ± 0.062^a	0.222 ± 0.061^{ab}	0.298 ± 0.089^b	3.465 ± 0.938^a
3: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับรูป 3%	0.255 ± 0.079^{ab}	0.488 ± 0.182^a	0.890 ± 0.249^a	2.585 ± 0.646^a
4: ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับรูป 4%	0.255 ± 0.064^{ab}	0.179 ± 0.038^b	0.187 ± 0.038^b	3.772 ± 0.815^a
P-value	0.048	0.042	0.001	0.710

หมายเหตุ: อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 14 และ 15 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทางเคมีในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุบลร่วมกับป้านิล ทั้ง 12 บ่อ (4 ทรีเมนต์ ละ 3 ชุด) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 พบว่าคุณภาพน้ำทางเคมีบางประการในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุบลร่วมกับป้านิลทั้ง 4 ทรีเมนต์ เริ่มนิความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) ตั้งแต่เดือน

นิยม ภายนอกเริ่มปล่อยปลาคุกบิกอุยและปานิลในเดือนพฤษภาคม และเมื่อสิ้นฤดูกาลของพบว่า

ความเป็นกรด-ค่างเฉลี่ยของน้ำในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบิกอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่ามากที่สุด (7.47 ± 0.06) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 4 (7.33 ± 0.08)

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำหั้งหมดเฉลี่ยของบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบิกอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 4 มีค่ามากที่สุด (346.67 ± 26.15 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 3 (319.17 ± 26.87 mg/L)

ความนำไฟฟ้าเฉลี่ยของน้ำในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบิกอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 4 มีค่ามากที่สุด (692.50 ± 52.59 $\mu\text{s}/\text{cm}$) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 3 (636.67 ± 54.36 $\mu\text{s}/\text{cm}$)

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำเฉลี่ยของบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบิกอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่ามากที่สุด (2.15 ± 0.18 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 2 (1.75 ± 0.14 mg/L)

ปริมาณบีโอดีเฉลี่ยของน้ำในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบิกอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 4 มีค่ามากที่สุด (21.82 ± 2.92 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 2 (20.55 ± 2.87 mg/L)

ปริมาณแอนโนเมเนียในไตรเจนเฉลี่ยในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบิกอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 2 มีค่ามากที่สุด (0.425 ± 0.062 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 1 (0.183 ± 0.049 mg/L)

ปริมาณไนโตรทีนไนโตรเจนเฉลี่ยในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบิกอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่ามากที่สุด (0.488 ± 0.182 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 1 (0.165 ± 0.044 mg/L)

ปริมาณไนเตรทในไตรเจนเฉลี่ยในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบิกอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่ามากที่สุด (0.890 ± 0.249 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 1 (0.150 ± 0.055 mg/L)

ปริมาณอร์โธฟอสเฟตฟอฟอร์สเฉลี่ยในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกบิกอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 4 มีค่ามากที่สุด (3.772 ± 0.815 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในบ่อที่ 3 (2.585 ± 0.646 mg/L)

เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าปริมาณแอนโนเนียในไตรเงนเฉลี่ย ในไตรที่ 1 ในไตรเงนเฉลี่ย และในเตรอท ในไตรเงนเฉลี่ย ในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุบลร่วมกับปานิลแต่ละทรีเมนต์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$)

การทดสอบข้อที่ 2: ผลการศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี แสดงในตารางที่ 16 - 19

ตารางที่ 16 คุณภาพน้ำทางกายภาพในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุบลร่วมกับปานิลแต่ละทรีเมนต์ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย \pm ค่าคาดเคลื่อนมาตรฐาน)

เดือน	ทรีเมนต์	Water depth (m)	Air temperature (°C)	Water temperature (°C)	Transparency (m)
ก.ย. 55 (เริ่มต้น)	1	$0.58 \pm 0.01^*$	$25.00 \pm 0.00^*$	$25.00 \pm 0.00^*$	$0.24 \pm 0.02^*$
	2	$0.54 \pm 0.01^*$	$25.00 \pm 0.00^*$	$25.00 \pm 0.00^*$	$0.23 \pm 0.01^*$
	3	$0.53 \pm 0.02^*$	$25.00 \pm 0.00^*$	$25.00 \pm 0.00^*$	$0.26 \pm 0.01^*$
	4	$0.57 \pm 0.01^*$	$25.00 \pm 0.00^*$	$25.00 \pm 0.00^*$	$0.31 \pm 0.04^*$
ต.ค. 55	1	$0.52 \pm 0.02^*$	$26.00 \pm 0.00^*$	$25.00 \pm 0.00^*$	$0.16 \pm 0.01^*$
	2	$0.52 \pm 0.02^*$	$26.00 \pm 0.00^*$	$25.00 \pm 0.00^*$	$0.21 \pm 0.03^*$
	3	$0.50 \pm 0.01^*$	$26.00 \pm 0.00^*$	$25.00 \pm 0.00^*$	$0.20 \pm 0.01^*$
	4	$0.50 \pm 0.03^*$	$26.00 \pm 0.00^*$	$25.00 \pm 0.00^*$	$0.16 \pm 0.01^*$
พ.ย. 55	1	$0.52 \pm 0.01^*$	$24.00 \pm 0.00^*$	$24.00 \pm 0.00^*$	$0.10 \pm 0.01^*$
	2	$0.49 \pm 0.01^*$	$24.00 \pm 0.00^*$	$24.00 \pm 0.00^*$	$0.08 \pm 0.01^*$
	3	$0.48 \pm 0.01^*$	$24.00 \pm 0.00^*$	$24.00 \pm 0.00^*$	$0.10 \pm 0.01^*$
	4	$0.48 \pm 0.02^*$	$24.00 \pm 0.00^*$	$24.00 \pm 0.00^*$	$0.10 \pm 0.01^*$
ธ.ค. 55	1	$0.50 \pm 0.01^*$	$23.50 \pm 0.00^*$	$23.50 \pm 0.29^*$	$0.09 \pm 0.01^*$
	2	$0.47 \pm 0.01^*$	$23.50 \pm 0.00^*$	$23.17 \pm 0.17^*$	0.05 ± 0.01^b
	3	$0.47 \pm 0.01^*$	$23.50 \pm 0.00^*$	$23.83 \pm 0.17^*$	0.08 ± 0.01^{ab}
	4	$0.46 \pm 0.02^*$	$23.50 \pm 0.00^*$	$23.67 \pm 0.17^*$	0.08 ± 0.01^{ab}

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำทางกายภาพในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบีกอุยร่วมกับปานิล แต่ละทรีเม็นต์ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย \pm ค่าความเคลื่อนนาตรฐาน)

ทรีเม็นต์	Water depth (m)	Air temperature (°C)	Water temperature (°C)	Transparency (m)
1: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 5%	0.53 ± 0.01	24.63 ± 0.29	24.38 ± 0.21	0.15 ± 0.02
2: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	0.51 ± 0.01	24.63 ± 0.29	24.29 ± 0.23	0.14 ± 0.02
3: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 3%	0.49 ± 0.01	24.63 ± 0.29	24.46 ± 0.17	0.16 ± 0.02
4: ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	0.50 ± 0.02	24.63 ± 0.29	24.42 ± 0.18	0.16 ± 0.03
P-value	0.056	1.000	0.943	0.915

หมายเหตุ: อัตราที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

เนื่องพิจารณาจากตารางที่ 16 และ 17 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ ในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบีกอุยร่วมกับปานิล ทั้ง 12 บ่อ (4 ทรีเม็นต์ ๆ ละ 3 ช้า) ระหว่าง เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 พบว่าค่าความไปร่องแสงของน้ำในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบีกอุยร่วมกับปานิล ทั้ง 4 ทรีเม็นต์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) ในเดือน ธันวาคม ภายหลังเริ่มปล่อยปลาดุกบีกอุยและปานิลในเดือนกันยายน และเมื่อสิ้นฤดูกาลคงเหลือ พบว่า

ระดับความลึกของน้ำเฉลี่ยของบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบีกอุยร่วมกับปานิล ในทรีเม็นต์ที่ 1 มีค่ามากที่สุด (0.53 ± 0.01 เมตร) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเม็นต์ที่ 3 (0.49 ± 0.01 เมตร)

อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยของบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบีกอุยร่วมกับปานิลทั้ง 4 ทรีเม็นต์ มีค่าเท่ากัน คือ 24.63 ± 0.29 °C

อุณหภูมน้ำเฉลี่ยของบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบีกอุยร่วมกับปานิลในทรีเม็นต์ที่ 3 มีค่ามากที่สุด (24.46 ± 0.17 °C) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเม็นต์ที่ 2 (24.29 ± 0.23 °C)

ความไปร่องแสงของน้ำเฉลี่ยของบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบีกอุยร่วมกับปานิล ในทรีเม็นต์ที่ 4 มีค่ามากที่สุด (0.16 ± 0.03 เมตร) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเม็นต์ที่ 2 (0.14 ± 0.02 เมตร)

เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าระดับความลึกของน้ำเฉลี่ย อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย อุณหภูมน้ำ เฉลี่ยและความโปร่งแสงของน้ำเฉลี่ยในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกับปลา尼ล แต่ละทรีเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ตารางที่ 18 คุณภาพน้ำทางเคมีในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกับปลา尼ลแต่ละทรีเมนต์
(เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย \pm ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)

เดือน	ทรีเมนต์	pH	TDS (mg/L)	Conductivity ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	Dissolved Oxygen (mg/L)	BOD (mg/L)
ก.ย. 55 (เริ่มต้น)	1	$7.53 \pm 0.07^{\text{a}}$	$236.67 \pm 21.86^{\text{a}}$	$473.33 \pm 43.72^{\text{a}}$	$2.90 \pm 0.06^{\text{a}}$	$11.00 \pm 0.35^{\text{a}}$
	2	$7.57 \pm 0.03^{\text{a}}$	$233.33 \pm 33.33^{\text{a}}$	$466.67 \pm 66.67^{\text{a}}$	$2.73 \pm 0.03^{\text{a}}$	$9.87 \pm 0.52^{\text{a}}$
	3	$7.53 \pm 0.09^{\text{a}}$	$263.33 \pm 44.85^{\text{a}}$	$526.67 \pm 89.69^{\text{a}}$	$2.63 \pm 0.03^{\text{a}}$	$10.40 \pm 0.46^{\text{a}}$
	4	$7.33 \pm 0.09^{\text{a}}$	$233.33 \pm 29.06^{\text{a}}$	$466.67 \pm 58.12^{\text{a}}$	$2.63 \pm 0.03^{\text{a}}$	$10.00 \pm 0.12^{\text{a}}$
ต.ค. 55	1	$7.83 \pm 0.09^{\text{a}}$	$256.67 \pm 21.86^{\text{a}}$	$513.33 \pm 43.72^{\text{a}}$	$1.97 \pm 0.09^{\text{ab}}$	$16.00 \pm 0.72^{\text{a}}$
	2	$7.83 \pm 0.09^{\text{a}}$	$260.00 \pm 30.55^{\text{a}}$	$520.00 \pm 61.10^{\text{a}}$	$2.13 \pm 0.03^{\text{a}}$	$15.50 \pm 0.20^{\text{a}}$
	3	$7.63 \pm 0.09^{\text{a}}$	$286.67 \pm 37.12^{\text{a}}$	$573.33 \pm 74.24^{\text{a}}$	$2.00 \pm 0.01^{\text{a}}$	$16.40 \pm 0.10^{\text{a}}$
	4	$7.83 \pm 0.03^{\text{a}}$	$280.00 \pm 25.77^{\text{a}}$	$560.00 \pm 11.55^{\text{a}}$	$1.80 \pm 0.06^{\text{b}}$	$15.40 \pm 0.44^{\text{a}}$
พ.ย. 55	1	$7.22 \pm 0.13^{\text{a}}$	$336.67 \pm 26.63^{\text{a}}$	$673.33 \pm 59.26^{\text{a}}$	$1.13 \pm 0.13^{\text{b}}$	$57.67 \pm 0.33^{\text{a}}$
	2	$7.09 \pm 0.06^{\text{a}}$	$320.00 \pm 20.82^{\text{a}}$	$640.00 \pm 41.63^{\text{a}}$	$1.10 \pm 0.06^{\text{b}}$	$57.33 \pm 2.96^{\text{a}}$
	3	$7.10 \pm 0.06^{\text{a}}$	$333.33 \pm 33.83^{\text{a}}$	$666.67 \pm 67.66^{\text{a}}$	$1.80 \pm 0.31^{\text{a}}$	$59.33 \pm 1.33^{\text{a}}$
	4	$7.00 \pm 0.03^{\text{a}}$	$360.00 \pm 20.82^{\text{a}}$	$720.00 \pm 41.63^{\text{a}}$	$1.03 \pm 0.03^{\text{b}}$	$55.00 \pm 2.08^{\text{a}}$
ธ.ค. 55	1	$7.27 \pm 0.09^{\text{a}}$	$336.67 \pm 33.83^{\text{a}}$	$733.33 \pm 67.66^{\text{a}}$	$1.07 \pm 0.09^{\text{b}}$	$77.00 \pm 1.32^{\text{a}}$
	2	$7.05 \pm 0.08^{\text{a}}$	$376.67 \pm 14.53^{\text{a}}$	$753.33 \pm 29.06^{\text{a}}$	$1.00 \pm 0.09^{\text{b}}$	$78.00 \pm 0.87^{\text{a}}$
	3	$7.37 \pm 0.23^{\text{a}}$	$416.67 \pm 17.64^{\text{a}}$	$833.33 \pm 35.28^{\text{a}}$	$1.30 \pm 0.06^{\text{a}}$	$76.50 \pm 1.73^{\text{a}}$
	4	$7.10 \pm 0.06^{\text{a}}$	$410.00 \pm 20.82^{\text{a}}$	$820.00 \pm 41.63^{\text{a}}$	$1.01 \pm 0.03^{\text{b}}$	$76.50 \pm 0.87^{\text{a}}$

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โคลวาร์ส Duncan Multiple Range Test (DMRT)

ตารางที่ 18 (ต่อ)

เดือน	ทรีตเม้นต์	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)
ก.ย. 55 (เริ่มคืน)	1	0.110 ± 0.009 ^a	0.086 ± 0.005 ^a	0.053 ± 0.005 ^a	0.574 ± 0.154 ^a
	2	0.117 ± 0.033 ^a	0.112 ± 0.050 ^a	0.078 ± 0.039 ^a	0.616 ± 0.223 ^a
	3	0.103 ± 0.007 ^a	0.081 ± 0.019 ^a	0.054 ± 0.015 ^a	0.442 ± 0.056 ^a
	4	0.092 ± 0.012 ^a	0.098 ± 0.026 ^a	0.054 ± 0.009 ^a	0.349 ± 0.116 ^a
ต.ค. 55	1	0.057 ± 0.002 ^a	0.118 ± 0.035 ^a	0.104 ± 0.016 ^b	4.499 ± 0.956 ^a
	2	0.053 ± 0.020 ^a	0.127 ± 0.060 ^a	0.264 ± 0.046 ^{ab}	2.352 ± 1.031 ^a
	3	0.082 ± 0.028 ^a	0.119 ± 0.022 ^a	0.638 ± 0.258 ^a	2.521 ± 0.889 ^a
	4	0.059 ± 0.004 ^a	0.148 ± 0.024 ^a	0.089 ± 0.030 ^b	4.447 ± 1.581 ^a
พ.ย. 55	1	0.130 ± 0.014 ^b	0.565 ± 0.126 ^a	0.631 ± 0.153 ^a	5.004 ± 0.156 ^a
	2	0.092 ± 0.037 ^{ab}	0.341 ± 0.130 ^a	0.443 ± 0.101 ^a	5.922 ± 1.923 ^a
	3	0.090 ± 0.020 ^{ab}	0.385 ± 0.103 ^a	0.508 ± 0.133 ^a	5.119 ± 1.664 ^a
	4	0.177 ± 0.012 ^a	0.619 ± 0.103 ^a	0.684 ± 0.113 ^a	6.811 ± 0.291 ^a
ธ.ค. 55	1	0.139 ± 0.011 ^a	0.594 ± 0.133 ^a	0.624 ± 0.164 ^a	5.254 ± 0.088 ^a
	2	0.329 ± 0.168 ^a	0.368 ± 0.120 ^a	0.433 ± 0.102 ^a	6.307 ± 1.973 ^a
	3	0.123 ± 0.031 ^a	0.397 ± 0.102 ^a	0.506 ± 0.128 ^a	5.293 ± 1.664 ^a
	4	0.193 ± 0.011 ^a	0.632 ± 0.103 ^a	0.676 ± 0.110 ^a	7.139 ± 0.359 ^a

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำทางเคมีในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยช่ายร่วมกับปานิลแต่ละทรีเมนต์ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย \pm ค่าคาดเดือนมาตรฐาน)

ทรีเมนต์	pH	TDS (mg/L)	Conductivity ($\mu\text{s}/\text{cm}$)	Dissolved Oxygen (mg/L)	BOD (mg/L)
1: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 5%	$7.46 \pm 0.08^*$	$299.17 \pm 20.02^*$	$598.33 \pm 40.04^*$	$1.77 \pm 0.23^*$	$40.42 \pm 8.40^*$
2: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	$7.39 \pm 0.10^*$	$297.50 \pm 20.04^*$	$595.00 \pm 40.09^*$	$1.66 \pm 0.19^*$	$40.18 \pm 8.62^*$
3: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 3%	$7.41 \pm 0.08^*$	$325.00 \pm 23.08^*$	$650.00 \pm 46.16^*$	$1.86 \pm 0.13^*$	$40.41 \pm 8.54^*$
4: ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	$7.31 \pm 0.10^*$	$320.83 \pm 22.51^*$	$641.67 \pm 45.02^*$	$1.61 \pm 0.20^*$	$39.23 \pm 8.35^*$
P-value	0.710	0.722	0.722	0.798	1.000

หมายเหตุ: อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

ตารางที่ 19 (ต่อ)

ทรีเมนต์	NH ₃ -N (mg/L)	NO ₂ -N (mg/L)	NO ₃ -N (mg/L)	PO ₄ -P (mg/L)
1: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 5%	$0.092 \pm 0.014^*$	$0.341 \pm 0.082^*$	$0.353 \pm 0.096^*$	$3.833 \pm 0.610^*$
2: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	$0.153 \pm 0.049^*$	$0.237 \pm 0.055^*$	$0.305 \pm 0.056^*$	$3.800 \pm 0.959^*$
3: มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 3%	$0.100 \pm 0.011^*$	$0.245 \pm 0.054^*$	$0.427 \pm 0.095^*$	$3.344 \pm 0.808^*$
4: ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	$0.128 \pm 0.018^*$	$0.374 \pm 0.082^*$	$0.376 \pm 0.098^*$	$4.687 \pm 0.890^*$
P-value	0.398	0.417	0.802	0.712

หมายเหตุ: อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 18 และ 19 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทางเคมีในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยช่ายร่วมกับปานิลทั้ง 12 บ่อ (4 ทรีเมนต์ ละ 3 ชุด) ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 พบว่าคุณภาพน้ำทางเคมีบางประการในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยช่ายร่วมกับปานิลทั้ง 4 ทรีเมนต์ เริ่มน้ำมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ภายหลังเริ่มปล่อยปลาดุกน้ำกุยช่ายและปานิลในเดือนกันยายน และเมื่อสิ้นฤดูกาลทดสอบพบว่า

ความเป็นกรด-ค่างเฉลี่ยของน้ำในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่ามากที่สุด (7.46 ± 0.08) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 4 (7.31 ± 0.10)

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมดเฉลี่ยของบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่ามากที่สุด (325.00 ± 23.08 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 2 (297.50 ± 20.04 mg/L)

ความนำไฟฟ้าเฉลี่ยของน้ำในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่ามากที่สุด (650.00 ± 46.16 $\mu\text{s}/\text{cm}$) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 2 (595.00 ± 40.09 $\mu\text{s}/\text{cm}$)

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำเฉลี่ยของบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่ามากที่สุด (1.86 ± 0.13 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 4 (1.61 ± 0.20 mg/L)

ปริมาณบีโอดีเฉลี่ยของน้ำในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 1 มีค่ามากที่สุด (40.42 ± 8.40 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 4 (39.23 ± 8.35 mg/L)

ปริมาณแอนโนเนชันในไครเรนเฉลี่ยในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 2 มีค่ามากที่สุด (0.153 ± 0.049 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 1 (0.092 ± 0.014 mg/L)

ปริมาณไนไตรท์ในไครเรนเฉลี่ยในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 4 มีค่ามากที่สุด (0.374 ± 0.082 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 2 (0.237 ± 0.055 mg/L)

ปริมาณไนเตรทในไครเรนเฉลี่ยในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 3 มีค่ามากที่สุด (0.427 ± 0.095 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในทรีเมนต์ที่ 2 (0.305 ± 0.056 mg/L)

ปริมาณօอร์โพรอสเฟตฟอสฟอรัสเฉลี่ยในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 4 มีค่ามากที่สุด (4.687 ± 0.890 mg/L) และมีค่าน้อยที่สุดในบ่อที่ 3 (3.344 ± 0.808 mg/L)

เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบร่วมกันความเป็นกรด-ค่างเฉลี่ย ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมดเฉลี่ย ความนำไฟฟ้าเฉลี่ย ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำเฉลี่ย ปริมาณบีโอดีเฉลี่ย ปริมาณแอนโนเนชันในไครเรนเฉลี่ย ในไตรท์ในไครเรนเฉลี่ย ในไเตรทในไครเรนเฉลี่ย และօอร์โพรอสเฟตฟอสฟอรัสเฉลี่ยในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยร่วมกับปานิลแต่ละทรีเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ผลของอัตราการให้อาหารเม็ดสำาร์เจรูปต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยคุณภาพน้ำในบ่อพลาสติก

จากการศึกษาผลของอัตราการให้อาหารเม็ดสำาร์เจรูปต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยคุณภาพน้ำในบ่อพลาสติกซึ่งเลี้ยงปลาดุกบึงอุบลร่วมกับปลานิลแบบเหรอๆ กิจพอดเพียง โดยทำการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับอัตราการให้อาหารเม็ดสำาร์เจรูปที่แตกต่างกัน ซึ่งการทดลองทั้ง 2 ชั้น ปรากฏผลการศึกษาดังต่อไปนี้

การทดลองชั้นที่ 1: ทำการเลี้ยงปลานิลในคอกพลาสติกขนาด 2 ตารางเมตร ที่วางในบ่อพลาสติกบ่อละ 1 คอก ผลของอัตราการให้อาหารเม็ดสำาร์เจรูปต่อการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบึงอุบลแสดงในตารางที่ 20

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำทางกายภาพและเกณฑ์กับอัตราการให้อาหารเม็ดสำาร์เจรูปที่แตกต่างกัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 พบว่า อัตราการให้อาหารเม็ดสำาร์เจรูปที่ลดลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปริมาณในteredที่ในไตรเงน ($r = 0.496^{**}$) ขณะที่อัตราการให้อาหารเม็ดสำาร์เจรูปที่เพิ่มขึ้นนี้แนวโน้มความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ความนำไฟฟ้า มีโอดี และออร์โซฟอสเฟตฟอสฟอรัส นอกจากนี้พบว่าระยะเวลาการเลี้ยงปลาดุกบึงอุบลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ($r = 0.689^{**}$) ความนำไฟฟ้า ($r = 0.694^{**}$) มีโอดี ($r = 0.949^{**}$) และโมเนี่ยในไตรเงน ($r = 0.338^*$) และในteredที่ในไตรเงน ($r = 0.518^{**}$) และพบว่าระยะเวลาการเลี้ยงปลาดุกบึงอุบลมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความโปร่งแสงของน้ำ ($r = -0.888^{**}$) และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ($r = -0.805^{**}$)

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยคุณภาพน้ำดังกล่าวพบว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบึงอุบลที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยง (ตารางที่ 10 และ 21) คือ ช่วงระยะเวลาที่น้ำหนักเฉลี่ยของปลาดุกบึงอุบลเพิ่มขึ้นนั้น พบว่าอุณหภูมิอากาศ ($r = -0.651^{**}$) อุณหภูมน้ำ ($r = -0.821^{**}$) ความโปร่งแสงของน้ำ ($r = -0.852^{**}$) และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ($r = -0.761^{**}$) มีค่าลดลง ความลำดับ ขณะที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ($r = 0.708^{**}$) ความนำไฟฟ้า ($r = 0.712^{**}$) มีโอดี ($r = 0.923^{**}$) และโมเนี่ยในไตรเงน ($r = 0.396^{**}$) และในteredที่ในไตรเงน ($r = 0.325^*$) มีค่าเพิ่มขึ้น

สำหรับช่วงระยะเวลาที่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของปลาดุกบึงอุบลเพิ่มขึ้นนั้น พบว่าอุณหภูมิอากาศ ($r = -0.640^{**}$) อุณหภูมน้ำ ($r = -0.823^{**}$) ความโปร่งแสงของน้ำ ($r = -0.782^{**}$) ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ($r = -0.740^{**}$) และออร์โซฟอสเฟตฟอสฟอรัส ($r = -0.389^*$) มีค่าลดลง

ดัชนีการติดเชื้อในน้ำเสียที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา (ร = 0.543**) และดัชนีการติดเชื้อในน้ำเสียที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา (ร = 0.544**)

๑๖

ตารางที่ 20 สัมประสิทธิ์ทางสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)

Correlations																
	month	Treatment	Depth	Airtemp	Watertemp	Trans	pH	TDS	EC	DO	BOD	NH3	NO2	NO3	PO4	
month	Pearson Correlation	1	.000	.279	-.740**	-.845**	-.888**	.004	.069	.094*	-.805*	.849**	.398*	.134	.518**	.263
	Sig. (2-tailed)		1.000	.100	.000	.000	.000	.982	.000	.000	.000	.000	.044	.436	.001	.120
	N	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Treatment	Pearson Correlation	.000	1	-.310	.208	.076	-.014	.146	-.036	-.031	.200	-.020	.123	.328	.406**	-.172
	Sig. (2-tailed)		1.000	.061	.224	.885	.839	.306	.837	.856	.243	.808	.474	.051	.002	.317
	N	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Depth	Pearson Correlation	.279	-.310	1	-.049	-.124	.030	-.066	.202	.264	.049	.301	-.028	-.012	-.013	.147
	Sig. (2-tailed)		.100	.061	.776	.471	.872	.581	.123	.136	.777	.076	.872	.947	.939	.393
	N	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Airtemp	Pearson Correlation	-.740**	.208	-.049	1	.890**	.820**	-.029	-.546**	-.546**	.638**	-.727**	-.090	.121	.285	-.173
	Sig. (2-tailed)		.000	.224	.776	.000	.000	.988	.001	.001	.000	.000	.802	.482	.092	.312
	N	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Watertemp	Pearson Correlation	-.846**	.075	-.124	.890**	1	.808**	-.086	.510**	-.514**	.757**	-.839**	.003	.010	.451**	-.059
	Sig. (2-tailed)		.000	.885	.471	.000	.000	.818	.001	.001	.000	.000	.716	.952	.006	.737
	N	36	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36
Trans	Pearson Correlation	-.888**	-.014	.030	.820**	.808**	1	-.173	-.878**	-.890**	.890**	-.810**	-.296	-.005	-.268	-.205
	Sig. (2-tailed)		.000	.839	.872	.000	.000	.362	.000	.000	.000	.000	.201	.977	.181	.149
	N	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
pH	Pearson Correlation	.004	.195	-.096	-.029	-.086	-.173	1	.071	.003	-.004	.168	-.085	-.127	.046	-.184
	Sig. (2-tailed)		.982	.398	.581	.866	.618	.362	.663	.714	.710	.327	.620	.401	.794	.283
	N	36	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36
TDS	Pearson Correlation	.586**	-.036	.262	-.546**	-.610**	-.679**	-.071	1	.090**	-.404*	.854**	.269	.275	.162	.252
	Sig. (2-tailed)		.000	.837	.123	.001	.001	.000	.683	.000	.014	.000	.112	.105	.378	.139
	N	36	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36
EC	Pearson Correlation	.594**	-.031	.264	-.546**	-.614**	-.690**	-.083	.099**	1	-.400*	.860**	.277	.278	.168	.262
	Sig. (2-tailed)		.000	.856	.136	.001	.001	.000	.714	.000	.013	.000	.102	.100	.366	.138
	N	36	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36
DO	Pearson Correlation	-.808**	-.200	-.049	.638**	.757**	.690**	-.064	-.404*	-.404*	1	-.780**	.382*	.100	-.803**	-.132
	Sig. (2-tailed)		.000	.243	.777	.000	.000	.710	.014	.013	.000	.000	.021	.551	.000	.444
	N	36	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36
BOD	Pearson Correlation	.949**	-.020	.301	-.727**	-.839**	-.818**	.168	.854**	.860**	-.780**	1	.276	.047	.520**	.211
	Sig. (2-tailed)		.000	.908	.076	.000	.000	.327	.000	.000	.000	.000	.103	.780	.001	.218
	N	36	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36
NH3	Pearson Correlation	.398*	.123	-.028	-.090	-.083	-.236	-.086	.269	.277	-.392*	.276	1	-.043	.085	.421*
	Sig. (2-tailed)		.044	.474	.872	.002	.715	.201	.620	.112	.102	.021	.103	.806	.821	.011
	N	36	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36
NO2	Pearson Correlation	.134	.328	-.012	.121	.010	-.006	-.127	.275	.278	.100	.047	-.043	1	.087	-.305
	Sig. (2-tailed)		.436	.051	.947	.462	.952	.977	.901	.105	.100	.661	.780	.806	.814	.070
	N	36	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36
NO3	Pearson Correlation	.518**	.406**	-.013	-.285	-.451**	-.269	.045	.162	.168	-.603**	.520**	.095	.087	1	.021
	Sig. (2-tailed)		.001	.002	.939	.092	.006	.161	.794	.376	.356	.000	.001	.621	.514	.903
	N	36	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36
PO4	Pearson Correlation	.283	-.172	.147	-.173	-.068	-.266	-.194	.262	.262	-.132	.211	.421*	-.305	.021	1
	Sig. (2-tailed)		.120	.317	.393	.312	.737	.149	.283	.138	.444	.218	.011	.070	.903	
	N	36	36	36	36	36	36	31	36	36	36	36	36	36	36	36

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ตารางที่ 21 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับประสิทธิภาพการเติบโตของป่าดุกน้ำขุ่น (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)

Correlations																			
	aveweightC	WeightGC	ADGC	SGRC	FCRC	Depth	Airtemp	Watertemp	Trans	pH	TDS	EC	DO	BOD	NH3	NO2	NO3	PO4	
aveweightC	Pearson Correlation	1	.000**	.663**	.420*	.011	.226	-.061**	-.821**	.123	.708**	.712**	.761**	.923**	.398**	.114	.326**	.204	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.010	.060	.124	.000	.000	.404	.000	.000	.000	.000	.006	.440	.024	.164	
	N	46	36	36	35	36	46	46	42	46	46	46	46	46	46	46	46	46	
WeightGC	Pearson Correlation	.000**	1	.650**	.430**	.012	.119	-.840**	-.823**	.782**	.208	.542**	.544**	.740**	.861**	.096	-.118	.127	-.369**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.010	.044	.490	.000	.000	.114	.001	.001	.000	.000	.681	.500	.400	.019	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
ADGC	Pearson Correlation	.663**	.583**	1	.046**	-.608**	.160	-.106	-.241	.206	.164	.160	.149	.242	-.063	.000	.026	-.184	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.360	.037	.168	.228	.282	.283	.387	.112	.166	.028	.883	.284	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
SGRC	Pearson Correlation	.420*	.430**	.648**	1	-.400**	.330	-.016	-.113	.132	.174	.160	.165	.303**	.162	-.048	-.076	.013	-.076
	Sig. (2-tailed)		.010	.010	.000	.002	.053	.033	.517	.450	.216	.270	.376	.032	.295	.782	.066	.042	.886
	N	36	35	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	35	36	36	36	
FCRC	Pearson Correlation	.011	.012	-.688**	-.400**	1	.083	-.132	-.041	-.106	-.123	.040	.040	-.016	.089	.141	-.129	.201	.023
	Sig. (2-tailed)		.060	.044	.000	.002	.717	.443	.912	.538	.476	.816	.816	.928	.005	.413	.458	.086	.895
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
Depth	Pearson Correlation	.226	.110	.160	.339	.063	1	.062	.033	.046	.041	.272	.266	-.103	.182	-.003	.030	.066	.001
	Sig. (2-tailed)		.124	.490	.360	.063	.717	.680	.828	.778	.781	.082	.087	.487	.210	.981	.784	.712	.881
	N	46	36	36	36	36	46	46	46	42	46	46	46	46	46	46	46	46	
Airtemp	Pearson Correlation	-.061**	-.040**	-.100	-.016	-.132	.082	1	.865**	.758**	.901	-.560**	-.560**	.018**	-.719**	-.140	.060	-.232	-.110
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.037	.033	.443	.590	.000	.000	.540	.000	.000	.000	.311	.734	.113	.467	
	N	46	36	36	36	36	36	46	46	42	46	46	46	46	46	46	46	46	
Watertemp	Pearson Correlation	-.821**	-.823**	-.241	-.113	-.041	.033	.866**	1	.820**	.136	.537**	.540**	.730**	.853**	-.203	.042	-.405**	-.036
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.168	.517	.812	.828	.000	.000	.798	.000	.000	.000	.166	.770	.004	.815	
	N	46	36	36	36	36	36	46	46	42	46	46	46	46	46	46	46	46	
Trans	Pearson Correlation	-.862**	-.782**	-.206	-.132	-.106	.045	.768	.820**	1	.138	-.710**	-.727**	.057**	-.848**	-.314*	-.046	.226	-.247
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.228	.468	.638	.770	.000	.000	.382	.000	.000	.000	.043	.774	.194	.116	
	N	42	36	36	36	36	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
pH	Pearson Correlation	.123	.269	.184	.174	-.123	.041	.091	-.038	-.138	1	-.039	-.031	-.061	.165	.014	-.076	.076	-.067
	Sig. (2-tailed)		.404	.114	.282	.318	.478	.781	.540	.708	.382	.705	.832	.881	.264	.027	.813	.814	.880
	N	46	36	36	36	36	36	46	46	42	46	46	46	46	46	46	46	46	
TDS	Pearson Correlation	.708**	.543***	.160	.158	.048	.272	-.550**	-.537**	.719**	-.030	1	1.000**	-.447**	.597**	.288*	.246	.132	.286*
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.383	.370	.816	.062	.000	.000	.705	.000	.001	.000	.047	.002	.373	.046	
	N	46	36	36	36	36	36	46	46	42	46	46	46	46	46	46	46	46	
EC	Pearson Correlation	.712**	.544**	.140	.165	.040	.268	-.550**	-.540**	.727**	-.031	1.000**	1	-.440**	.701**	.294*	.248	.136	.280*
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.387	.375	.818	.087	.000	.000	.532	.000	.001	.000	.043	.000	.398	.046	
	N	46	36	36	36	36	36	46	46	42	46	46	46	46	46	46	46	46	
DO	Pearson Correlation	-.761**	-.740**	-.269	-.303*	-.016	-.103	.616**	.739**	.857**	-.001	-.447**	-.440**	1	-.770**	.401**	-.024	-.559**	-.026
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.112	.032	.828	.487	.000	.000	.081	.001	.001	.000	.002	.869	.000	.882	
	N	46	36	36	36	36	36	46	46	42	46	46	46	46	46	46	46	46	
BOD	Pearson Correlation	.923**	.861**	.242	.182	.089	.182	-.710**	-.863**	.848**	.165	.007**	.701**	-.770**	1	.360*	.091	.476**	.204
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.165	.295	.806	.216	.000	.000	.284	.000	.000	.000	.015	.537	.001	.164	
	N	46	36	36	36	36	36	46	46	42	46	46	46	46	46	46	46	46	
NH3	Pearson Correlation	.398**	.095	-.083	-.046	.141	-.003	-.140	-.203	-.314*	.014	.288*	.294*	-.431**	.350*	1	.036	.119	.269
	Sig. (2-tailed)		.005	.581	.026	.762	.413	.981	.311	.168	.043	.027	.043	.002	.015	.807	.424	.075	
	N	46	36	36	36	36	36	46	46	42	46	46	46	46	46	46	46	46	
NO2	Pearson Correlation	.114	-.116	-.090	-.075	-.120	.039	.060	-.042	-.046	-.075	.246	.246	-.024	.091	.936	1	.129	-.301*
	Sig. (2-tailed)		.440	.500	.505	.008	.468	.794	.734	.779	.774	.013	.092	.089	.037	.897	.384	.038	
	N	46	36	36	36	36	36	46	46	42	46	46	46	46	46	46	46	46	
NO3	Pearson Correlation	.326*	.127	-.025	.013	-.201	.055	-.232	-.405**	-.235	.076	.132	.130	-.059**	.470**	.118	.120	1	-.001
	Sig. (2-tailed)		.024	.400	.883	.042	.096	.712	.113	.004	.134	.014	.073	.066	.001	.424	.394	.003	
	N	46	36	36	36	36	36	46	46	42	46	46	46	46	46	46	46	46	
PO4	Pearson Correlation	.204	-.389*	-.194	-.076	.023	.061	-.110	-.035	-.247	-.067	.289*	.290*	-.028	.204	.259	-.301*	-.001	1
	Sig. (2-tailed)		.104	.019	.284	.085	.896	.881	.467	.815	.115	.060	.046	.052	.164	.075	.039	.003	
	N	46	36	36	36	36	36	46	46	42	46	46	46	46	46	46	46	46	

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ตารางที่ 22 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับประสิทธิภาพการเติบโตของปลา尼ล (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)

Correlations

	sweight0	Weight GO	ADGO	SGRO	Survival0	Depth	Atemp	Watertemp	Trans	pH	TDS	EC	DO	BOD	NH3	NO2	NO3	PO4		
sweight0	Pearson Correlation	1	.994**	.980**	.992**	-.427*	.006	-.153	-.172	.326	.064	.182	.195	-.058	.026	-.066	-.085	.243		
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.003	.028	.906	.446	.381	.150	.768	.064	.052	.774	.000	.783	.073	.708	.221	
	N	27	16	15	8	27	27	27	21	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
Weight GO	Pearson Correlation	.994**	1	.980**	.987**	-.066	-.137	-.103	-.163	-.206	.101	.114	.119	.010	-.172	-.257	-.165	-.130	.067	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.003	.179	.027	.402	.587	.294	.722	.086	.075	.071	.539	.366	.567	.622	.012	
	N	16	16	16	8	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
ADGO	Pearson Correlation	.980**	.986**	1	.000**	-.256	-.160	-.072	-.067	-.188	.113	.006	.008	.088	-.269	-.222	-.164	-.133	.066	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.369	.603	.798	.811	.601	.866	.087	.078	.764	.332	.426	.560	.630	.010	
	N	15	15	15	8	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
SGRO	Pearson Correlation	.992**	.987**	.000**	1	-.262	.126	-.181	-.042	-.341	.095	.121	.125	.194	-.451	-.362	-.188	-.623	.166	
	Sig. (2-tailed)		.003	.003	.002	.631	.700	.068	.921	.409	.824	.776	.787	.046	.262	.378	.056	.183	.714	
	N	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Survival0	Pearson Correlation	-.427*	-.306	-.206	-.262	1	-.047	.707**	.772**	.863***	-.133	-.060***	-.005***	.731**	-.840**	-.470**	.020	-.301**	-.380***	
	Sig. (2-tailed)		.026	.179	.268	.531	.750	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.005	.012	.007	
	N	27	16	15	8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
Depth	Pearson Correlation	.009	-.137	-.160	.126	-.047	1	.092	.033	.046	.041	.272	.268	-.183	.182	-.003	.039	.066	.061	
	Sig. (2-tailed)		.006	.027	.003	.700	.750	.580	.820	.770	.781	.002	.007	.487	.210	.081	.704	.712	.001	
	N	27	16	15	8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
Atemp	Pearson Correlation	-.153	-.193	-.072	-.181	.707**	1	.062	1	.865***	.768***	.001	-.560***	-.550***	.018**	-.710**	-.140	.050	-.232	-.110
	Sig. (2-tailed)		.445	.482	.708	.068	.000	.580	.000	.000	.000	.540	.000	.000	.000	.311	.734	.113	.467	
	N	27	15	15	8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
Watertemp	Pearson Correlation	-.172	-.153	-.007	-.042	.772**	-.033	.855***	1	.820***	-.038	-.537***	-.540***	.738**	-.853***	-.203	-.042	-.405**	-.036	
	Sig. (2-tailed)		.391	.507	.911	.021	.000	.820	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.166	.779	.004	.916	
	N	27	16	15	8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
Trans	Pearson Correlation	.326	-.206	-.166	-.341	.853**	.046	.756**	.820***	1	-.136	-.719**	-.727**	.057**	-.046***	-.314*	-.046	-.236	-.247	
	Sig. (2-tailed)		.160	.264	.001	.468	.000	.776	.000	.000	.000	.362	.000	.000	.000	.043	.774	.134	.116	
	N	21	15	15	8	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42		
pH	Pearson Correlation	.064	.101	.113	-.005	-.133	.041	.091	-.038	-.138	1	-.039	-.031	-.061	.185	.014	-.076	.076	-.087	
	Sig. (2-tailed)		.798	.722	.088	.024	.380	.781	.540	.706	.392	.705	.932	.081	.284	.027	.813	.614	.060	
	N	27	16	15	8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
TDS	Pearson Correlation	.192	.114	.005	.121	-.060**	.272	-.560***	-.537***	-.710**	-.030	1	1.000***	-.447**	.097**	.288**	.246	.132	.280**	
	Sig. (2-tailed)		.364	.086	.987	.776	.000	.002	.000	.000	.000	.705	.001	.000	.047	.002	.373	.046		
	N	27	16	15	8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
EC	Pearson Correlation	.186	.118	.008	.126	-.005**	.206	-.550***	-.540***	-.727***	-.031	1.000***	1	-.440***	.701**	.204**	.246	.136	.280**	
	Sig. (2-tailed)		.352	.076	.978	.787	.000	.067	.000	.000	.000	.032	.000	.001	.043	.000	.358	.046		
	N	27	16	15	8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
DO	Pearson Correlation	-.068	.010	.088	.194	.731**	-.103	.018**	.730**	.067**	-.061	-.447**	-.440**	1	-.770**	-.431**	-.024	-.550**	-.029	
	Sig. (2-tailed)		.774	.971	.754	.046	.000	.467	.000	.000	.000	.061	.001	.001	.000	.002	.800	.000	.852	
	N	27	16	15	8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
BOD	Pearson Correlation	.020	-.172	-.209	-.461	.840**	.182	-.718**	-.863**	-.848**	.105	.007**	.701**	-.770**	1	.360**	.091	.470**	.204	
	Sig. (2-tailed)		.899	.630	.332	.262	.000	.210	.000	.000	.204	.700	.000	.000	.015	.537	.001	.164		
	N	27	16	15	8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
NH3	Pearson Correlation	-.066	-.267	-.222	-.362	.470**	-.003	-.140	-.203	-.314*	.014	.268*	.294*	-.431**	.350*	1	.036	.118	.250	
	Sig. (2-tailed)		.793	.356	.426	.378	.001	.081	.311	.166	.043	.927	.047	.043	.002	.015	.907	.424	.075	
	N	27	16	15	8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
NO2	Pearson Correlation	-.065	-.166	-.164	-.166	.020	.030	.050	-.042	-.046	-.075	.246	.246	-.024	.091	.036	1	.120	-.301*	
	Sig. (2-tailed)		.873	.857	.859	.066	.895	.794	.734	.779	.774	.013	.082	.086	.537	.807	.384	.038		
	N	27	15	15	8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
NO3	Pearson Correlation	-.054	-.130	-.132	-.023	.301*	.066	-.232	-.405**	-.235	.076	.132	.130	-.550**	.470**	118	.120	1	-.001	
	Sig. (2-tailed)		.798	.822	.830	.163	.012	.712	.113	.004	.014	.073	.056	.000	.001	.424	.384	.003		
	N	27	16	15	8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
PO4	Pearson Correlation	.243	.067	.006	.166	-.286**	.061	-.110	-.036	-.247	-.067	.289*	.290*	-.028	.204	.260	-.301*	-.001	1	
	Sig. (2-tailed)		.221	.812	.819	.714	.007	.081	.457	.816	.116	.050	.040	.052	.104	.076	.038	.993		
	N	27	16	15	8	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภูมิภาคน้ำดังกล่าวมีผลต่อประสิทธิภาพการเติบโตของปลา尼ล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการลดตาย (ตารางที่ 22) กล่าวคือ เมื่อความโปรด়รังแสงของน้ำ ($r = 0.853^{**}$) และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ($r = 0.731^{**}$) เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปลา尼ลมีอัตราการลดเพิ่มขึ้น แต่หากน้ำในบ่อมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ($r = -0.660^{**}$) ความนำไฟฟ้า ($r = -0.665^{**}$) บีโอลี ($r = -0.849^{**}$) แอนโนเมเนียในไครเจน ($r = -0.470^{**}$) ในเครทไนไครเจน ($r = -0.361^{*}$) และออร์โซฟอสเฟตฟอร์ส ($r = -0.386^{**}$) เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปลา尼ลมีอัตราการลดลดลง

การทดสอบชั้นที่ 2: ทำการเลี้ยงปลานิลร่วมกับปลาดุกบีกอกุญ碌 โคบปล่องให้สามารถอาศัยและว่าชน้ำ กินอาหารตามพื้นได้ทั่วบ่อ ผลของอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปต่อการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบีกอกุญ碌แสดงในตารางที่ 23

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภูมิภาคทางกายภาพและเคมี กับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่แตกต่างกัน ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 พบว่า อัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณ ในไครทไนไครเจนและออร์โซฟอสเฟตฟอร์ส

นอกจากนี้พบว่าระยะเวลาการเลี้ยงปลาดุกบีกอกุญ碌มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปริมาณ ของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ($r = 0.769^{**}$) ความนำไฟฟ้า ($r = 0.769^{**}$) บีโอลี ($r = 0.963^{**}$) แอนโนเมเนียในไครเจน ($r = 0.378^{*}$) ในไครทไนไครเจน ($r = 0.704^{**}$) ในเครทไนไครเจน ($r = 0.618^{**}$) และออร์โซฟอสเฟตฟอร์ส ($r = 0.728^{*}$) และพบว่าระยะเวลาการเลี้ยงปลาดุกบีกอกุญ碌มี ความสัมพันธ์เชิงลบต่อความโปรด়รังแสงของน้ำ ($r = -0.919^{**}$) ความเป็นกรด-ค้าง ($r = -0.581^{**}$) และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ($r = -0.891^{**}$)

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภูมิภาคน้ำดังกล่าวพบว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ การเติบโตของปลาดุกบีกอกุญ碌ที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเลี้ยง (ตารางที่ 11 และ 24) คือ ช่วง ระยะเวลาที่น้ำหนักเฉลี่ยของปลาดุกบีกอกุญ碌เพิ่มขึ้นนั้น พบร่วมกันอุณหภูมิอากาศ ($r = -0.772^{**}$) อุณหภูมน้ำ ($r = -0.893^{**}$) ความโปรด়รังแสงของน้ำ ($r = -0.856^{**}$) ความเป็นกรด-ค้าง ($r = -0.541^{**}$) และปริมาณ ออกซิเจนละลายน้ำ ($r = -0.891^{**}$) มีค่าลดลง ตามลำดับ ขณะที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ($r = 0.707^{**}$) ความนำไฟฟ้า ($r = 0.707^{**}$) บีโอลี ($r = 0.927^{**}$) แอนโนเมเนียในไครเจน ($r = 0.407^{**}$) ในไครทไนไครเจน ($r = 0.781^{**}$) ในเครทไนไครเจน ($r = 0.664^{**}$) และออร์โซฟอสเฟต ฟอร์ส ($r = 0.717^{*}$) มีค่าเพิ่มขึ้น

สำหรับช่วงระยะเวลาที่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของปลาดุกบีกอุยเพิ่มขึ้นนั้น พบร่วมกันนิมิต
อากาศ ($r = -0.897^{**}$) อุณหภูมน้ำ ($r = -0.864^{**}$) ความโปร่งแสงของน้ำ ($r = -0.773^{**}$) ความเป็น
กรด-ค่าง ($r = -0.614^{**}$) และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ($r = -0.796^{*}$) มีค่าสอดคล้อง ตามลำดับ ขณะที่
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด ($r = 0.588^{**}$) ความนำไฟฟ้า ($r = 0.588^{**}$) บีโอดี ($r = 0.884^{**}$)
แอนโนเนนเซ่ในไตรเงน ($r = 0.429^{**}$) ในไครท์ในไตรเงน ($r = 0.708^{**}$) ในเตรทในไตรเงน ($r =$
 0.423^{**}) และออร์โซฟอสเฟคฟอฟอรัส ($r = 0.427^{**}$) มีค่าเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 23 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)

Correlations

	month	Treatment	Depth	Airtemp	Watertemp	Trans	pH	TDS	EC	DO	BOD	NH3	NO2	NO3	PO4	
month	Pearson Correlation	1	.000	-.699**	-.767**	-.903**	-.910**	-.581**	.769**	.769**	-.801**	.953**	.378*	.704**	.618**	.728**
	Sig. (2-tailed)		1	1.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.023	.000	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Treatment	Pearson Correlation	.000	1	-.533**	.000	.060	.055	.073	.149	.148	.069	.000	.031	-.176	.106	-.075
	Sig. (2-tailed)	1.000		.001	1.000	.772	.751	.873	.398	.368	.731	.000	.858	.304	.540	.888
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Depth	Pearson Correlation	-.699**	-.533**	1	.468**	.566**	.655**	.361*	-.531**	-.531**	.562**	-.666**	-.226	-.376*	-.492**	-.522**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.003	.000	.000	.031	.001	.001	.000	.000	.162	.024	.003	.001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Airtemp	Pearson Correlation	-.757**	.000	.466**	1	.894**	.754**	.786**	-.664**	-.684**	.587**	-.907**	-.410*	-.660**	-.395*	.502**
	Sig. (2-tailed)	.000	1.000	.003		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.013	.000	.017	.002
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Watertemp	Pearson Correlation	-.903**	.000	.566**	.884**	1	.857**	.861**	-.702**	-.702**	.840**	-.930**	-.526*	-.002**	-.404**	-.000**
	Sig. (2-tailed)	.000	.772	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.004	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Trans	Pearson Correlation	-.918**	.000	.856**	.754**	.857**	1	.860**	-.622**	-.622**	.859**	-.817**	-.357*	-.666**	-.533**	-.744**
	Sig. (2-tailed)	.000	.751	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.032	.000	.001	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
pH	Pearson Correlation	-.581**	-.073	.361*	.786**	.891**	.650**	1	-.836**	-.836**	.581**	-.720**	-.354*	-.479**	-.612**	-.653**
	Sig. (2-tailed)	.000	.673	.031	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.034	.003	.001	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
TDS	Pearson Correlation	.780**	.148	-.531**	-.664**	-.702**	-.622**	-.836**	1	1.000**	-.700**	.780**	.293	.400**	.584**	.634**
	Sig. (2-tailed)	.000	.388	.001	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.083	.005	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
EC	Pearson Correlation	.760**	.148	-.831**	-.664**	-.702**	-.622**	-.836**	1.000**	1	-.700**	.780**	.293	.460**	.584**	.634**
	Sig. (2-tailed)	.000	.388	.001	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.083	.005	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
DO	Pearson Correlation	-.891**	.059	.562**	.667**	.846**	.856**	.591**	-.700**	-.700**	1	-.869**	-.359*	-.679**	-.595**	-.727**
	Sig. (2-tailed)	.000	.731	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.031	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
BOD	Pearson Correlation	.963**	.000	-.556**	-.897**	-.850**	-.917**	-.720**	.780**	.780**	-.859**	1	.406*	.730**	.574**	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000	.989	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.014	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
NH3	Pearson Correlation	.378*	.031	-.226	-.410*	-.525*	-.357*	-.364*	.293	.293	-.369*	.406*	1	.217	.097	.387*
	Sig. (2-tailed)	.023	.858	.182	.013	.001	.032	.034	.083	.083	.031	.014		.203	.574	.020
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
NO2	Pearson Correlation	.704**	.176	-.376*	-.890**	-.662**	-.688**	-.479**	.460**	.460**	-.679**	.730**	.217	1	.820**	.376*
	Sig. (2-tailed)	.000	.304	.024	.000	.000	.000	.003	.005	.005	.000	.000		.203	.000	.024
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
NO3	Pearson Correlation	.618**	.106	-.492**	-.396*	-.464*	-.533**	-.512**	.564**	.564**	-.505**	.574**	.097	.620**	1	.630**
	Sig. (2-tailed)	.000	.540	.003	.017	.004	.001	.001	.000	.000	.000	.000		.574	.000	.001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
PO4	Pearson Correlation	.728**	.076	-.522**	-.502**	-.566**	-.744**	-.563**	.834**	.834**	-.727**	.705**	.387*	.376*	.639**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.888	.001	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.020	.024	.001	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

ตารางที่ 24 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิกอุย (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)

Correlations

	avweightC	WeightGC	ADGC	SGRC	FCRC	Depth	Attemp	Watertemp	Trans	pH	TDS	EC	DO	BOD	NH3	NO2	NO3	PO4		
avweightC	Pearson Correlation	1	.000**	.276*	.276	.302	-.502**	-.772**	-.803**	-.886**	-.641**	.707**	.707**	-.801**	.027**	.407**	.781**	.684**	.717**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.031	.104	.074	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.004	.000	.000	.000		
	N		48	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
WeightGC	Pearson Correlation	1	.000**	.276*	.276	.301	-.287	-.807**	-.884**	-.773**	-.814**	.588**	.588**	.706**	.694**	.428**	.708**	.423**	.427**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.031	.100	.074	.090	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.010	.000	.000		
	N		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
ADGC	Pearson Correlation	.369*	.360**	1	.572**	-.401**	-.069	-.224	-.120	-.199	-.211	.047	.047	-.211	.127	-.095	.268	.072	.116	
	Sig. (2-tailed)		.031	.031	.000	.005	.731	.160	.486	.244	.216	.787	.787	.216	.461	.682	.114	.077	.400	
	N		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
SGRC	Pearson Correlation	.276	.276	.072**	1	-.003	-.380*	-.274	-.204	-.263	-.178	.333*	.333*	-.254	.251	.070	.092	-.048	.109	
	Sig. (2-tailed)		.104	.100	.000	.591	.022	.106	.120	.136	.200	.047	.047	.136	.140	.046	.093	.781	.326	
	N		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
FCRC	Pearson Correlation	.302	.301	-.401**	-.093	1	-.068	-.338*	-.425**	-.314	-.208	.406*	.406*	-.405*	.416*	.322	.183	.105	.172	
	Sig. (2-tailed)		.074	.074	.005	.591	.738	.044	.010	.002	.223	.014	.014	.012	.066	.342	.336	.316	.316	
	N		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
Depth	Pearson Correlation	-.693**	-.287	-.069	-.380*	-.068	1	.468**	-.592**	-.676**	.339*	-.543**	-.543**	.613**	-.655**	-.276	-.428**	-.498**	-.548**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.731	.022	.738	.001	.000	.018	.000	.000	.000	.000	.058	.002	.000	.000	.000	
	N		48	36	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
Attemp	Pearson Correlation	-.772**	-.897**	-.224	-.274	-.338*	-.495**	1	.889**	-.887**	.807**	-.583**	-.583**	.877**	-.897**	-.484**	-.705**	-.618**	-.503**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.100	.100	.044	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N		48	36	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
Watertemp	Pearson Correlation	-.893**	-.864**	-.120	-.284	-.425**	-.602**	-.889**	1	.812**	.690**	-.738**	-.738**	.940**	-.964**	-.676**	-.899**	-.569**	-.571**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.485	.120	.010	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N		48	36	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
Trans	Pearson Correlation	-.956**	-.773**	-.198	-.253	-.314	-.576**	-.667**	.812**	1	.508**	-.846**	-.846**	.863**	-.865**	-.382**	-.846**	-.574**	-.758**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.244	.130	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.007	.000	.000	.000	.000	
	N		48	36	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
pH	Pearson Correlation	-.641**	-.814**	-.211	-.178	-.208	-.330*	-.307**	.900**	-.900**	.508**	1	.814**	-.814**	.680**	-.703**	-.422**	-.561**	-.684**	-.520**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.216	.209	.223	.018	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000	
	N		48	36	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
TDS	Pearson Correlation	.707**	.566**	.047	.393*	.408*	-.540**	-.663**	-.738**	-.846**	-.614**	1	1.000**	-.760**	.805**	.374**	.505**	.656**	.570**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.767	.047	.014	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N		48	36	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
EC	Pearson Correlation	.707**	.566**	.047	.393*	.408*	-.540**	-.663**	-.738**	-.846**	-.614**	1.000**	1	-.750**	.805**	.374**	.505**	.656**	.570**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.787	.047	.014	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N		48	36	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
DO	Pearson Correlation	-.891**	-.796**	-.211	-.254	-.405*	-.613**	-.677**	.840**	-.853**	.560**	-.750**	-.750**	1	-.862**	-.427**	-.734**	-.871**	-.791**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.216	.136	.014	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	
	N		48	36	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
BOD	Pearson Correlation	.027**	.084**	.127	.261	.416*	-.050**	-.897**	-.864**	-.865**	-.703**	.805**	.805**	-.802**	1	.477**	.733**	.069**	.714**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.461	.140	.012	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	
	N		48	36	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
NH3	Pearson Correlation	.407**	.428**	-.095	.079	.322	-.276	-.464**	-.475**	-.382**	-.422**	.374**	.374**	-.427**	.477**	1	.344**	.242	.423**	
	Sig. (2-tailed)		.004	.009	.582	.046	.055	.068	.000	.007	.003	.009	.002	.001	.017	.008	.003	.000	.003	
	N		48	36	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
NO2	Pearson Correlation	.781**	.708**	.268	.092	.163	-.428**	-.705**	-.869**	-.848**	-.561**	.590**	.590**	-.734**	.783**	.344**	1	.731**	.489**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.114	.593	.242	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.017	.000	.000	.000	.000	
	N		48	36	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
NO3	Pearson Correlation	.064**	.423*	.072	-.049	.165	-.400**	-.510**	-.589**	-.574**	-.564**	.656**	.656**	-.671**	.656**	.242	.701**	1	.579**	
	Sig. (2-tailed)		.000	.009	.409	.325	.315	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N		48	36	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
PO4	Pearson Correlation	.717**	.427**	.116	.169	.172	-.640**	-.603**	-.671**	-.768**	-.620**	.670**	.670**	-.791**	.714**	.422**	.499**	.679**	1	
	Sig. (2-tailed)		.000	.009	.409	.325	.315	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.000	.000	.000	
	N		48	36	36	36	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		


* = Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

** = Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. ความหลากหลายของชนิดและองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืช

ผลการศึกษาความหลากหลายของชนิดและองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำก้อมีอุบัติร่วมกับปานิลในบ่อพลาสติกตลอดระยะเวลาการทดลองทั้ง 2 ชั้ว ปรากฏผลการศึกษาดังต่อไปนี้

การศึกษาความหลากหลายของชนิดและองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำก้อมีอุบัติร่วมกับปานิลทั้ง 12 บ่อ (4 ทริตรุ่มต์ฯ ละ 3 ชั้ว) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 (การทดลองชั้วที่ 1) และเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 (การทดลองชั้วที่ 2) โดยภาพรวมพบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 6 คิวชัน 50 ชนิด คือ คิวชัน Cyanophyta 12 ชนิด (ร้อยละ 24%) ได้แก่ *Anabaena* sp., *Aphanothecace* sp., *Chroococcus* sp., *Cylindrospermopsis raciborskii*, *Lyngbya limnetica*, *Merismopedia* sp., *Microcystis auroginosa*, *Nostoc* sp., *Oscillatoria* sp., *Phormidium* sp., *Pseudanabaena* sp. และ *Raphidiopsis* sp. คิวชัน Chlorophyta 18 ชนิด (ร้อยละ 36%) ได้แก่ *Actinastrum lagerheimia*, *Ankistrodesmus* sp., *Closterium* sp., *Coelastrum* sp., *Cosmarium* sp., *Crucigenia* sp., *Eudorina* sp., *Dictyosphaerium* sp., *Golenkinia* sp., *Kirchneriella* sp., *Micractinium* sp., *Oocystis* sp., *Pandorina* sp., *Pediastrum* sp., *Scenedesmus* sp., *Schroederia* sp., *Staurastrum* sp. และ *Tetraedron* sp. คิวชัน Chrysophyta 14 ชนิด (ร้อยละ 28%) ได้แก่ *Aulacoseira granulate*, *Cyclotella* sp., *Cymbella* sp., *Fragilaria* sp., *Gomphonema* sp., *Navicula* sp., *Nitzschia* sp., *Pinnularia* sp., *Rhopalodia* sp., *Surirella* sp. และ *Synedra* sp. คิวชัน Pyrrrophyta 1 ชนิด (ร้อยละ 2%) ได้แก่ *Peridinium* sp. คิวชัน Euglenophyta 4 ชนิด (ร้อยละ 8%) ได้แก่ *Euglena* sp., *Phacus* sp., *Strombomonas* sp. และ *Trachelomonas* sp. และคิวชัน Cryptophyta 1 ชนิด (ร้อยละ 2%) ได้แก่ *Cryptomonas* sp. (ภาพที่ 18)



ภาพที่ 18 องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละคิวชันในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำก้อมีอุบัติร่วมกับปานิล (เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2555)

การทดลองช้ำที่ 1: ทำการเลี้ยงปลาในคอกพลาสติก ขนาด 2 ตารางเมตร ที่วางในบ่อพลาสติก บ่อละ 1 คอก ผลของอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปคือการเปลี่ยนแปลงจำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชแสดงในตารางที่ 25 และ 26

ตารางที่ 25 จำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกแต่ละทรีเมนต์
(เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย ± ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)

เดือน	ทรีเมนต์	จำนวนชนิดแพลงก์ตอนพืช (ชนิด)	ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (เซกต์/ม.ค.)
พฤษภาคม 2555	1	28.33 ± 2.85^a	$1,285.67 \pm 63.57^a$
	2	30.67 ± 0.88^a	$2,491.35 \pm 69.76^a$
	3	25.67 ± 0.67^a	954.43 ± 32.24^a
	4	24.33 ± 3.53^a	$1,104.34 \pm 93.42^a$
มิถุนายน 2555	1	23.33 ± 2.19^a	$1,985.34 \pm 554.85^a$
	2	23.33 ± 0.67^a	$1,734.69 \pm 239.67^a$
	3	24.33 ± 0.67^a	$1,290.47 \pm 264.18^a$
	4	26.00 ± 0.58^a	$2,094.53 \pm 442.74^a$
กรกฎาคม 2555	1	26.67 ± 1.45^a	$2,387.36 \pm 625.52^a$
	2	21.67 ± 2.03^b	$3,116.97 \pm 367.69^a$
	3	24.67 ± 0.33^{ab}	$2,685.16 \pm 498.04^a$
	4	21.33 ± 0.88^b	$2,258.32 \pm 183.84^a$
สิงหาคม 2555	1	23.00 ± 0.58^a	$2,610.71 \pm 111.87^b$
	2	20.67 ± 0.88^{ab}	$2,799.32 \pm 472.98^a$
	3	18.33 ± 1.20^b	$2,804.28 \pm 481.44^a$
	4	22.33 ± 1.20^a	$2,407.22 \pm 117.35^a$

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ยจำนวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกแต่ละทรีเมนต์
(เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย \pm ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)

ทรีเมนต์	จำนวนชนิดแพลงก์ตอนพืช (ชนิด)	ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (เซลล์/มล.)
1 : มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับรูป 5%	25.33 ± 1.08^a	$2,067.27 \pm 235.81^a$
2 : มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับรูป 4%	24.08 ± 1.29^a	$2,535.58 \pm 324.05^a$
3 : มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับรูป 3%	23.25 ± 0.93^a	$1,883.59 \pm 309.95^a$
4: ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำหรับรูป 4%	22.50 ± 1.05^a	$1,966.10 \pm 187.31^a$
P-value	0.310	0.334

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

เมื่อพิจารณาตารางที่ 25 และ 26 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยร่วมกับปลานิลแต่ละทรีเมนต์ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 พบว่าจำนวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกทั้ง 4 ทรีเมนต์ เริ่มนิความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ภายหลังเริ่มปล่อยปลาดุกน้ำกุยและปลานิลในเดือนพฤษภาคม และเมื่อสิ้นฤดูกาลคงเหลือ พบว่าบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยร่วมกับปลานิลในทรีเมนต์ที่ 1 พบจำนวนชนิดเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชมากที่สุด คือ 25.33 ± 1.08 ชนิด และบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยร่วมกับปลานิลในทรีเมนต์ที่ 4 พบจำนวนชนิดเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชน้อยที่สุด คือ 22.50 ± 1.05 ชนิด

สำหรับค่าเฉลี่ยของปริมาณแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติก พบว่าบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยร่วมกับปลานิลในทรีเมนต์ที่ 2 พบปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยมากที่สุด คือ $2,535.58 \pm 324.05$ เซลล์/มลิติลิตร และบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกน้ำกุยร่วมกับปลานิลในทรีเมนต์ที่ 3 พบปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ $1,883.59 \pm 309.95$ เซลล์/มลิติลิตร

เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าจำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกแต่ละทรีเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

การทดลองชุดที่ 2: ทำการเลี้ยงปลา尼ลร่วมกับปลาดุกบีกอุบโดยปล่อยให้สามารถถ่ายเซลล์และว่าyanนำกินอาหารตามพื้นได้ทั่วไป ผลของอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชแสดงในตารางที่ 27 และ 28

ตารางที่ 27 จำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกแต่ละทรีเม้นต์
(เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย \pm ค่าความคลื่อนมาตรฐาน)

เดือน	ทรีเม้นต์	จำนวนชนิดแพลงก์ตอนพืช (ชนิด)	ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (เซกล์/ม.ล.)
กันยายน 2555	1	21.67 ± 1.86^a	375.56 ± 31.43^a
	2	22.67 ± 0.67^a	322.62 ± 37.91^a
	3	24.67 ± 2.19^a	301.11 ± 43.49^a
	4	23.67 ± 0.67^a	410.30 ± 58.05^a
ตุลาคม 2555	1	26.00 ± 0.58^a	$1,379.81 \pm 163.41^a$
	2	23.00 ± 0.58^a	$1,409.59 \pm 106.80^a$
	3	21.00 ± 3.06^a	$1,498.93 \pm 221.58^a$
	4	22.00 ± 2.00^a	$1,538.63 \pm 153.86^a$
พฤศจิกายน 2555	1	20.67 ± 0.67^a	$2,248.39 \pm 416.48^a$
	2	21.67 ± 2.85^a	$2,878.73 \pm 582.83^a$
	3	19.00 ± 3.61^a	$1,966.95 \pm 181.71^a$
	4	20.67 ± 1.20^a	$2,005.19 \pm 393.70^a$
ธันวาคม 2555	1	ns	ns
	2	ns	ns
	3	ns	ns
	4	ns	ns

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

ns: no sample ไม่ได้เก็บตัวอย่าง

ตารางที่ 28 ค่าเฉลี่ยจำนวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกแต่ละทรีเมนต์
(เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555) (ค่าเฉลี่ย ± ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน)

ทรีเมนต์	จำนวนชนิดแพลงก์ตอนพืช (ชนิด)	ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (เชลล์/ม.ล.)
1 : มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 5%	$22.78 \pm 1.01^*$	$1,334.58 \pm 299.94^*$
2 : มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	$22.44 \pm 0.88^*$	$1,536.98 \pm 408.06^*$
3 : มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 3%	$21.56 \pm 1.72^*$	$1,188.99 \pm 235.74^*$
4: ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ + อาหารเม็ดสำเร็จรูป 4%	$22.11 \pm 0.82^*$	$1,318.04 \pm 266.84^*$
P-value	0.896	0.885

หมายเหตุ : อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT)

เมื่อพิจารณาตารางที่ 27 และ 28 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุยร่วมกับปานิลแต่ละทรีเมนต์ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 พบว่าจำนวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกทั้ง 4 ทรีเมนต์ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดการทดลอง และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 1 พบจำนวนชนิดเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชมากที่สุด คือ 22.78 ± 1.01 ชนิด และบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 4 พบจำนวนชนิดเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชน้อยที่สุด คือ 21.56 ± 1.72 ชนิด

สำหรับค่าเฉลี่ยของปริมาณแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติก พบว่าบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 2 พบปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยมากที่สุด คือ $1,536.98 \pm 408.06$ เชลล์/มิลลิลิตร และบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุยร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 3 พบปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ $1,188.99 \pm 235.74$ เชลล์/มิลลิลิตร

เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าจำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกแต่ละทรีเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ผลของอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติก

จากการศึกษาผลของอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติก โดยทำการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ระหว่างจำนวนนิคและปริมาณแพลงก์ตอนพืชกับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่แตกต่างกัน ซึ่งการทดลองทั้ง 2 ขั้น ปรากฏผลการศึกษาดังต่อไปนี้

การทดลองขั้นที่ 1: ทำการเลี้ยงปลา尼ลในกองพลาสติกขนาด 2 ตารางเมตร ที่วางในบ่อพลาสติก บ่อละ 1 กอก

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชกับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่แตกต่างกัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 ปรากฏผลการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 29

ตารางที่ 29 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชกับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555)

Correlations					
		month	Treatment	Species	Plk
month	Pearson Correlation	1	.000	-.651**	.526**
	Sig. (2-tailed)		1.000	.000	.001
	N	36	36	36	36
Treatment	Pearson Correlation	.000	1	-.225	-.074
	Sig. (2-tailed)	1.000		.187	.666
	N	36	36	36	36
Species	Pearson Correlation	-.651**	-.225	1	-.179
	Sig. (2-tailed)	.000	.187		.297
	N	36	36	36	36
Plk	Pearson Correlation	.526**	-.074	-.179	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.666	.297	
	N	36	36	36	36

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

จากตารางที่ 29 พบว่าอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ลดลงมีแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงลบต่ำจำนวนนิคและปริมาณแพลงก์ตอนพืช นอกจากนี้พบว่าระยะเวลาการเลี้ยงปลาครกน้ำกรุญมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อบริมาณแพลงก์ตอนพืช ($r = 0.526^{**}$) และมีความสัมพันธ์เชิงลบต่ำจำนวนนิคแพลงก์ตอนพืช ($r = -0.651^{**}$)

การทดสอบข้อที่ 2: ทำการเลี้ยงปลาในครัวกับปลาดุกบีกอุย โดยปล่อยให้สามารถถ่ายทอดและว่าบน้ำ กินอาหารตามพื้นได้ทั่วไป

จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืช กับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่แตกต่างกัน ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 ปรากฏผล การศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 30

ตารางที่ 30 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชกับอัตราการ ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555)

Correlations					
	month	Treatment	Species	Plk	
month	Pearson Correlation	1	.000	-.290	.869**
	Sig. (2-tailed)		1.000	.142	.000
	N	36	36	27	27
Treatment	Pearson Correlation	.000	1	-.139	-.084
	Sig. (2-tailed)	1.000		.490	.750
	N	36	36	27	27
Species	Pearson Correlation	-.290	-.139	1	-.300
	Sig. (2-tailed)	.142	.490		.129
	N	27	27	27	27
Plk	Pearson Correlation	.869**	-.064	-.300	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.750	.129	
	N	27	27	27	27

**: Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

จากการที่ 30 พบว่าอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ลดลงมีแนวโน้มความสัมพันธ์เชิง ลบต่อจำนวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช นอกจากนี้พบว่าระยะเวลาการเลี้ยงปลาดุกบีกอุยมี ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อปริมาณแพลงก์ตอนพืช ($r = 0.869**$) และมีแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงลบ ต่อจำนวนชนิดแพลงก์ตอนพืช

4. ข้อมูลของการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือนำไปใช้ประโยชน์จากการวิจัย (ปีงบประมาณ 2555)

นำเสนอรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกนึ่งอุยในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ บุคลากรต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

นำเสนอรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกนึ่งอุยในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ Mr.Jonard Cabading จาก Collage of fisheries, Central Luzon State University ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่ง Mr. Alounxay เดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้าน การประมง ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕



ภาพที่ 19 Mr.Jonard Cabading จาก Collage of fisheries, Central Luzon State University

ประเทศไทย

วิชาการและการวิจัย

จากประเด็นความสนใจ “การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลาดุกบีกอุขในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวความคิดนำปลา niloticus เลี้ยงร่วมกับปลาดุกบีกอุข เพื่อให้ปานิชที่เดียว นั้น กินเศษอาหารที่เหลือทิ้งกันบ่อหรืออาหารธรรมชาติ ทำให้ในบ่อ มีคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อ การเลี้ยงปลาดุกบีกและช่วยส่งเสริมเกื้อกูลให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศภายในบ่อพลาสติก” จึงเป็นที่มาของการศึกษา “การเลี้ยงปลาดุกบีกอุขร่วมกับปานิชในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยทำการศึกษาทดลอง 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 (ปีที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาดุกบีกอุขและปานิชในระบบการเลี้ยงปลาดุกบีกอุขร่วมกับปานิชในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า การเลี้ยงปลาดุกบีกอุขร่วมกับเดี้ยงปานิชที่ระดับความหนาแน่น 15:5 ตัว/ตารางเมตร (หรือ อัตราส่วน 3:1) มีความเหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงปลาดุกบีกอุขร่วมกับปานิชในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยปลาดุกบีกอุขมีประสิทธิภาพการเติบโตเพิ่มขึ้นและปัจจัยคุณภาพน้ำที่สะท้อนถึงปริมาณธาตุอาหารมีปริมาณลดลง เมื่ออัตราการปล่อยปลาดุกบีกอุขน้อยลงและอัตราการปล่อยปานิชมากขึ้น

หลังจากนั้นทำการทดลองที่ 2 (ปีที่ 2) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลดอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป ต่อประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบีกอุขและปานิช ปัจจัยคุณภาพน้ำ และการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืช ซึ่งในการศึกษา ได้ทำการทดลอง 2 ครั้ง (2 ชั้้า) เกี่ยวกับลักษณะการเลี้ยงปานิชในบ่อพลาสติก เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ มากขึ้น โดยทำการเลี้ยงปานิชในลักษณะดังต่อไปนี้

การทดลองชั้้าที่ 1 ทำการเลี้ยงปานิชในกองพลาสติกขนาด 2 ตารางเมตร ที่วางในบ่อพลาสติก บ่อละ 1 กอง เพื่อป้องกันปานิชกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ให้แก่ปลาดุกบีกอุข

การทดลองชั้้าที่ 2 ทำการเลี้ยงปานิชร่วมกับปลาดุกบีกอุขโดยปล่อยให้สามารถอาศัยและว่ายน้ำกินอาหารตามพื้นได้ทั่วบ่อ

ทั้งนี้ในการทดลองชั้้าที่ 1 และ 2 อัตราความหนาแน่นของปลาดุกบีกอุขและปานิช ที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกนั้น ยังคงคำนวณจำนวนปลาและอัตราความหนาแน่นของปลาตามระดับความหนาแน่นเดิมเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ทำการเลี้ยง (ตัว/ตารางเมตร) ตามที่ได้วางแผนการทดลองไว้ โดยผลการทดลองทั้ง 2 ครั้ง สามารถสรุปผลการศึกษาภาพรวมได้ดังนี้

ประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบีกอุขที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกทั้ง 4 ทรีเมนต์ เริ่มนิความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) เมื่อเลี้ยงปลาดุกบีกอุขเป็นระยะเวลา 1 เดือน จากระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมด 3 เดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า โดยภาพรวมประสิทธิภาพ

การเติบโตของปลาคุกนิ่กอุย คือ น้ำหนักเฉลี่ย น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวัน อัตราการเติบโตจำเพาะของปลาคุกนิ่กอุยที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปริมาณ 5% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน (ทรีเมนต์ที่ 1) มีประสิทธิภาพการเติบโตดีที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ($P>0.05$) เมื่อเปรียบเทียบกับปลาคุกนิ่กอุยที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปริมาณที่ลดต่ำลงมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิ่กอุยกับอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่แตกต่างกัน คือ อัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ลดลงมีแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงลบต่อประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิ่กอุย รองลงมา คือ ปลาคุกนิ่กอุยที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปริมาณ 4% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน ทั้งที่มีและไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติ (ทรีเมนต์ที่ 2 และ 4) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ พนวณว่า ปลาคุกนิ่กอุยที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปริมาณ 4% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน ทั้งที่มีและไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาตินั้น มีประสิทธิภาพการเติบโตดีกว่าปลาคุกนิ่กอุยที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปริมาณ 5% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน

ประสิทธิภาพการเติบโตของปลา尼ลที่ทำการเลี้ยงร่วมกับปลาคุกนิ่กอุยในบ่อพลาสติก แต่ละทรีเมนต์ เริ่มนิ่มความแตกต่างกันอย่างน้อยสำหรับทางสถิติ ($P<0.05$) เมื่อเลี้ยงปลา尼ลเป็นระยะเวลา 1 เดือน จากระยะเวลาในการเลี้ยงทั้งหมด 3 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการเติบโตของปลาคุกนิ่กอุย เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลา尼ลที่เลี้ยงร่วมกับปลาคุกนิ่กอุยที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปริมาณ 5% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน (ทรีเมนต์ที่ 1) มีประสิทธิภาพการเติบโตปัจจัยอื่น (ที่ไม่ใช้อัตราการอุดตาย) ดีที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ($P>0.05$) เมื่อเปรียบเทียบกับปลา尼ลในทรีเมนต์อื่น รองลงมา คือ ปลา尼ลที่เลี้ยงร่วมกับปลาคุกนิ่กอุยที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปริมาณ 4% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน และไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อพลาสติก (ทรีเมนต์ที่ 4) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาอัตราการอุดของปลา尼ล ที่เลี้ยงร่วมกับปลาคุกนิ่กอุยที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปในอัตราที่แตกต่างกัน พนวณว่าปลา尼ลที่เลี้ยงร่วมกับปลาคุกนิ่กอุยที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปริมาณ 4% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อพลาสติก นั้น มีอัตราการอุดต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปลา尼ลที่เลี้ยงร่วมกับปลาคุกนิ่กอุยที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปปริมาณ 4% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน และไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อพลาสติก (ทรีเมนต์ที่ 4) ดังนั้น才ให้เห็นว่าการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อพลาสติกเพื่อเป็นอาหารสำรองให้กับปลา尼ล โดยการใส่ปุ๋ยหมูล้วนๆ แห้งนั้น จะต้องพิจารณาให้ความสำหรับอย่างเข้ม เพื่อการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อพลาสติกจะที่ทำการเลี้ยงปลาคุกนิ่กอุยเป็นระยะเวลา 1 – 2 เดือน ผ่านมาแล้ว นักนิปัจจัยคุณภาพน้ำที่จะท่อนถึงปริมาณมาตรฐานก่อภัยแล้วนั้น อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยคุณภาพน้ำในบ่อพลาสติก ให้มีคุณภาพไม่เหมาะสม

ค่าการค่ารังชีวิตของปานิล และส่งผลต่ออัตราการตายของปานิลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพน้ำกับระยะเวลาการ เลี้ยงปลาดุกบึงอุข ประสิทธิภาพการเติบโตของปลาดุกบึงอุขและปานิล คือ เมื่อเลี้ยงปลาดุกบึง อุขเป็นระยะเวลานานส่งผลเชิงบวกต่อปริมาณของเนื้อที่ละลายน้ำทั้งหมด ความนำไฟฟ้า นิโอดี แอนโนเมเนียในไตรเจน ในเตรทไนไตรเจน และออร์โซฟอสเฟตฟอสฟอรัสให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ขณะที่มีผลเชิงลบต่อความโปร่งแสงของน้ำ และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำให้มีปริมาณลดลง ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงปัจจัยคุณภาพน้ำดังกล่าวมีผลโดยตรงต่ออัตราการตายของปานิลอย่างชัดเจน

สำหรับปัจจัยคุณภาพน้ำในบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุขร่วมกับปานิล พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.05$) เมื่อทำการเลี้ยงปลาเป็นระยะเวลา 1 เดือน ภายหลัง เริ่มปล่อยปลา เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ภาพรวมพบว่าอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นนี้ แนวโน้มความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณของเนื้อที่ละลายน้ำทั้งหมด ความนำไฟฟ้า นิโอดี ในไตรท์ไนไตรเจน และออร์โซฟอสเฟตฟอสฟอรัส ทั้งนี้อาจเนื่องจากผลกระทบของสารอาหารที่เหลือ ตกค้างในบ่อพลาสติกตามปริมาณที่ให้แก่ปลาดุกบึงอุข

ส่วนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในบ่อพลาสติกโดยภาพรวมพบ แพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 6 คิวิชัน 50 ชนิด คือ คิวิชัน Cyanophyta 12 ชนิด (ร้อยละ 24%) คิวิชัน Chlorophyta 18 ชนิด (ร้อยละ 36) คิวิชัน Chrysophyta 14 ชนิด (ร้อยละ 28%) คิวิชัน Pyrrophyta 1 ชนิด (ร้อยละ 2%) คิวิชัน Euglenophyta 4 ชนิด (ร้อยละ 8%) และคิวิชัน Cryptophyta 1 ชนิด (ร้อยละ 2%) โดยบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุขร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 1 พันจำนวนชนิดเฉลี่ยของ แพลงก์พืชมากที่สุด ($22.78 \pm 1.01 - 25.33 \pm 1.08$ ชนิด) และบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุข ร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 4 พันจำนวนชนิดเฉลี่ยของแพลงก์ตอนพืชน้อยที่สุด ($21.56 \pm 1.72 - 22.50 \pm 1.05$ ชนิด) ขณะที่บ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุขร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 2 พันปริมาณแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยมากที่สุด ($1,536.98 \pm 408.06 - 2,535.58 \pm 324.05$ เชลล์/มิลลิลิตร) และบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุขร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 3 พันปริมาณแพลงก์ตอนพืช เฉลี่ยน้อยที่สุด ($1,188.99 \pm 235.74 - 1,883.59 \pm 309.95$ เชลล์/มิลลิลิตร) ทั้งนี้อาจเนื่องจากบ่อ พลาสติกในทรีเมนต์ที่ 1 และ 2 ที่มีการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปแก่ปลาดุกบึงอุข ปริมาณ 4 - 5% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน ร่วมกับมีการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อพลาสติกนั้น ส่งผลให้น้ำในบ่อ มีปริมาณสารอาหารเพิ่มขึ้นส่งเสริมให้มีจำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชเพิ่มขึ้น เช่นกัน ส่วนบ่อพลาสติกที่เลี้ยงปลาดุกบึงอุขร่วมกับปานิลในทรีเมนต์ที่ 4 พันจำนวนชนิดเฉลี่ยของ แพลงก์ตอนพืชน้อยที่สุด อาจเป็นผลมาจากการที่ไม่มีการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อพลาสติก

ดังนั้น โดยสรุปเมื่อพิจารณาผลการศึกษาทั้งหมด (การทดลองที่ 1; ปีที่ 1 และการทดลองที่ 2; ปีที่ 2) จึงสามารถสรุปได้ว่า การเลี้ยงปลาดุกบีกอุบร่วมกับเลี้ยงปลานิลที่ระดับความหนาแน่น 15:5 ตัว/ตารางเมตร (หรืออัตราส่วน 3:1) มีความเหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงปลาดุกบีกอุบร่วมกับปลานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำปลานิลมาเลี้ยงร่วมกับปลาดุกบีกอุบในบ่อพลาสติกนั้น จะส่งผลให้ปลาดุกบีกอุบมีประสิทธิภาพการเติบโตที่ดีกว่าการเลี้ยงปลาดุกบีกอุบเพียงชนิดเดียว นอกจากนี้การเลี้ยงปลานิลร่วมกับปลาดุกบีกอุบ ปลานิลจะช่วยส่งเสริมเกื้อกูลให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศภายในบ่อพลาสติก โดยปัจจัยภายน้ำที่สะท้อนถึงปริมาณชาต้อาหาร ในบ่อพลาสติกจะมีปริมาณลดลง เมื่ออัตราการปล่อยปลาดุกบีกอุบน้อยลงและอัตราการปล่อยปลานิลมากขึ้น สำหรับผลศึกษาการลดอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปนั้น พบว่ามีความเป็นไปได้ในการลดอัตราการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป จากปริมาณ 5% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน ลดลงเหลือ 4% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน โดยปลาดุกบีกอุบซึ่งคงมีประสิทธิภาพการเติบโตที่ดีเช่นเดิม

ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย “การเลี้ยงปลาดุกบีกอุบร่วมกับปลานิลในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นด้านการเลี้ยงปลาดุกบีกอุบในบ่อพลาสติก โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลาดุกบีกอุบร่วมกับปลานิลหรือปรับเปลี่ยนชนิดของสัตว์น้ำที่นำมาเลี้ยงร่วมกับปลาดุกบีกอุบเป็นชนิดอื่นก็ได้ เช่น หอยขนาดทั้งน้ำสัตว์น้ำที่นำมาเลี้ยงร่วมกับปลาดุกบีกอุบนั้นจะต้องเป็นชนิดที่ส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (2552) ที่รายงานว่าการเลี้ยงปลาดุกบีกอุบในบ่อพลาสติกตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พบว่า ส่วนใหญ่จะเลี้ยงในลักษณะ “การเลี้ยงปลาแบบชนิดเดียว” ซึ่งทั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงปลาดุกบีกอุบในบ่อพลาสติกร่วมกับสัตว์น้ำชนิดอื่นในลักษณะ “การเลี้ยงปลาหลายชนิดหรือแบบรวม” กือ การเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมในบ่อเดียวกัน หรือชนิดเดียว แต่มีขนาดต่างกัน และไม่มีอันตรายต่อกัน ข้อดีของการเลี้ยงปลาแบบรวม สามารถใช้ประโยชน์ได้จากอาหารที่มีในบ่อปลาอย่างเต็มที่ และชนิดปลาที่แตกต่างกันนั้นยังจะส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงปลาดุกบีกอุบในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สรุปผลการวิจัย

โครงการวิจัย เรื่อง “การเลี้ยงปลาดุกน้ำกึ่งอุบัติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทำการศึกษาทดลอง 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 (ปีที่ 1) ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการเลี้ยงปลาดุกน้ำกึ่งอุบัติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดปริมาณอาหารเม็ดสำหรับปลาดุกน้ำกึ่งอุบัติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง 15:5 ตัว/ตารางเมตร (หรืออัตราส่วน 3:1) มีความเหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงปลาดุกน้ำกึ่งอุบัติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับการทดลองที่ 2 (ปีที่ 2) ผลการศึกษาสรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการลดขั้นตอนการให้อาหารเม็ดสำหรับปลาดุกน้ำกึ่งอุบัติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 5% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน ลดลงเหลือ 4% ของน้ำหนักตัวปลา/วัน โดยปลาดุกน้ำกึ่งอุบัติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพการเติบโตดีไม่แตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$) อีกทั้งยังมีผลเชิงบวกในการลดปริมาณของเนื้อที่ละลายน้ำทั้งหมด ความนำไฟฟ้า นีโอดี ไนโตรทีไนโตรเจน และออกซิฟอสฟอฟอรัสในบ่อพลาสติกให้มีค่าเหมาะสมต่อการเติบโตของปลาดุกน้ำกึ่งอุบัติและปลานิล

ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นด้านการเลี้ยงปลาดุกน้ำกึ่งอุบัติในบ่อพลาสติก และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงปลาดุกน้ำกึ่งอุบัติในบ่อพลาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ເອກສາງຕ້າງອີງ

กระบวนการความรู้. 2555. การเรียนปัจจุบันในบ่อพลาสติกแบบเคราชุดกิจพอดเที่ยง. จาก <http://www.gotoknow.org> [26 เมษายน 2556]

กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2556. การเพาะเลี้ยงปลาดุกน้ำจืด. จาก <http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/fish/bigdook.pdf> [5 พฤษภาคม 2556].

กลุ่มส่งเสริมการผลิตประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2556. การเลี้ยงปลาคุกนิ่กอยู่ในน้ำพื้นดิน. จาก <http://www.doae.go.th/Library/html/detail/bcatfish/index.htm> [5 พฤษภาคม 2556].

ເກທກົງພນນ. 2556. ກາຣເລື່ອງປ້າດູກໃນບໍ່ພລາສຕິກ.ຈາກ <http://www.gotoknow.org> [5 ພຖມກາຄນ 2556].

พิพย์สุภา ต่างประโคน ผ่องใส จันทร์ศรี และสุพรรดา ขันน้ำเที่ยง. 2549. การเฉียงป่าดูดกออย่างไรในบ่อพลาสติกที่ความหนาแน่นแตกต่างกัน 3 ระดับ. เอกสารวิชาการฉบับที่ 64/2549. สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 20 น.

ເທກໄນໄລຍ້ຂາວບ້ານ. 2554. ເລື່ອງປ້າດຸກນໍ້າພດາສຕິກແກ້ຈົນ. ຈາກ <http://www.somsak2004.com>
[25 ຊັນວາຄນ 2554].

นิวพิ หวังชัย. 2547. โภชนาศาสตร์สัตว์น้ำ. คณฑ์เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่. n. 86 – 88.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2552. การเรียนปี 1. จาก <http://www.trang.ru.ac.th/LO/lo2.html> [19 กรกฎาคม 2552].

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2556. เศรษฐกิจพอเพียง. จาก <http://th.wikipedia.org/wiki/เศรษฐกิจพอเพียง> [5 พฤษภาคม 2556].

ศักดิ์ชัย ழ. ใช. 2536. การเลี้ยงป่า詹นำจีค. ภาควิชาการวิชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา. สำนักพิมพ์โดยเดือนสโตร: กรุงเทพฯ. น. 106 – 116.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชคاري. 2556. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ พลางคិក. จาก http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/ [24 เมษายน 2556].

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์. 2552. เกษตรกรน้าน Isaowang คำนดปันแแต จังหวัดพัทลุง
เอียงป่าคุกด้วยหม้อน้ำหมักดองต้นทุนการผลิต รักษาเชิงแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง. จาก http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255103030274&tb=N255103
[19 กรกฎาคม 2552].

สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง. 2556. การเลี้ยงปลา尼ลแปลงเพศ. จาก <http://www.fisheries.go.th/fpo-anthong> [5 พฤษภาคม 2556].

อิสราพรที่ วงศ์รีชา. 2554. ประวัติการเพาะเลี้ยงเติบโตของปลาดุกนิลอยู่ที่เลี้ยงร่วมกับปลา尼ลในบ่อ พาสติกแบบเศรษฐกิจพอเพียง. ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์บัณฑิต. คณะเทคโนโลยีการ ประมงและทรัพยากรทางน้ำ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้: เชียงใหม่.

อุทัยรัตน์ ณ นคร. 2544. ปลาดุก. ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 140 น.

Jean-F.H. 2013. Images: *Clarias macrocephalus* × *Clarias gariepinus*. Available from: http://www.scotcat.com/images/c_macrocephalus_x_gariepinus4.jpg [2013 May 3].

Nelson. J.S.1994. Fishes of the world. Department of zoology, University of Alberta, 465 p.

Yong-Sulem S., L. Tchantchou, F.Nguefack and R.E.Brummett. 2006. Advanced nursing of *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822) fingerlings in earthen ponds, through recycling of tilapia recruits. *Aquaculture.J.* 256 (2006): 212 - 215.